



Agencija za lekove
i medicinska sredstva Srbije

NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

NRL
DODATAK
1

Beograd
2009.

IZDAVAČ

**Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima**

Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd

www.alims.gov.rs

e-mail: registar@alims.gov.rs

Helicon Publishing

www.helicon.co.yu

office@helicon.co.yu

ZA IZDAVAČA

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

AUTORI I UREDNICI

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić

Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović

Prim. mr sc. ph. Milena Miljković

Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik

Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

SARADNICI

Mr sci. ph. Danka Stefanović

Mr ph. Danka Tešić

Mr ph. Marija Mašković

Mr ph. Ivana Mihajlović

Dr vet. med. Jelena Borlja

Dr med spec. Zorica Stajković

Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović

Ing. Julija Grujić

Veselina Rakanović, farm. tehn.

Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SARADNICI NA PRIPREMI ID PODATAKA

Mr ph. spec. Ljiljana Ivanišević

Mr ph. Vladan Savić

Mr ph. Dejan Stevanović

Nataša Đukić

ŠTAMPA

GRAFOLIK, Beograd

TIRAZ:

2500

ISSN 1452-3337

PREDGOVOR

Dodatak 1 Nacionalnog registra lekova, 2009 godine sadrži pregledno klasifikovane stručne informacije o promenama vezanim za stavljanje lekova u promet u periodu **novembar 2008 – januar 2009 godine** koje su date prema principima i sadržaju obradjenom u NRL, 2009.

U Dodatku 1, obradjeni su podaci o: novoregistrovanim lekovima, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih podataka koji su bitni za praksu. To su podaci o: lekovima za koje je izvršena obnova registracije, izdata rešenja o prestanku dozvole za stavljanje u promet, novim dozama, pakovanjima i farmaceutskim oblicima registrovanih lekova, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih stručnih podataka o lekovima.

Uz želju i obavezu da vas i dalje ažurno informišemo o promenama u oblasti registracije lekova, očekujemo vaše sugestije.

Autori i urednici

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno.

© Sva prava zadržana.

SADRŽAJ

Predgovor	3
Abeledni spisak novoregistrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama	7
Abeledni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama	25
Abeledni spisak novoregistrovanih lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR).....	27
Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom (▲)	27
Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti (△).....	27
Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija novoregistrovanih lekova	29
Abeledni spisak novih internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima.....	35
Abeledni spisak lekova za koje je izvršena obnova registracije sa pripadajućim EAN kôdom	37
Abeledni spisak proizvođača sa asortimanom novoregistrovanih lekova	39
Promene naziva proizvoda (varijacije).....	41
Korekcije u Nacionalnom registru lekova 2009	43
Promene po osnovu varijacija	45
Index	51

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA, CENAMA I PARALELAMA

ACTRAPID® PENFILL® - NOVO NORDISK PRODUCTION S.A.S - Francuska

insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

A10AB insulini i analogi, parenteralni, kratkog dejstva

(R)	0041559 rastvor za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3 mL	Cena:	2210.1din
	8600102099180	4015/2008/12	03.11.2008
	30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C.		09.10.2013

Doziranje: *svi tipovi dijabetesa:* individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

ALUVIA® - ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka

lopinavir, ritonavir - J05AE..

ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

J05AE inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze)

(R)	1328621 film tableta; 200mg+50mg; bočica, 1x120 kom	Cena:	36199.10din
	4032046002256	17/2009/12	04.08.2008
	2 godine, na sobnoj temperaturi.		04.08.2013

Doziranje: *infekcije HIV:* odrasli, adolescenti i deca iznad 2 godine sa telesnom površinom većom od 1.3m²: preporučena doza je 2 tabl. od 200/50mg 2 puta na dan, uz jelo ili bez jela. Tabl. treba progutati celu, ne žvakati, lomiti ili mrviti. Lek propisuju samo lekari koji imaju iskustva u lečenju HIV infekcije.

Paralelni lekovi: Kaletra®

AZAX® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska

azitromicin - J01FA10

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi

(R)	1325101 film tableta; 500mg; blister, 1x3 kom	Cena:	-
	8699540090064	4223/2008/12	25.11.2008
	2 godine, bez posebnih naznaka.		25.11.2013

Doziranje: infekcije respiratornog trakta (*bronhitis, sinuzitis, faringitis, tonzilitis*), pneumonija, *otitis media*, infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli i deca preko 45kg uzimaju 500mg dnevno u toku 3 dana, ukupno 1500mg; nekomplikovane genitalne infekcije izazvane *Cl. trachomatis*: jednokratna doza od 1g (2 tabl.), može se uzimati sa hranom. Potreban je oprez kod primene u bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom, ne daje se bolesnicima sa teškom insuficijencijom jetre.

Paralelni lekovi: Azitromicin Sandoz, Hemomycin, Sumamed, Zmax®

BELBIEN - HEMOFARM AD - Srbija

zolpidem - N05CF02

PSIHOLEPTICI

N05CF lekovi srodni benzodiazepinima

▲(R)	1077302 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom	Cena:	-
	8600097411455	3121/2008/12	10.09.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka.		10.09.2013

Doziranje: *kratkotrajna terapija nesanicе:* preporučena doza za odrasle je 10mg pred spavanja; kod starijih osoba, preporučena doza je 5mg. Primenu treba ograničiti na nekoliko dana do maks. 4 nedelje. Nije utvrđena bezbednost i efikasnost kod dece i mlađjih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Sanval®, Stilnox®, Zolsana®

CARBOPLASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija**karboplatin** - L01XA02**ANTINEOPLASTICI****L01XA jedinjenja platine**

(SZ)	0031306 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica staklena, 1x15 mL	Cena: -
	5944720030358	3929/2008/12 23.10.2008
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. 23.10.2013	
(SZ)	0031307 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica staklena, 1x45 mL	Cena: -
	5944720030365	3930/2008/12 23.10.2008
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. 23.10.2013	
(SZ)	0031308 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica staklena, 1x5 mL	Cena: -
	5944720030341	3927/2008/12 23.10.2008
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. 23.10.2013	
(SZ)	0031309 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica staklena, 1x60 mL	Cena: -
	5944720030372	3928/2008/12 23.10.2008
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. 23.10.2013	

Doziranje: *uznapredovali karcinom ovarijuma epitelnog porekla, mikrocelularni karcinom pluća, epidermoidni karcinomi glave i vrata: monoterapija* odrasli 400mg/m² jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje. Ukupna terapija je najviše 6 pojedinačnih terapijskih ciklusa. Promene doziranja vršiti prema rezultatima hematoloških parametara. *Kombinovana* terapija: prema protokolu.

Paralelni lekovi: Carboplatin, Carboplatin PharmaSwiss, Carboplatin-Teva, Cycloplatin 150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®

CETIRIZIN - NI MEDIC D.O.O. - Srbija**cetirizin** - R06AE07**ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU****R06AE derivati piperazina**

(R)	1058049 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom	Cena: 232.50din
	8606010301834	3908/2008/12 23.10.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka. 23.10.2013	

Doziranje: *sezonske alergijskji rinitis, pruritis, alergijski konjunktivitis, urtikarija: odrasli i deca preko 6 godina* uzimaju 1 tabl. dnevno, maks. 2 tabl. dnevno (20mg).

Paralelni lekovi: Letizen®, Letizen® S

COLDREX® HOTREM MED I LIMUN - SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija**fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina** - R01BA53**NAZALNI PREPARATI****R01BA adrenomimetici**

(BR)	3111317 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg; kesica, 10x5 g	Cena: -
	3830029291700	4232/2008/12 25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C. 25.11.2013	

Doziranje: *kratkotrajno olakšavanje simptoma jake prehlade i gripa uključujući groznicu, drhtavicu, glavobolju, kongestiju nosa, bol u grlu, sinuzitis udružen sa bolom odrasli (uključujući i stare osobe) i deca iznad 12 godina:* 1 kesica na svakih 4-6 sati, rastvoriti u toploj vodi, maks. 4 kes. praška tokom 24 sata; ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez savetovanja sa lekarom. *Ne preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.*

Paralelni lekovi: Coldrex HotRem Blackcurrant, Coldrex HotRem Lemon, Coldrex® Junior HotRem, Influrex®

COLDREX® JUNIOR HOTREM - SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija**fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina** - R01BA53**NAZALNI PREPARATI****R01BA adrenomimetici**

(BR)	3111316 prašak za oralni rastvor; 5mg+300mg+20mg; kesica, 10x3 g	Cena: -
	3830029291717	4233/2008/12 25.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C. 25.11.2013	

Doziranje: *kratkotrajno olakšavanje simptoma gripa, groznice, jeze i prehlade, uključujući glavobolju, bol u grlu, sinusitis i bolove:* deca od 6 i više godina uzimaju 1 kesicu rastvorenu u šolji tople vode na 4 sata, maks. 6 kesica tokom 24 sata; ne primenjavati duže od sedam dana u kontinuitetu bez savetovanja sa lekarom. Ne sme se davati deci mlađoj od 6 godina, osim ukoliko lekar to nije savetovao.

Paralelni lekovi: Coldrex HotRem Blackcurrant, Coldrex HotRem Lemon, Coldrex® HotRem med i limun, Influrex®

CONTROLOC® - NYCOMED LIMITED - Irska

pantoprazol - A02BC02

LEKOWI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

(R)	1122750 gastrozestantna tableta; 40mg; blister, 14x40 mg	Cena:	989.0din
	8606102233203	1459/2008/12	03.06.2008
	3 godine, na temperaturi do 25 °C.		17.04.2013

Doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (*ulkus duodenuma*), ili 4 nedelje (*ulkus želuca*); *refluksni ezofagitis:* 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje. U kombinaciji sa antibioticima za eradikaciju *Helicobacter pylori* kod pacijenata sa ulkusom duodenuma ili gastritisom: prema protokolu; tableta se uzima pre večernjeg obroka. Kod starijih pacijenata ili pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ne bi trebalo prekoračiti dnevnu dozu od 40 mg, osim u slučaju kombinovane terapije za eradikaciju *Helicobacter pylori* gde i stariji pacijenti u toku jednonedeljne terapije uzimaju 2 puta po 40mg dnevno. Tablete se gutaju cele sa vodom 1 sat pre doručka, ne treba ih žvakati ili lomiti. Ne preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.

Paralelni lekovi: Nolpaza®, Pulcet®

DEPAKINE® CHRONO - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska

valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01

ANTIPILEPTICI

N03AG derivati masnih kiselina

(R)	1084815 tableta sa produženim oslobađanjem; 300mg; fiola, 1x30 kom	Cena:	-
	3582910009528	3902/2008/12	23.10.2008
	3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka.		23.10.2013
(R)	1084816 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; fiola, 1x30 kom	Cena:	-
	5909990694327	3903/2008/12	23.10.2008
	3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka.		23.10.2013

Doziranje: *generalizovani, parcijalni i drugi oblici epileptičnih napada, terapija i prevencija akutne manije kod bolesnika sa bipolarnim poremećajem:* početna doza za većinu bolesnika (60–100kg) je 10–15mg/kg dnevno, odnosno 2–5 tabl. (300 mg) ili 1–3 tabl. (500 mg). Doza se mora titrirati do optimalnog nivoa i podeliti na 1–2 dnevne doze. Doza kod odraslih je, po pravilu, između 20–30mg/kg dnevno, odnosno 4–10 tabl. po 300mg ili 2–6 tabl. po 500mg ako je telesna masa bolesnika između 60–100 kg. Ukoliko se ne može postići kontrola **epi** napada, doza se može povećati. Bolesnik koji dobija dnevne doze veće od 50mg/kg moraju da bude pod posebnim nadzorom. Najčešća doza kod dece je oko 30mg/kg dnevno. *Terapija maničnih epizoda, profilaktička terapija bipolarnе bolesti (odrasli):* preporučena inicijalna doza u terapiji *akutne manije* iznosi 20mg/kg/dan; doza se može prilagoditi prema individualnom kliničkom odgovoru, maks. dnevna doza ne sme biti veća od 3000mg; preporučena doza održavanja kod *bipolarnog poremećaja* je 1000–2000mg/dan. Dozu treba prilagoditi prema individualnom kliničkom odgovoru. Profilaktičke doze u *prevenciji akutne manije* su individualne, u skladu sa najnižom efikasnom dozom, s tim što ciljne koncentracije u plazmi treba da budu 50–125mcg/mL.

DEPAKINE® CHRONOSPHERE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**valproinska kiselina, natrijum-valproat** - N03AG01**ANTIPILEPTICI****N03AG derivati masnih kiselina**

(R)	2084810 granule sa produženim oslobađanjem; ukupno 100mg natrijum-valproata; kesica, 30x1 kom 3582910010098	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C.	3901/2008/12	23.10.2008 23.10.2013
(R)	2084811 granule sa produženim oslobađanjem; ukupno 1000mg natrijum-valproata; kesica, 30x1 kom 3582910010159	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C,	3904/2008/12	23.10.2008 23.10.2013
(R)	2084812 granule sa produženim oslobađanjem; ukupno 250mg natrijum-valproata; kesica, 30x1 kom 3582910010081	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi od 25°C.	3900/2008/12	23.10.2008 23.10.2013
(R)	2084813 granule sa produženim oslobađanjem; ukupno 500mg natrijum-valproata; kesica, 30x1 kom 3582910010074	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C.	3906/2008/12	23.10.2008 23.10.2013
(R)	2084814 granule sa produženim oslobađanjem; ukupno 750mg natrijum-valproata; kesica, 30x1 kom 3582910010104	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C.	3905/2008/12	23.10.2008 23.10.2013

Doziranje: *generalizovani, parcijalni i drugi oblici epileptičnih napada:* početna doza iznosi 10-15mg/kg, doze se povećavaju do optimalnog nivoa. Prosečna uobičajena doza kod odraslih iznosi 20-30mg/kg dnevno, odnosno 600mg na dan, podeljeno u dve doze; doza se može povećavati za po 200mg na 3 dana postepeno sve do maks. 2.5g dnevno. Bolesnik u tim slučajevima treba da bude pod posebnim nadzorom. Kod odojčadi i dece, uobičajena doza je 30mg/kg dnevno. Kod dece telesne mase preko 20kg preporučuje se 400mg dnevno, podeljeno u dve doze (20-30mg/kg na dan), maks. do 35mg/kg na dan. Kod dece telesne mase ispod 20kg preporučuje se 20mg/kg na dan, podeljeno u dve doze, maks. do 40mg/kg na dan u teškim slučajevima, uz praćenje konc. leka u krvi. Kod starijih osoba, doziranje treba prilagoditi prema rezultatima kontrole napada. Granule se daju posute po mekoj hrani ili sa jogurtom, sokom od narandže (hladno ili na sobnoj temperaturi), ne sa toplom hranom ili pićima (supa, kafa, čaj i sl.)

DIBIGLIM® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija**glimepirid** - A10BB12**LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)****A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje**

(R)	1042815 tableta; 1mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891007	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30°.	2006/2008/12	10.06.2008 10.06.2013
(R)	1042816 tableta; 2mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891014	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30° C.	2010/2008/12	10.06.2008 10.06.2013
(R)	1042817 tableta; 3mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891021	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30°C.	2009/2008/12	10.06.2008 10.06.2013
(R)	1042818 tableta; 4mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891038	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30°C.	2008/2008/12	10.06.2008 10.06.2013

Doziranje: *diabetes mellitus (tip 2):* početna doza je 1mg jednom dnevno, ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg, 3mg ili 4mg dnevno, maks. 6mg dnevno; lek se uzima pre ili u toku jela; nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.

Paralelni lekovi: Amaryl®, Diulong®, Glimepirid, Gliprex®, Meglimid®, Trical®

DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM - HABIT PHARM A.D. - Srbija**diklofenak** - M01AB05**ANTIINFLAMATORNI****I ANTIREUMATSKI PROIZVODI****M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance**

(R) 1162403 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 3x10 kom

Cena: 315.00

860610720017

3926/2008/12 23.10.2008

2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

23.10.2013

Doziranje: *reumatoidni artritis, osteoartroza, bol u donjem delu leđja, akutni mišićno-skeletni poremećaji, trauma* (periartritis, tendinitis, tenosinovitis, burzitis, iščašenja, nategnuća, dislokacija), *za olakšanje bola kod fraktura, ankilozirajući spondilitis, akutni giht, za kontrolu bola i zapaljenja u ortopedskim, dentalnim i drugim manjim hirurškim intervencijama*, bolna ginekološka stanja (*primarna dismenoreja, adneksitis*) odrasli: jedna kapsula dnevno, doza se može povećati na dve kapsule dnevno. Prvu dozu treba uzeti ujutru pre doručka, a drugu posle 8-12 sati, ukoliko je potrebna. Kapsule treba progutati cele sa dovoljno tečnosti, sa ili nakon obroka. **Kontraindikovana je primena kod dece do 12 godina.**

Paralelni lekovi: DicloRapid®, Diclofenac Duo, Diclofenac PharmaSwiss, Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Duo, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Remevita®, Diklofenak duo Remevita® plus, Diklofenak retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Naklofen® retard, Raptent rapid, Raptent-K®, Raptent® Duo

DOPAMIN ADMEDA 200 - WULFING PHARMA GMBH - Nemačka**dopamin** - C01CA04**TERAPIJA BOLESTI SRCA****C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi**

(Z) 0105145 koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL; ampula, 5x10 mL

Cena: 474.40

4260099070261

2453/2008/12 04.08.2008

3 godine, bez posebnih naznaka.

04.08.2013

Doziranje: *kardiogeni šok* (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda), *hipovolemijski šok* (kod velikih gubitaka tečnosti, ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti), *infektivno-toksički (septički) šok, profuzna hipotenzija* (posle uklanjanja feohromocitoma), *prateća insuficijencija bubrega:* početna doza 2-5mcg/kg u minuti. Kod težih slučajeva, može se započeti sa dozom od 5mcg/kg/min i povećavati dozu postepeno za 5-10 do 20-50mcg/kg/min, ukoliko je potrebno. Ako su potrebne doze veće od 50mcg/kg/min, savetuje se stalno praćenje diureze.

Paralelni lekovi: Dopamin, Dopamin Admeda 50**DOPAMIN ADMEDA 50 - WULFING PHARMA GMBH - Nemačka****dopamin** - C01CA04**TERAPIJA BOLESTI SRCA****C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi**(Z) 0105146 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/5mL; ampula, 5x5 mL **Cena:** 385.60

4260099070254

2454/2008/12 04.08.2008

3 godine, bez posebnih naznaka.

04.08.2013

Doziranje: *kardiogeni šok* (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda), *hipovolemijski šok* (kod velikih gubitaka tečnosti, ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti), *infektivno-toksički (septički) šok, profuzna hipotenzija* (posle uklanjanja feohromocitoma), *prateća insuficijencija bubrega:* početna doza 2-5mcg/kg u minuti. Kod težih slučajeva, može se započeti sa dozom od 5mcg/kg/min i povećavati dozu postepeno za 5-10 do 20-50mcg/kg/min, ukoliko je potrebno. Ako su potrebne doze veće od 50mcg/kg/min, savetuje se stalno praćenje diureze.

Paralelni lekovi: Dopamin, Dopamin Admeda 200

FOLCASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija**kalcijum-folinat** - V03AF03**SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI****V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplastičima**

(SZ)	0184100 rastvor za injekciju/infuziju; 30mg/10mL; bočica staklena, 1x10 mL	Cena:	-
	5944720110173	3932/2008/12	23.10.2008
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C, u originalnom pakovanju.		23.10.2013

Doziranje: kao antidot za metotreksat prema protokolu: primenjuje se isključivo i.m., i.v. U slučaju i.v. primene ne davati više od 160mg u toku jednog minuta. Da bi se primenio u obliku i.v. inf., pre upotrebe razblažiti sa 5% rastvorom glukoze ili 0.9% rastvorom natrijum hlorida; u citotoksičnoj terapiji kombinuje se sa 5-fluorouracilom u različitim doznim režimima i protokolima.

Paralelni lekovi: Calciumfolinat „Ebewe“, Leucovorin Ca Pliva - Lachema 25, Leucovorin Kalcijum

GEMCITABIN SANDOZ® - SANDOZ S.A. - Argentina**gemcitabin** - L01BC05**ANTINEOPLASTICI****L01BC analozi pirimidina**

(SZ)	0034212 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1 g	Cena:	-
	8606010891649	2648/2008/12	20.08.2008
	2 godine, na temperaturi do 30° C.		20.08.2013
(SZ)	0034213 prašak za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200 mg	Cena:	-
	8606010891656	2647/2008/12	20.08.2008
	2 godine, na temperaturi do 30° C.		20.08.2013

Doziranje: *nemikrocelularni karcinom pluća kod odraslih, karcinom pankreasa:* jednom nedeljno 1000mg/m², i.v. inf. tokom 30 minuta, u toku 3 nedelje, jedna nedelja pauza, zatim se ciklus ponavlja; *karcinom bešike:* kod odraslih preporučena doza je 1000mg/m² i.v. inf. u trajanju od 30 minuta 1., 8. i 15. dana svakog ciklusa od 28 dana, u kombinaciji sa cisplatinom. Preporučena doza cisplatina je 70mg/m², 1. dana nakon gemcitabina ili 2. dana svakog ciklusa od 28 dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. *Karcinom dojke:* preporučuje se u kombinaciji sa paklitakselom (175mg/m²) 1. dana i.v. duže od 3 sata, zatim gemcitabin (1250mg/m²) i.v. inf. u trajanju od 30-60 minuta 1. i 8. dana svakog ciklusa od 21 dana.

Paralelni lekovi: Gemzar®

HEPALIP FORTE® - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina**esencijalni fosfolipidi, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, tokoferolacetat** - A05BA..**TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE****A05BA preparati u terapiji bolesti jetre**

(BR)	1127166 kapsula, tvrda; 300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg; blister, 3x10 kaps.	Cena:	-
	3870010004537	3116/2008/12	10.09.2008
	2 godine, na temperaturi do 25° C.		10.09.2013

Doziranje: *oboljenja jetre* (kao dodatna terapija) *različite etiologije i dislipoproteinemije:* uobičajeno 3 puta po 2 kaps/dan (u toku jela sa umerenom količinom tečnosti) u prva dva meseca lečenja. Doza održavanja je 3 puta po 1 kaps/dan.

HIDENSIL - VIPHARM S.A. - Poljska**pamidronska kiselina** - M05BA03**LEKOWI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU****M05BA bifosfonati**

(SZ)	0059105 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 30mg/10mL; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 2x10 mL	Cena:	9270.10
	5909990937813	1536/2008/12	06.05.2008
	3 godine, na temperaturi do 25° C.		06.05.2013

Doziranje: *tumorom indukovana osteoliza sa ili bez hiperkalcijemije:* prosečna doza iznosi 30-60mg u jednoj inf. (spora i.v. inf. maks. 1mg/min.) ili u više podeljenih inf. tokom 2-4 uzastopna dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana (u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu).

Pagetova bolest: 30mg jednom nedeljno ili 60mg svake druge nedelje, tokom 6 uzastopnih nedelja. Ukupna doza po tretmanu iznosi 180mg.

Paralelni lekovi: Aredia®, Pamifos, Pamitor®

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER - BAXTER AG - Austrija

albumin, humani - B05AA01

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI**

B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme

(SZ)	0179315 rastvor za infuziju; 20%; bočica, 1x50 mL 5413760292236	Cena: 3086.40din 3308/2008/12 02.10.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati, zaštićeno od svetlosti.	02.10.2013
(SZ)	0179316 rastvor za infuziju; 20%; bočica, 1x100 mL 5413760292229	Cena: 4856.47din 3315/2008/12 02.10.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati, zaštićeno od svetlosti.	02.10.2013

Doziranje: *hipoalbuminemije i smanjen cirkulatorni volumen krvi*: individualno, doziranje zavisi od cirkulatornog volumena (prate se hemodinamski parametri), a ne nivoa humanog albumina u plazmi. Primenjuje se direktno u i.v. inf. ili se razblažuje izotoničnim rastvorom (npr. 5% glukozom ili 0.9 % natrijum hloridom).

Paralelni lekovi: Human Albumin 20% Behring, malo soli, Human Albumin 20% Biotest, Human albumin, Human albumin Octapharma 20%, Human albumin Octapharma 5%, Ljudski albumin 20%, Uman Albumin

INSULATARD® PENFILL® - NOVO NORDISK PRODUCTION S.A.S - Francuska

insulin humani - A10AC01

**LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)**

A10AC insulini i analogi, parenteralni, srednje dugog dejstva

(R)	0041557 suspenzija izofan insulina za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3 mL 8600102099197	Cena: 2210.2din 4016/2008/12 03.11.2008
	30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C.	16.10.2013

Doziranje: *svi tipovi dijabetesa*: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

IRINOTEKAN SANDOZ® - SANDOZ S.A. - Argentina

irinotekan - L01XX19

ANTINEOPLASTICI

L01XX ostali antineoplastici

(SZ)	0039292 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL 8606010890413	Cena: 12985.90din 2638/2008/12 20.08.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	20.08.2013
(SZ)	0039293 koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2mL; bočica staklena, 1x2 mL 8606010890420	Cena: 6010.30din 2637/2008/12 20.08.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	20.08.2013

Doziranje: *metastatski kolorektalni karcinom*: u prvoj liniji lečenja u kombinaciji s 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom kod bolesnika koji prethodno nisu primali hemioterapiju; u drugoj liniji lečenja kao monoterapija kod bolesnika koji nisu odgovorili na lečenje s 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom; individualno, po protokolu.

Paralelni lekovi: Campto®, Irinotesin®

IRINOTESIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija**irinotekan** - L01XX19**ANTINEOPLASTICI****L01XX ostali antineoplastici**

(SZ) 0039294 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL

Cena: 12985.90din

5944720340266

3222/2008/12 16.09.2008

30 meseci, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

16.09.2013

(SZ) 0039295 koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2mL; bočica staklena, 1x2 mL

Cena: 6010.30din

5944720340259

3223/2008/12 16.09.2008

30 meseci, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

16.09.2013

Doziranje: *metastatski kolorektalni karcinom:* u kombinaciji sa 5-fluorouracilom, folinskom kiselinom i bevacizumabom kao terapija prvog izbora kod bolesnika sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma, doziranje je individualno, po protokolu. U odmaklom stadijumu kolorektalnog karcinoma, isključivo odraslih u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom, koji prethodno nisu primali hemoterapiju za odmakli stadijum bolesti; u kombinaciji sa cetuksimabom za lečenje bolesnika sa metastatskim kolorektalnim karcinomom koji ekspirira receptore za epidermalni faktor rasta (EGFR), a koji su prethodno neuspešno lečeni citotoksičnim lekovima među kojima je bio i irinotekan, doziranje je individualno, po protokolu.

Paralelni lekovi: Campto®, Irinotekan Sandoz®

MIXTARD® 30 PENFILL® - NOVO NORDISK PRODUCTION S.A.S - Francuska**insulin humani** - A10AD01**LEKOWI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)**

A10AD insulini i analogi, parenteralni, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva

(R) 0041558 suspenzija za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; 30i.j./mL insulina u rastvoru i 70i.j./mL

insulin izafana; uložak, 5x3 mL

Cena: 2207.60din

8600102099203

4017/2008/12 03.11.2008

30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C.

16.10.2013

Doziranje: *svi tipovi dijabetesa:* individualno; vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

NALTREXONE - HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH - Nemačka**naltrekson** - N07BB04**OSTALI LEKOWI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM****N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti**

(SZR) 1182030 film tableta; 50mg; blister, 1x7 tabl.

Cena: 1022.50din

9088882449736

3898/2008/12 23.10.2008

2 godine, bez posebnih uslova čuvanja.

23.10.2013

(SZR) 1182031 film tableta; 50mg; blister, 4x7 tabl.

Cena: 4092.00din

9088882449750

3897/2008/12 23.10.2008

2 godine, bez posebnih uslova čuvanja.

23.10.2013

Doziranje: *lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida:* dodatna terapija u okviru sveobuhvatnog programa lečenja, koje uključuje i psihološki nadzor. Pre početka lečenja naltreksonom bolesnici ne smeju 7-10 dana da uzimaju nikakve opioide. Početno 25mg (pola tablete), pa jedna tableta na dan (50mg), sa manjom količinom tečnosti. Bolesnik treba što pomnije da se pridržava propisane terapije: tri puta nedeljno, i to 2 tablete (100mg) ponedeljkom i sredom te 3 tablete (150mg) petkom. Ne sme se primenjivati kod dece i omladine ispod 18 godina.

Paralelni lekovi: Antaxone®, Revia®

NEOSTIGMINE - COOPER S.A. - Grčka**neostigmin-metilsulfat** - N07AA01**OSTALI LEKOWI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM****N07AA antiholinesteraze**

(SZ)	0088065 rastvor za injekciju; 2.5mg/mL; ampula, 50x1 mL 2800235303017	Cena:	-
		3899/2008/12	23.10.2008
	3 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti.		23.10.2013

Doziranje: *Miastenija gravis*: odrasli 1-2.5mg i.m. ili s.c. više puta dnevno (trajanje dejstva doze je 2-4 sata); ukupna dnevna doza obično iznosi 5-20mg. *Neonatalna Myasthenia Gravis*: početno 0.1mg i.m., uobičajeno 0.05-0.25mg i.m. ili 0.03mg/kg i.m, svakih 2-4 sata. Zbog samo-ograničavajuće prirode bolesti kod neonatusa, dnevno doziranje treba redukovati sve dok lek ne bude prestao da se daje. Deca ispod 12 godina starosti: prema potrebi 0.2-0.5mg. *Nedepolarišuća neuromuskularna blokada*: odrasli i deca jedna pojedinačna doza 0.05-0.07mg/kg telesne težine i atropin od 0.02-0.03mg/kg telesne težine, sporom i.v. inj. u trajanju od jedne minute, maks. doza kod odraslih je 5mg, a kod dece 2.5mg.

NIRYPAN® - JUGOREMEDIJ A.D. ZRENJANIN - Srbija**metilprednizolon** - H02AB04**KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU****H02AB glukokortikoidi**

(R)	1047180 tableta; 8mg; blister, 4x5 kom 8608811001920	Cena:	325.6din
		3907/2008/12	23.10.2008
	5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.		23.10.2013

Doziranje: *supresija inflamatornih i alergijskih poremećaja*: doziranje je individualno i zavisi od konkretne terapijske indikacije, pri čemu je uobičajeni raspon doza kod odraslih 4-40mg/dan, a kod dece starije od 6 godina 0.8-1.2mg/kg/dan.

Paralelni lekovi: Lemod**NOLPAZA® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija****pantoprazol** - A02BC02**LEKOWI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA****A02BC inhibitori protonске pumpe**

(R)	1122920 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 3838989541842	Cena:	661.70din
		2642/2008/12	20.08.2008
	2 godine, bez posebnih uslova.		20.08.2013
(R)	1122921 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 2x14 kom 3838989541859	Cena:	1311.50din
		2640/2008/12	20.08.2008
	2 godine, bez posebnih uslova.		20.08.2013
(R)	1122922 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 2x15 kom 3838989541866	Cena:	-
		2652/2008/12	20.08.2008
	2 godine, bez posebnih uslova.		20.08.2013
(R)	1122923 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 4x15 kom 3838989541880	Cena:	-
		2663/2008/12	20.08.2008
	2 godine, bez posebnih uslova.		20.08.2013
(R)	1122924 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 4x14 kom 3838989541873	Cena:	-
		2664/2008/12	20.08.2008
	2 godine, bez posebnih uslova.		20.08.2013

Doziranje: *ulkus duodenuma*: preporučena doza je 40mg, tokom 2 nedelje, po potrebi 4 nedelje; *umereni i teški refluksni ezofagitis, ulkus želuca*: preporučena doza je 40mg (izuzetno 80mg) na dan, tokom 4 nedelje; *eradikacija Helicobacter pylori i druga stanja sa hipersekrecijom želudačne kiseline*: preporučena doza je 2 puta dnevno po 40mg (pre doručka i pre večere), u trajanju od 1 nedelje, u kombinaciji sa amoksicilin/klaritromicin, klaritromicin/metronidazol ili amoksicilin/metronidazol, po protokolu; *Zolinger Ellisonov sindrom*: početna doza iznosi 80mg na dan, podeljeno u 2 doze; doza održavanja 15-30mg jednom dnevno. **Tabl. ne treba lomiti ni žvakati, treba popiti sa vodom, pre ili za vreme doručka.**

Paralelni lekovi: Controloc®, Pulcet®

OMICRAL - LABORATORIOS LICONSA S.A. - Španija**itrakonazol** - J02AC02**ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU****J02AC derivati triazola**

(R)	1327505 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 5999880025706 2 godine, na temperaturi do 30°C.	Cena:	-
		4492/2008/12	15.12.2008 15.12.2013
(R)	1327506 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 4x7 kom 5999880025713 2 godine, na temperaturi do 30°C.	Cena:	-
		4493/2008/12	15.12.2008 15.12.2013
(R)	1327507 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom 5999880025690 2 godine, na temperaturi do 30°C.	Cena:	-
		4490/2008/12	15.12.2008 15.12.2013

Doziranje: *orofaringealna kandidijaza:* 100mg/dan tokom 15 dana (200mg/dan tokom 15 dana kod pacijenata koji imaju AIDS ili neutropeniju); *vulvovaginalna kandidijaza:* 2 puta po 200mg u jednom danu; *Pityriasis versicolor:* 200mg/dan tokom 7 dana; *Tinea corporis i tinea cruris:* 100mg/dan tokom 15 dana ili 200mg/dan tokom 7 dana; *Tinea pedis i tinea manuum:* 100mg/dan tokom 30 dana ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana; *ohinomikoze:* 200mg/dan tokom 3 meseca ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana u 2-3 ciklusa (nakon 21 dan pauze); *sistemske aspergiloze, kandidijaze i kriptokokoze, nakon neuspeha prethodne terapije:* 200mg/dan tokom 3 meseca (2 puta po 200mg/dan kod kriptokoknog meningitisa i drugih invazivnih infekcija) i uz održavanje terapije sa 200mg/dan kod pacijenata koji imaju AIDS ili neutropeniju. Ne preporučuje se kod dece mlađe od 12 godina.

Paralelni lekovi: Funit, Kanazol®, Prokanazol®**ONIRUX® - HABIT PHARM A.D. - Srbija****sertralín** - N06AB06**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R)	1072812 film tableta; 100mg; blister, 2x15 kom 8606010720277 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena:	1067.10din
		3937/2008/12	23.10.2008 23.10.2013
(R)	1072813 film tableta; 50mg; blister, 2x15 kom 8606010720260 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena:	592.30din
		3938/2008/12	23.10.2008 23.10.2013

Doziranje: *terapija simptoma depresivnog oboljenja sa pridruženom anksioznošću:* kod odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se (ukoliko je potrebno) postupno povećavati za 50mg u toku nekoliko nedelja, do maks. doze od 200mg/dan, uobičajena doza održavanja je 50mg/dan, ne primenjuje se kod osoba mlađih od 18 godina; *opsesivno-kompulsivni poremećaj:* kod dece starije od 13 godina, adolescenata i odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se postupno povećati do najviše 200mg/dan (za 50 mg u toku nekoliko nedelja), kod dece uzrasta 6-12 godina inicijalna doza od 25mg/dan može se povećati nakon 7 dana na 50mg/dan i potom u intervalima od najmanje 7 dana do najviše 200mg/dan.

Paralelni lekovi: Asentra®, Optibel®, Serlift®, Sertiva®, Sertralín ICP®, Setalof®®, Sidata, Zolof®®**OXALIPLATIN „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija****oksaliplatin** - L01XA03**ANTINEOPLASTICI****L01XA jedinjenja platine**

(SZ)	0031502 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica staklena, 1x100 mg 9088882465392 2 godine, bez posebnih naznaka.	Cena:	24746.80din
		4234/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(SZ)	0031503 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica staklena, 1x50 mg 9088882465408 2 godine, bez posebnih naznaka.	Cena:	12502.00din
		4231/2008/12	25.11.2008 25.11.2013

Doziranje: *adjuvantni tretman stadijuma III (Dukes-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora,* u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m²,

ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); *metastatski karcinom kolona*: 85mg/m² i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje.

Paralelni lekovi: Eloxatin®, Oxaliplatin, Oxaliplatin Pliva-Lachema 100, Oxaliplatin Pliva-Lachema 50, Sinoxal®

PREVENAR - WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija

pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana - J07AL02

VAKCINE

J07AL vakcine protiv pneumokoka

- (Z) 0011920 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; (2mcg+4mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+20mcg)/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL **Cena:** -
8606007080445 3311/2008/12 02.10.2008
3 godine, na temperaturi 2-8°C, ne zamrzavati. 02.10.2013

Doziranje: *aktivna imunizacija protiv infekcija koje uzrokuje Streptococcus pneumoniae* (serotipovi 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F), *uključujući sepsu, meningitis, pneumoniju, bakteriemiju i akutni otitis media* – kod visokorizične dece uzrasta 2-6 meseci daju se 3 doze od 0,5mL u vidu i.m. inj. prema sledećem rasporedu: prva doza - sa navršenih 2 meseca života, druga doza - 2 meseca posle prve doze i treća doza - 12 meseci posle prve doze; kod dece uzrasta do 2 godine koja prethodno nisu vakcinisana daju se 2 doze uz razmak od najmanje 2 meseca između pojedinih doza; kod dece uzrasta 2-5 godina koja nisu prethodno vakcinisana daje se samo jedna doza.

PRITORPLUS® - BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka

telmisartan, hidrohlorotiazid - C09DA07

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici

- (R) 1401050 tableta; 80mg+12.5mg; blister, 4x7 kom **Cena:** 1533.10din
8606007910346 4481/2008/12 15.12.2008
2 godine, na sobnoj temperaturi. 25.12.2008
- (R) 1401051 tableta; 40mg+12.5mg; blister, 4x7 kom **Cena:** 1364.10din
8606007910339 4480/2008/12 15.12.2008
2 godine, na sobnoj temperaturi. 25.12.2008

Doziranje: *terapija esencijalne arterijske hipertenzije koja se ne može adekvatno kontrolisati telmisartanom u monoterapiji:* uobičajena inicijalna doza je 40mg telmisartana i 12.5mg hidrohlorotiazida dnevno, ova doza se posle najmanje 4 nedelje terapije može povećati (ukoliko je potrebno) do najviše 80mg telmisartana i 12.5mg hidrohlorotiazida dnevno.

Paralelni lekovi: Micardis® Plus

PROTONEXA - LABORATORIOS LICONSA S.A. - Španija

lansoprazol - A02BC03

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

- (R) 1122950 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 2x7 kom **Cena:** -
5999880025737 4269/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. 25.11.2013
- (R) 1122951 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 4x7 kom **Cena:** -
5999880025744 4268/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. 25.11.2013
- (R) 1122952 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 1x7 kom **Cena:** -
5999880025720 4266/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. 25.11.2013
- (R) 1122953 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 2x7 kom **Cena:** -
5999880025775 4267/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. 25.11.2013

(R)	1122954 gastorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 4x7 kom 5999880025782	Cena: 4270/2008/12	- 25.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.		25.11.2013
(R)	1122955 gastorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x7 kom 5999880025768	Cena: 4265/2008/12	- 25.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.		25.11.2013

Doziranje: *benigni gastrični ulkus:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 8 nedelja; *duodenusni ulkus:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 4 nedelje i održavanje sa 15mg/dan; *duodenusni ili gastrični ulkus usled primene NSAID: lečenje* 30mg/dan tokom 4 nedelje i ako je potrebno još 4 nedelje, *profilaksa* 15-30mg/dan; *eradikacija H. Pylori:* 2 puta po 30mg/dan uz amoksisilin 2 puta po 1g/dan ili klaritromicin 2 puta po 500mg/dan ili metronidazol 2 puta po 400 mg/dan; *Zollinger-Ellison-ov sindrom:* inicijalna doza 60mg/dan ili 2 puta po 60mg/dan prilagođava se odgovoru; *gastroezofagusni refluks:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 4 nedelje i ako je potrebno još 4 nedelje i održavanje sa 15-30mg/dan; *dispepsija usled hiperaciditeta:* 15-30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 2-4 nedelje.

Paralelni lekovi: Amarin, Lansobel®, Lansoprazol ICP®, Lanzul®, Lanzul® S, Sabax®

RANITAL® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

ranitidin - A02BA02

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BA antagonisti H2-receptora

(R)	1128705 film tableta; 150mg; blister, 2x10 kom 8606007082470	Cena: 4069/2008/12	232.70din 10.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°, zaštićeno od svetlosti i vlage.		09.01.2011
(R)	1128706 film tableta; 300mg; blister, 2x10 kom 8606007082487	Cena: 4070/2008/12	439.70din 10.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°, zaštićeno od svetlosti i vlage.		09.01.2011

Doziranje: *benigni gastrični i duodenusni ulkusi:* 2 puta po 150mg/dan ili 300mg u jednoj večernjoj dozi tokom 4-8 nedelja (deca mlađa od 12 godina: 2 puta po 2-4mg/kg/dan do maks. 150mg/dan, tokom 4-8 nedelja); *duodenusni ili gastrični ulkusi usled primene NSAID: lečenje* 2 puta po 150mg/dan ili 300mg u jednoj večernjoj dozi tokom 8 nedelja ili 2 puta po 300mg tokom 4 nedelje, *profilaksa* 2 puta po 300mg/dan; *Zollinger-Ellison-ov sindrom:* 3 puta po 150mg/dan ili 3 puta po 300mg/dan (doze mogu biti veće ili učestalije, ako je potrebno); *gastroezofagusni refluks:* 2 puta po 150mg/dan ili 300mg u jednoj večernjoj dozi ili 2 puta po 300mg/dan (teži oblici) tokom 8 ili 12 nedelja, *dugotrajni tretman:* 2 puta po 150mg/dan; *hronična epizodična dispepsija:* 2 puta po 150mg/dan ili 300mg u jednoj večernjoj dozi tokom 6 nedelja.

Paralelni lekovi: Ranisan®, Ranitidin, Ransana, Ulcodin®, Ulcogot®

RAPIDOL (ranije IBUPROFEN PHARMASWISS) - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

ibuprofen - M01AE01

ANTIINFLAMATORNI

I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01AE derivati propionske kiseline

(BR)	1162511 film tableta; 200mg; blister, 3x10 tabl. 8606007082319	Cena: 3934/2008/12	106.20din 23.10.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.		23.10.2013
(R)	1162512 film tableta; 400mg; blister, 3x10 tabl. 8606007082326	Cena: 3931/2008/12	121.30din 23.10.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.		23.10.2013
(R)	1162513 film tableta; 600mg; blister, 3x10 tabl. 8606007082333	Cena: 3933/2008/12	175.50din 23.10.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.		23.10.2013

Doziranje: *reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, osteoartritis i druge nereumatoidne artropatije, juvenilni reumatoidni artritis ili Still-ova bolest, analgetik (blagi do umereni bolovi) i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 godina* početna doza 400mg, a dnevna doza je 1200-1800mg dnevno podeljeno u 3-4 pojedinačne doze, posle jela,

maks. 2400mg dnevno podjeljenih u doze; deca: 20mg/kg/dan podjeljeno u doze, kod juvenilnog reumatoidnog artritisa do 40mg/kg/dan. Ne preporučuje se kod dece koja teže manje od 7kg.

Paralelni lekovi: Brufen®, Ibu-Hemofarm, Ibuprofen, Nurofen, Nurofen Active, Nurofen Liquid, Rapidol®, Rupan, Spedifen®, Upfen

RASETRON® - ACTAVIS LTD - Malta

granisetron - A04AA02

ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE

A04AA antagonisti serotonina (5-HT3)

(R)	1124100 film tableta; 1mg; blister, 1x10 kom 5690528185034 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 5522.40din 3234/2008/12 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1124101 film tableta; 1mg; blister, 1x1 kom 5690528185010 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 552.10din 3232/2008/12 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1124102 film tableta; 2mg; blister, 1x10 kom 5690528185065 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 8788.80din 3235/2008/12 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1124103 film tableta; 2mg; blister, 1x1 kom 5690528185041 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 889.60din 3233/2008/12 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1124104 film tableta; 2mg; blister, 1x5 kom 5690528185058 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 889.60din 3236/2008/12 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1124105 film tableta; 1mg; blister, 1x5 kom 5690528185027 3 godine, bez posebnih naznaka.	Cena: 2761.00din 3237/2008/12 17.09.2008 17.09.2013

Doziranje: *prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom ili radioterapijom:* odrasli i deca starija od 12 godina (telesna masa veća od 50 kg) dva puta dnevno po 1mg ili 2mg jednom dnevno u trajanju do jedne nedelje prateći citostatsku terapiju; prvu dozu treba uzeti jedan sat pre početka citostatske terapije. Nije pogodan za primenu kod dece telesne mase manje od 50kg, odnosno mlađe od 12 godina.

Paralelni lekovi: Kytril®

RASOLTAN® - ACTAVIS HF. - Island

losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni

(R)	1103909 film tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 5690528161281 2 godine, na temperaturi do 25°C.	Cena: - 4224/2008/12 25.11.2008 25.11.2013
-----	---	---

Doziranje: *hipertenzija:* odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno; *hipertenzija sa hipertrofijom leve komore:* uobičajena početna doza je 50mg, jednom dnevno, maks. 100mg dnevno; *dijabetička nefropatija* (diabetes mellitus (tip2)) udružena sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno; stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno; *deca* od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno, maks. 50mg dnevno; *deca* preko 50kg telesne mase 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno.

Paralelni lekovi: Cozaar®, Erynorm®, Lakea®, Lorista®, Losartan, Losartice®, Lotar®

RECOMBINATE 1000 - BAXTER S.A. - Belgija

oktokog alfa - B02BD02

ANTIHEMORAGICI

B02BD faktori koagulacije krvi

(SZ)	0066911 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 mL 5413760344898 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C.	Cena: 68371.90din 3312/2008/12 02.10.2008 02.10.2013
------	--	---

- (SZ) 0066912 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 mL
Cena: -
 5413760232058 3307/2008/12 02.10.2008
 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. 02.10.2013

Doziranje: *profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A* (urođeni nedostatak faktora VIII): doze i trajanje terapije određuju se individualno, zavisno od težine krvarenja, i.v. ili kontinuiranom infuzijom. (ne sadrži von Willebrand-ov faktor i nije indikovano za von Willebrand-ovu bolest).

Paralelni lekovi: Kogenate® Bayer, Recombinate 250, Recombinate 500

RECOMBINATE 250 - BAXTER S.A. - Belgija

oktokog alfa - B02BD02

ANTIHEMORAGICI

B02BD faktori koagulacije krvi

- (SZ) 0066909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 mL
Cena: -
 5413760344874 3314/2008/12 02.10.2008
 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. 02.10.2013
- (SZ) 0066913 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 mL
Cena: 17093.40din
 5413760232034 3306/2008/12 02.10.2008
 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. 02.10.2013

Doziranje: *profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A* (urođeni nedostatak faktora VIII): doze i trajanje terapije određuju se individualno, zavisno od težine krvarenja, i.v. ili kontinuiranom infuzijom. (ne sadrži von Willebrand-ov faktor i nije indikovano za von Willebrand-ovu bolest).

Paralelni lekovi: Kogenate® Bayer, Recombinate 1000, Recombinate 500

RECOMBINATE 500 - BAXTER S.A. - Belgija

oktokog alfa - B02BD02

ANTIHEMORAGICI

B02BD faktori koagulacije krvi

- (SZ) 0066910 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 mL
Cena: -
 5413760344881 3313/2008/12 02.10.2008
 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. 02.10.2013
- (SZ) 0066914 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./10mL; liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 mL
Cena: 33923.20din
 5413760174679 3309/2008/12 02.10.2008
 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. 02.10.2013

Doziranje: *profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A* (urođeni nedostatak faktora VIII): doze i trajanje terapije određuju se individualno, zavisno od težine krvarenja, i.v. ili kontinuiranom infuzijom. (ne sadrži von Willebrand-ov faktor i nije indikovano za von Willebrand-ovu bolest).

Paralelni lekovi: Kogenate® Bayer, Recombinate 1000, Recombinate 250

SIMVAX® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

simvastatin - C10AA01

**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
 U SERUMU (HIPOLIPEMICI)**

C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze

- (R) 1104130 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom
Cena: -
 3858881059535 3224/2008/12 16.09.2008
 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. 16.09.2013
- (R) 1104131 film tableta; 10mg; blister, 1x28 kom
Cena: -
 3858881059542 3228/2008/12 16.09.2008
 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. 16.09.2013
- (R) 1104132 film tableta; 20mg; blister, 2x10 kom
Cena: -
 3858881059559 3225/2008/12 16.09.2008
 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. 16.09.2013

(R)	1104133 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom 3858881059566 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.	Cena: 3229/2008/12	- 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1104134 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom 3858881059511 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.	Cena: 3226/2008/12	- 16.09.2008 16.09.2013
(R)	1104135 film tableta; 40mg; blister, 2x14 kom 3858881059528 3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.	Cena: 3230/2008/12	- 16.09.2008 16.09.2013

Doziranje: *hiperholesterolemija*: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče), po potrebi povećati svake 4 nedelje do maks.doze 80 mg/dan (primenjeno kao jedna doza uveče); *koronarna bolest i rizik od koronarnog oboljenja srca, prevencija kardiovaskularnog oboljenja uključujući pacijente sa dijabetesom, istorijom moždanog udara ili drugim cerebrovaskularnim bolestima, bolestima perifernog vaskularnog sistema*: 40mg/dan (uveče), doza se može povećati do 80 mg; *porodična homozigotna hiperholesterolemija*: 40mg odjednom uveče ili 80 mg podeljeno u tri doze, večernja doza je najveća.

Paralelni lekovi: Cholibam, Hollesta, Simva Sandoz®, Simvabel®, Simvastatin, Simvastatin ICP®, Simvor®, Vasilip®, Zocor®

SIMVOR® - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska

simvastatin - C10AA01

**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)**

C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze

(R)	1104500 film tableta; 10mg; blister, 4x7 kom 5999553010114 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 3269/2008/12	371.40din 05.11.2008 12.09.2013
(R)	1104501 film tableta; 20mg; blister, 4x7 kom 5999553010121 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 3270/2008/12	707.80din 05.11.2008 12.09.2013
(R)	1104502 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom 5999553010138 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 3271/2008/12	1101.40din 05.11.2008 12.09.2013

Doziranje: *hiperholesterolemija*: početna doza 5-10 mg/dan oralno (odjednom uveče), po potrebi povećati svake 4 nedelje do maks.doze 80mg/dan (primenjeno kao jedna doza uveče); *koronarna bolest i rizik od koronarnog oboljenja srca, prevencija kardiovaskularnog oboljenja uključujući pacijente sa dijabetesom, istorijom moždanog udara ili drugim cerebrovaskularnim bolestima, bolestima perifernog vaskularnog sistema*: 40mg/dan (uveče), doza se može povećati do 80mg; *porodična homozigotna hiperholesterolemija*: 40mg odjednom uveče ili 80 mg podeljeno u tri doze, večernja doza je najveća.

Paralelni lekovi: Cholibam, Hollesta, Simva Sandoz®, Simvabel®, Simvastatin, Simvastatin ICP®, Simvax®, Vasilip®, Zocor®

SIMVOR® - MEDICO UNO D.O.O. - Srbija

simvastatin - C10AA01

**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)**

C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze

(R)	1104500 film tableta; 10mg; blister, 4x7 kom 8606105717014 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 165/2009/12	371.40din 26.01.2009 12.09.2013
(R)	1104501 film tableta; 20mg; blister, 4x7 kom 8606105717021 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 166/2009/12	707.80din 26.01.2009 12.09.2013
(R)	1104502 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom 8606105717038 2 godine, na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.	Cena: 167/2009/12	1101.40din 26.01.2009 12.09.2013

Doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče), po potrebi povećati svake 4 nedelje do maks.doze 80mg/dan (primenjeno kao jedna doza uveče); koronarna bolest i rizik od koronarnog oboljenja srca, prevencija kardiovaskularnog oboljenja uključujući pacijente sa dijabetesom, istorijom moždanog udara ili drugim cerebrovaskularnim bolestima, bolestima perifernog vaskularnog sistema: 40mg/dan (uveče), doza se može povećati do 80mg; porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg podeljeno u tri doze, večernja doza je najveća.

Paralelni lekovi: Cholibam, Hollesta, Simva Sandoz®, Simvabel®, Simvastatin, Simvastatin ICP®, Simvax®, Vasilip®, Zocor®

SMERTOPRAZOL® - HABIT PHARM A.D. - Srbija

omeprazol - A02BC01

LEKOWI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

(R)	1122930 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 10mg; blister, 2x7 kom	Cena: 369.40din
	8606010720284	4112/2008/12 13.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C.	13.11.2013
(R)	1122931 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom	Cena: 560.80din
	8606010720291	4111/2008/12 13.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C.	13.11.2013
(R)	1122932 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 40mg; blister, 2x7 kom	Cena: 1096.90din
	8606010720307	4113/2008/12 13.11.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C.	13.11.2013

Doziranje: *ulkus duodenuma* 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje, ili 8 nedelja (*ulkus želudca*); *refluksni ezofagitis*: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; *prevencija recidiva ulkusa, refluksnog ezofagitisa i oštećenja sluznice GIT*: 10mg dnevno; *Zollinger-Ellison-ov sindrom*: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja); *eradikacija Helicobacter pilory*: po protokolu zajedno sa antimikrobnim lekovima. Terapija i dozni režim kod dece starije od 4 godine zavisi od indikacije, starosnog doba i telesne mase, a treba da se sprovodi pod nadzorom lekara specijaliste.

Paralelni lekovi: Loseprazol®, Omep, Omeprazid®, Omeprazol ICP®, Omeprazol®, Omezol®, Omnibel®, Ortalex®

SOLABAN - HEMOFARM AD - Srbija

lamotrigin - N03AX09

ANTIPILEPTICI

N03AX ostali antiepileptici

▲ (R)	1084785 tableta za oralnu suspenziju; 100mg; blister, 3x10 kom	Cena: 1382.80din
	8600097411394	3125/2008/12 10.09.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka.	10.09.2013
▲ (R)	1084786 tableta za oralnu suspenziju; 25mg; blister, 3x10 kom	Cena: 429.20din
	8600097411387	3123/2008/12 10.09.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka.	10.09.2013
▲ (R)	1084787 tableta za oralnu suspenziju; 5mg; blister, 3x10 kom	Cena: 304.90din
	8600097411363	3122/2008/12 10.09.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka.	10.09.2013
▲ (R)	1084788 tableta za oralnu suspenziju; 50mg; blister, 3x10 kom	Cena: 919.10din
	8600097411370	3124/2008/12 10.09.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka.	10.09.2013

Doziranje: *epilepsija, Lennox-Gastaut sindrom*: odrasli i deca starija od 12 godina, početna doza 25mg jednom dnevno; doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno, a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora; uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) je 100-400mg dnevno; deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Preporučuje se za *prevenciju epizoda promene raspoloženja kod odraslih pacijenata* (starijih od 18 godina) sa bipolarnim afektivnim poremećajem, posebno kod pacijenata sa rizikom od pojave depresivnih epizoda. Ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.

Paralelni lekovi: Arvind®, Epitrigine®, Lamal, Lamect®, Lamictal™, Lamictal®, Lamotrigin, Lamotrix®

TASIGNA® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**nilotinib** - L01XE08**ANTINEOPLASTICI****L01XE inhibitori protein kinaze**

(SZ) 1039710 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 8x14 kom

8606103543363

18 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

Cena:

3918/2008/12 23.10.2008

23.10.2013

Doziranje: *hronična i ubrzana faza Philadelphia hromozom pozitivne hronične mijelogene leukemije (CML)* kod odraslih pacijenata otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju (uključujući imatinib): 400mg dnevno podeljeno u dve doze (na 12 sati). Lek se ne sme uzimati sa hranom; ne treba unositi hranu najmanje 2 sata pre uzimanja leka i bar još jedan sat posle uzimanja leka. Ne preporučuje se upotreba kod dece i adolescenata mlađjih od 18 godina.

TENSEC - HEMOFARM AD - Srbija**bisoprolol** - C07AB07**BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA****C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni**

(R) 1107022 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom

8600097403719

2 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Cena:

3118/2008/12 10.09.2008

10.09.2013

(R) 1107023 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom

8600097403726

2 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Cena:

3117/2008/12 10.09.2008

10.09.2013

Doziranje: *hipertenzija; hronična stabilna angina pektoris:* individualno, početna doza je 5mg dnevno, uobičajena doza 10mg dnevno, maks. preporučena doza je 20mg dnevno. Tableta se uzima ujutru, progutati sa tečnošću i bez žvakanja. Ne preporučuje se primena leka kod dece uzrasta do 12 godina i adolescenata.

Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, Concor®, Concor® COR**TENSEC PLUS - HEMOFARM AD - Srbija****bisoprolol, hidrohloriazid** - C07BB07**BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA****C07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi**

(R) 1107024 film tableta; 5mg+12.5mg; blister, 3x10 kom

8600097410779

3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Cena:

3115/2008/12 10.09.2008

10.09.2013

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* kod pacijenata kod kojih krvni pritisak nije adekvatno kontrolisan pojedinačnim komponentama, uobičajeno 1 tableta dnevno. Tabl. progutati celu, sa malo tečnosti, uz doručak. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba, preporučuje se primena najmanje efektivne doze. Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: Lodoz®**THYROZOL® - MERCK KGaA - Nemačka****tiamazol** - H03BB02**TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE)****H03BB derivati imidazola sa sumporom**

(R) 1040250 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

4022536713021

4 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Cena:

3924/2008/12 23.10.2008

23.10.2013

(R) 1040251 film tableta; 20mg; blister, 2x10 kom

4022536713038

4 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Cena:

3925/2008/12 23.10.2008

23.10.2013

(R) 1040252 film tableta; 5mg; blister, 2x10 kom

4022536645933

4 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Cena:

3919/2008/12 23.10.2008

23.10.2013

Doziranje: *hipertireoidizam:* odrasli, početna doza 20-40mg maks. dnevno; deca prosečna početna doza je 0.5mg/kg telesne težine dnevno; *profilaksa kod pacijenata sa rizikom od*

nastanka hipertireoidizma: 10-20mg dnevno i 1g perhlorata, 10 dana. Tablete se gutaju cele uz dovoljnu količinu tečnosti.

Paralelni lekovi: Tiasat

TREANA - HEMOFARM AD - Srbija

olanzapin - N05AH03

PSIHOLEPTICI

N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini

▲ (R)	1070017 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8600097410526	Cena: 6665.70din 3120/2008/12 10.09.2008
	1 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage.	10.09.2013
▲ (R)	1070018 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8600097410519	Cena: 3404.00din 3119/2008/12 10.09.2008
	1 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage.	10.09.2013

Doziranje: *shizofrenija*: preporučena početna doza za odrasle je 10mg dnevno; *manična epizoda*: početna doza u monoterapiji iznosi 15mg/dan, kod kombinovane terapije doza iznosi 10mg/dan; *prevencija recidiva manične faze bipolarnog poremećaja*: preporučena početna doza iznosi 10mg/dan. Može se uzimati pre ili posle obroka, hrana ne utiče na resorpciju leka. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata, mlađih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Zalasta®

VASOVIST® - BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

gadofosveset - V08CA11

KONTRASTNA SREDSTVA

V08CA paramagnetna kontrastna sredstva

(Z)	0199533 rastvor za injekciju; 244mg/mL; bočica staklena, 1x10 mL 8600103492508	Cena: - 3227/2008/12 16.09.2008
	3 godine, u spoljašnjoj kutiji, radi zaštite od svetlosti.	16.09.2013

Doziranje: *dijagnostička primena*: pojačanje kontrasta pri primeni angiografije magnetnom rezonancom kod sumnje ili postojanja vaskularnog oboljenja abdomena ili ekstremiteta: odrasli 0,12mg/kg telesne mase (ekvivalent 0,03 mmol/kg) kao i.v. bolus inj., u trajanju do 30 sekundi, nakon čega sledi ispiranje sa 25 do 30mL fiziološkog rastvora. Lek treba da primenjuju samo lekari sa iskustvom u ovom području dijagnostike. Ne preporučuje se primena kod mlađih od 18 godina.

VIATROMB® - PHARBIL WALTROP GMBH - Nemačka

heparin - C05BA03

VAZOPROTEKTIVI

C05BA heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu

(BR)	4108150 sprej za kožu, gel; 2400i.j./g; sprej-boca, 1x25 g 9088882459803	Cena: 504.80din 1627/2007/12 07.08.2007
	3 godine, ispod 25°C.	03.03.2011

Doziranje: *površinske tromboze, tromboflebitis, flebitis, varikoziteti vena, tvrde, zastojne vene, otečene noge, hematomi i otoci nastali pri sportskim povredama ili traumama* (hematomi, modrice, uboji, nagnječenja, iščašenja), *tendosinovitis* (upale tetiva i ovojnice): 3 puta dnevno po 3-4 puta raspršiti po obolelom predelu i blago utrljati na neoštećenu kožu; kod akutnih stanja (*tromboza, tromboflebitis, flebitis*) raspršiti sprej bez utrljavanja, terapija traje do 14 dana.

Paralelni lekovi: Heparotrombin, Lioton 1000

WELLBUTRIN® XR - GLAXO WELLCOME GMBH & CO. KG - Nemačka**bupropion** - N06AX12**OSTALI ANTIDEPRESIVI****N06AX ostali antidepressivi**

△(R) 1089140 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 300mg; bočica, 1x30 tabl.

Cena: 2615.00din

8606103683212

3940/2008/12 23.10.2008

18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju

23.10.2013

zbog zaštite od svetlosti.

△(R) 1089141 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 150mg; bočica, 1x30 tabl.

Cena: 1676.40din

8606103683205

3939/2008/12 23.10.2008

18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju

23.10.2013

zbog zaštite od svetlosti.

Doziranje: *depresija major:* odrasli preporučena početna doza je 150mg, jednom dnevno; ukoliko je potrebno, posle 4 nedelje doza se može povećati do 300mg jednom dnevno; potrebno je da postoji razmak između dve doze od najmanje 24 sata. Tabl. treba progutati celu, ne lomiti ili žvakati, uz ili nakon obroka. Terapija traje najmanje 6 meseci. Ne preporučuje se primena kod dece ili adolescenata, mlađih od 18 godina.

ZOLSANA® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija**zolpidem** - N05CF02**PSIHOLEPTICI****N05CF lekovi srodni benzodiazepinima**

▲(R) 1077303 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

Cena: 294.40din

3838989524944

3106/2008/12 10.09.2008

5 godina, u originalnom pakovanju.

10.09.2013

▲(R) 1077304 film tableta; 5mg; blister, 2x10 kom

Cena: -

3838989524951

3107/2008/12 10.09.2008

5 godina, u originalnom pakovanju.

10.09.2013

Doziranje: *kratkotrajna terapija nesanice:* odrasli, preporučena doza je 10mg, maks. 10mg dnevno. Kod starijih ili fizički slabih, kao i kod bolesnika sa insuficijencijom jetre preporučuje se doza od 5mg. Tableta se uzima sa tečnošću, neposredno pred spavanje. Ne preporučuje se primena kod dece ili adolescenata, mlađih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Belbien®, Sanval®, Stilnox®

ABECEDNI SPISAK REGISTROVANIH BILJNIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA I PARALELAMA

KLOSTERFRAU SEDINAL - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka**kantarion (*Hypericum perforatum*), suvi ekstrakt herbe** - HN06AW..**PSIHOANALEPTICI****HN06AW biljni antidepressivi**

(BR) 1072300 obložena tableta; 140mg; blister, 2x30 kom

Cena: -

4008617012375

3701/2008/12 20.10.2008

Doziranje: *slaba i srednje izražena stanja depresije, poboljšanje stanja kod psihovegetativnih smetnji i simptoma kao što su unutrašnji nemir, napetost, nervoza, razdražljivost, nesanica, stanja opšte iscrpljenosti i uzbuđenosti:* odrasli 2 puta dnevno 1 tabletu uz obrok.

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA KOJI SE MOGU IZDAVATI BEZ LEKARSKOG RECEPTA (BR)

BERLITHION® 300 BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka

kapsula, meka; 300mg; blister, 1x15 kom

kapsula, meka; 300mg; blister, 2x15 kom

BERLITHION® 600 BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka

kapsula, meka; 600mg; blister, 1x15 kom

kapsula, meka; 600mg; blister, 2x15 kom

COLDREX® HOTREM MED I LIMUN SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija

prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg; kesica, 10x5 g

COLDREX® JUNIOR HOTREM SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija

prašak za oralni rastvor; 5mg+300mg+20mg; kesica, 10x3 g

HEPALIP FORTE® BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda; 300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg; blister, 3x10 kom

IBUPROFEN PHARMASWISS PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

film tableta; 200mg; blister, 3x10 kom

LEKOVI KOJI IMAJU JAK UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI, ZA VREME TERAPIJE NIJE DOZVOLJENO UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM, NITI RAD SA MAŠINOM (▲)

- ▲ BELBIEN (zolpidem); HEMOFARM AD – Srbija
- ▲ TREANA (olanzapin); HEMOFARM AD - Srbija
- ▲ ZOLSANA® (zolpidem); KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

LEKOVI KOJI MOGU UTICATI NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI (△)

- △ WELLBUTRIN® XR (bupropion); GLAXO WELLCOME GMBH & CO. KG - Nemačka

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE SU IZDATA REŠENJA O PRESTANKU VAŽNOSTI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET

Lek	Broj i datum rešenja o registraciji	Broj i datum rešenja o ukidanju
<p>PRIORIX™ - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija <i>vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)</i> (Z) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 3log CCID50+3.7log CCID50+3log CCID50; liubočica sa rastvaračem u špricu, 1x0.5 ml</p>	515-04-2704-1 od 05.11.03	4558/2008/12 od 25.12.2008

ANATOMSKO TERAPIJSKO HEMIJSKA KLASIFIKACIJA NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

A

**ALIMENTARNI TRAKT I
METABOLIZAM (LEKOVI KOJI
DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG
SISTEMA I METABOLIZMA)**

A02

**LEKOVI ZA POREMEĆAJE
ACIDITETA**

**A02B lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i
gastroezofagusnog refluksa**

A02BA antagonisti H₂-receptora

A02BA02 ranitidin
oralno

RANITAL®; PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
film tableta; 150mg; blister, 2x10 kom
film tableta; 300mg; blister, 2x10 kom

A02BC inhibitori protonске pumpe

A02BC01 omeprazol
oralno

SMERTOPRAZOL®; HABIT PHARM A.D. - Srbija
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 10mg; blister, 2x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 40mg; blister, 2x7 kom

A02BC02 pantoprazol
oralno

CONTROLOC®; NYCOMED LIMITED - Irska
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom,

**NOLPAZA®; KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija**
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 2x14 kom
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 2x15 kom
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 4x14 kom
gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 4x15 kom

A02BC03 lansoprazol
oralno

PROTONEXA; LABORATORIOS LICONSA S.A. - Španija
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 1x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 2x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 4x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 2x7 kom
gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 4x7 kom

A04

**ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV
NAUZEJE**

A04A antiemetici i sredstva protiv nauzeje

A04AA antagonisti serotonina (5-HT₃)

A04AA02 granisetron
oralno

RASETRON®; ACTAVIS LTD - Malta

film tableta; 1mg; blister, 1x1 kom
film tableta; 1mg; blister, 1x5 kom
film tableta; 1mg; blister, 1x10 kom
film tableta; 2mg; blister, 1x1 kom
film tableta; 2mg; blister, 1x5 kom
film tableta; 2mg; blister, 1x10 kom

A05

**TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH
PUTEVA I JETRE**

A05B terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi

A05BA preparati u terapiji bolesti jetre

**A05BA.. esencijalni fosfolipidi, nikotinamid,
piridoksin, riboflavin, tiamin,
tokoferolacetat**
oralno

**HEPALIP FORTE®;
BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina**
kapsula, tvrda; 300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg;
blister, 3x10 kom

A10

**LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)**

A10A insulini i analozi

**A10AB insulini i analozi, parenteralni,
kratkog dejstva**

A10AB01 insulin humani
parenteralno

**ACTRAPID® PENFILL®; NOVO NORDISK
PRODUCTION S.A.S - Francuska**
rastvor za injekciju u ulošku; 100i.j./ml; uložak, 5x3 ml

**A10AC insulini i analozi, parenteralni,
srednje dugog dejstva**

A10AC01 insulin humani
parenteralno

**INSULATARD® PENFILL®; NOVO NORDISK
PRODUCTION S.A.S - Francuska**
suspenzija za injekciju u ulošku; 100i.j./ml; uložak, 5x3 ml

A10AD insulini i analozi, parenteralni, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva

A10AD01 insulin humani
parenteralno

MIXTARD® 30 PENFILL®; NOVO NORDISK PRODUCTION S.A.S - Francuska

suspenzija za injekciju u ulošku; 100i.j./ml; uložak, 5x3 ml

A10B lekovi koji snižavaju glukozu u krvi, isključujući insuline

A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje

A10BB12 glimepirid
oralno

DIBIGLIM®; LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

tableta; 3mg; blister, 3x10 kom

tableta; 1mg; blister, 3x10 kom

tableta; 4mg; blister, 3x10 kom

tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

B

KRV I KRVOTVORNI ORGANI (LEKOV I ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA)

B02

ANTIHEMORAGICI

B02B vitamin K i drugi hemostatici

B02BD faktori koagulacije krvi

B02BD02 oktokog alfa
parenteralno

RECOMBINATE 1000; BAXTER S.A. - Belgija
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 ml
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 ml

RECOMBINATE 250; BAXTER S.A. - Belgija
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 ml
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 ml

RECOMBINATE 500; BAXTER S.A. - Belgija
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1x10 ml
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./10ml;
liobočica sa rastvaračem (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju), 1x10 ml

B05

SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05A krv i slični proizvodi

B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme

B05AA01 albumin, humani
parenteralno

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER; BAXTER AG - Austrija

rastvor za infuziju; 20%; bočica, 1x50 ml
rastvor za infuziju; 20%; bočica, 1x100 ml

C

KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOV I KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)

C01

TERAPIJA BOLESTI SRCA

C01C STIMULANSI SRČANOG RADA, ISKLJUČUJUĆI SRČANE GLIKOZIDE

C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi

C01CA04 dopamin
parenteralno

DOPAMIN ADMEDA 200; WULFING PHARMA GMBH - Nemačka
koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10ml; ampula, 5x10 ml

DOPAMIN ADMEDA 50; WULFING PHARMA GMBH - Nemačka
koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/5ml; ampula, 5x5 ml

C05

VAZOPROTEKTIVI

C05B antivarikozna terapija

C05BA heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu

C05BA03 heparin
lokalno

VIATROMB®; PHARBIL WALTROP GMBH - Nemačka
sprej za kožu, gel; 2400i.j./g; sprej-boca, 1x25 g

C07

BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C07A blokatori beta adrenergičkih receptora

C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni

C07AB07 bisoprolol
oralno

TENSEC; HEMOFARM AD - Srbija
film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom
film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom

C07B beta adrenergički blokatori i tiazidi
C07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi

C07BB07 bisoprolol, hidrohloriazid
oralno

TENSEC PLUS; HEMOFARM AD - Srbija
 film tableta; 5mg+12.5mg; blister, 3x10 kom

C09 LEKOVİ KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09C antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni

C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni

C09CA01 losartan
oralno

RASOLTAN®; ACTAVIS HF. - Island
 film tableta; 50mg; blister, 2x14 kom

C09D antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije

C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici

C09DA07 telmisartan, hidrohloriazid
oralno

PRITORPLUS®; BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka
 tableta; 40mg+12.5mg; blister, 4x7 kom
 tableta; 80mg+12.5mg; blister, 4x7 kom

C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

C10A lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida

C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze

C10AA01 simvastatin
oralno

SIMVAX®;
 JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom
 film tableta; 10mg; blister, 1x28 kom
 film tableta; 20mg; blister, 2x10 kom
 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom
 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom
 film tableta; 40mg; blister, 2x14 kom

SIMVOR®; CEMELOG-BRS Kft - Mađarska
 film tableta; 10mg; blister, 4x7 kom
 film tableta; 20mg; blister, 4x7 kom
 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom

SIMVOR®; MEDICO UNO D.O.O. - Srbija
 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom
 film tableta; 20mg; blister, 4x7 kom
 film tableta; 10mg; blister, 4x7 kom,

H

HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE

H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02A kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni

H02AB glukokortikoidi

H02AB04 metilprednizolon
oralno

NIRYPAN®;
 JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
 tableta; 8mg; blister, 4x5 kom

H03 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE)

H03B antitireoidni preparati

H03BB derivati imidazola sa sumporom

H03BB02 tiamazol
oralno

THYROZOL®; MERCK KGaA - Nemačka
 film tableta; 20mg; blister, 2x10 kom
 film tableta; 5mg; blister, 2x10 kom
 film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

J

ANTIINFektivNI LEKOVİ ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVİ ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01F makrolidi, linkozamidi i streptogramini

J01FA makrolidi

J01FA10 azitromicin
oralno

AZAX®; NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
 film tableta; 500mg; blister, 1x3 kom

J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J02A antimikotici za sistemsku primenu

J02AC derivati triazola

J02AC02 itraconazol
oralno

OMICRAL; LABORATORIOS LICONSA S.A. - Španija
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 4x7 kom

J05

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

- J05A** lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
- J05AE** inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze)
- J05AE..** lopinavir, ritonavir
oralno

ALUVIA®; ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka
film tableta; 200mg+50mg; bočica, 1x120 kom

J07

VAKCINE

- J07A** bakterijske vakcine
- J07AL** vakcine protiv pneumokoka
- J07AL02** pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
parenteralno

PREVENAR;
WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija
suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(2mcg+4mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+20mcg)
/0.5ml; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 ml

L

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

L01

ANTINEOPLASTICI

- L01B** antimetaboliti
- L01BC** analozi pirimidina
- L01BC05** gemcitabin
parenteralno

GEMCITABIN SANDOZ®; SANDOZ S.A. - Argentina
prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1 g
prašak za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200 mg

- L01X** ostali antineoplastici
- L01XA** jedinjenja platine
- L01XA02** karboplatin
parenteralno

CARBOPLASIN®;
S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/ml;
bočica staklena, 1x5 ml
koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/ml;
bočica staklena, 1x15 ml
koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/ml;
bočica staklena, 1x45 ml
koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/ml;
bočica staklena, 1x60 ml

L01XA03 oksaliplatin

parenteralno

OXALIPLATIN „EBEWE“; EBEWE PHARMA
GES.M.B.H NFG. KG - Austrija,
prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica staklena, 1x50 mg
prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica staklena, 1x100 mg

L01XE inhibitori protein kinaze

L01XE08 nilotinib

oralno

TASIGNA®;
NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
kapsula, tvrda; 200mg; blister, 8x14 kom

L01XX ostali antineoplastici

L01XX19 irinotekan

parenteralno

IRINOTEKAN SANDOZ®; SANDOZ S.A. - Argentina
koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5ml;
bočica staklena, 1x5 ml
koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2ml;
bočica staklena, 1x2 ml

IRINOTESIN®;
S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2ml;
bočica staklena, 1x2 ml
koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5ml;
bočica staklena, 1x5 ml,

M

MIŠIČNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIČNO-KOSTNOG SISTEMA)

M01

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

- M01A** nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
- M01AB** derivati sircetne kiseline i srodne supstance
- M01AB05** diklofenak
oralno

DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM;
HABIT PHARM A.D. - Srbija
kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 75mg;
blister, 3x10 kom

M01AE derivati propionske kiseline

M01AE01 ibuprofen

oralno

RAPIDOL (IBUPROFEN PHARMASWISS);
PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
film tableta; 200mg; blister, 3x10 kom
film tableta; 400mg; blister, 3x10 kom
film tableta; 600mg; blister, 3x10 kom

M05 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU

M05B lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju

M05BA bifosfonati

M05BA03 pamidronska kiselina
parenteralno

HIDENSIL; VIPHARM S.A. - Poljska
prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 30mg/10ml;
liofočica sa rastvaračem u ampuli, 2x10 ml

N

NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)

N03 ANTIEPILEPTICI

N03A antiepileptici

N03AG derivati masnih kiselina

**N03AG01 valproinska kiselina, natrijum-
valproat**
oralno

DEPAKINE® CHRONO;
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
tableta sa produženim oslobađanjem; 300mg; fioła, 1x30 kom
tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; fioła, 1x30 kom

DEPAKINE® CHRONOSPHERE;
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska

granule sa produženim oslobađanjem;
100mg; kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem;
250mg; kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem;
500mg; kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem;
750mg; kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem;
1000mg; kesica, 30x1 kom

N03AX ostali antiepileptici

N03AX09 lamotigin
oralno

SOLABAN; HEMOFARM AD - Srbija
tableta za oralnu suspenziju; 5mg; blister, 3x10 kom
tableta za oralnu suspenziju; 25mg; blister, 3x10 kom
tableta za oralnu suspenziju; 50mg; blister, 3x10 kom
tableta za oralnu suspenziju; 100mg; blister, 3x10 kom

N05 PSIHOLEPTICI

N05A antipsihotici

N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini

N05AH03 olanzapin
oralno

TREANA; HEMOFARM AD - Srbija,
film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom
film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom

N05C hipnotici i sedativi

N05CF lekovi srodni benzodiazepinima

N05CF02 zolpidem
oralno

BELBIEN; HEMOFARM AD - Srbija
film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

ZOLSANA®; KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

film tableta; 5mg; blister, 2x10 kom
film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

N06 PSIHOANALEPTICI

N06A antidepresivi

**N06AB selektivni inhibitori preuzimanja
serotonina**

N06AB06 sertralini
oralno

ONIRUX®; HABIT PHARM A.D. - Srbija
film tableta; 50mg; blister, 2x15 kom
film tableta; 100mg; blister, 2x15 kom

N06AX ostali antidepresivi

N06AX12 bupropion
oralno

WELLBUTRIN® XR; GLAXO WELLCOME GMBH &
CO. KG - Nemačka

tableta sa modifikovanim oslobađanjem;
150mg; bočica, 1x30 kom
tableta sa modifikovanim oslobađanjem;
300mg; bočica, 1x30 kom

N07 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM

N07A parasimpatikomimetici

N07AA antiholinesteraze

N07AA01 neostigmin-metilsulfat
parenteralno

NEOSTIGMINE; COOPER S.A. - Grčka,
rastvor za injekciju; 2.5mg/ml; ampula, 50x1 ml

N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u
alkoholnoj zavisnosti

N07BB04 naltrekson

oralno

NALTREXONE; HAUPT PHARMA
WOLFRATSHAUSEN GMBH - Nemačka

film tableta; 50mg; blister, 1x7 kom

film tableta; 50mg; blister, 4x7 kom

R

**RESPIRATORNI SISTEM (LEKOVI ZA
LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG
SISTEMA)**

R01

NAZALNI PREPARATI

R01B nazalni dekongestivi za sistemsku
primenu

R01BA adrenomimetici

R01BA53 fenilefrin, paracetamol,
askorbinska kiselina

oralno

COLDREX® HOTREM MED I LIMUN;
SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija

prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg; kesica, 10x5 g

COLDREX® JUNIOR HOTREM;
SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija

prašak za oralni rastvor; 5mg+300mg+20mg; kesica, 10x3 g

R06

**ANTIHIISTAMINICI ZA SISTEMSKU
PRIMENU**

R06A antihistaminici za sistemsku primenu

R06AE derivati piperazina

R06AE07 cetirizin

oralno

CETIRIZIN; NI MEDIC D.O.O. - Srbija,

film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

V

OSTALO

V03

SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI

V03A svi ostali terapijski proizvodi

V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji
antineoplasticima

V03AF03 kalcijum-folinat

parenteralno

FOLCASIN®;
S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

rastvor za injekciju/infuziju; 30mg/10ml;

bočica staklena, 1x10 ml

V08

KONTRASTNA SREDSTVA

V08C kontrastna sredstva za magnetnu
rezonancu

V08CA paramagnetna kontrastna
sredstva

V08CA11 gadofosveset

parenteralno

VASOVIST®;
BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

rastvor za injekciju; 244mg/ml; bočica staklena, 1x10 ml

ABECEDNI SPISAK NOVIH INTERNACIONALNIH NEZAŠTIĆENIH NAZIVA FARMACEUTSKIH SUPSTANCI SA PRIPADAJUĆIM LEKOVIMA

esencijalni fosfolipidi, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, tokoferolacetat

oralno

HEPALIP FORTE® BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda; 300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg;
blister, 3x10 kom

gadofosveset

parenteralno

VASOVIST® BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

rastvor za injekciju; 244mg/ml; bočica staklena, 1x10 ml

neostigmin-metilsulfat

parenteralno

NEOSTIGMINE COOPER S.A. - Grčka

rastvor za injekciju; 2.5mg/ml; ampula, 50x1 ml

nilotinib

oralno

TASIGNA® NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska

kapsula, tvrda; 200mg; blister, 8x14 kom

pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana

parenteralno

PREVENAR WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(2mcg+4mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+2mcg+20mcg)
/0.5ml; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 ml

valproinska kiselina, natrijum-valproat

oralno

DEPAKINE® CHRONO SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska

tableta sa produženim oslobađanjem; 300mg;
fiola, 1x30 kom
tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
fiola, 1x30 kom

DEPAKINE® CHRONOSPHERE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska

granule sa produženim oslobađanjem; 100mg;
kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem; 250mg;
kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem; 500mg;
kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem; 750mg;
kesica, 30x1 kom
granule sa produženim oslobađanjem; 1000mg;
kesica, 30x1 kom

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZVRŠENA OBNOVA REGISTRACIJE SA PRIPADAJUĆIM EAN KÔDOM

DIANEAL® PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

- | | | | |
|------|--|-------------|------------|
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% <i>m/v</i> (22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2500 ml
5413760016221 | 122/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86% <i>m/v</i> (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2000 ml
5413760016207 | 124/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% <i>m/v</i> (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2500 ml
5413760016214 | 119/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% <i>m/v</i> (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x5000 ml
5413760016054 | 120/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% <i>m/v</i> (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2000 ml
5413760015958 | 118/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% <i>m/v</i> (22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x5000 ml
5413760016078 | 123/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% <i>m/v</i> (22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2000 ml
5413760016276 | 121/2009/12 | 22.01.2009 |
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86% <i>m/v</i> (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l;
plastična kesha, 1x2500 ml
5413760016238 | 125/2009/12 | 22.01.2009 |

EXTRANEL® - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum hlorid

- | | | | |
|------|---|------------|------------|
| (SZ) | rastvor za peritonealnu dijalizu; 7.5% (75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.051g/l; plastična
kesha, 1x2000ml
5413760190099 | 63/2009/12 | 19.01.2009 |
|------|---|------------|------------|

KALETRA® - AESICA QUEENBOROUGH LTD - Velika Britanija

lopinavir, ritonavir

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (R) | kapsula, meka; 133.3mg+33.3mg; bočica plastična, 2x90 kom
5013158768208 | 4331/2008/12 | 05.12.2008 |
|-----|--|--------------|------------|

KANAZOL® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

itrakonazol

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | kapsula, tvrda; 100mg; kontejner plastični, 1x10 kom
8605000800074 | 4332/2008/12 | 05.12.2008 |
|-----|---|--------------|------------|

MONOSAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

izosorbidmononitrat

- | | | | |
|-----|---|------------|------------|
| (R) | tableta; 40mg; blister, 3x10 kom
8605000800104 | 61/2009/12 | 19.01.2009 |
| (R) | tableta; 20mg; blister, 3x10 kom
8605000800098 | 60/2009/12 | 19.01.2009 |

ABECEDNI SPISAK PROIZVOĐAČA SA ASORTIMANOM NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

A.MENARINI, MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L. - Italija

TRICAL® (glimepirid)

ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka

ALUVIA® (lopinavir, ritonavir)

ACTAVIS HF. - Island

RASOLTAN® (losartan)

ACTAVIS LTD - Malta

RASETRON® (granisetron)

BAXTER AG - Austrija

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER (albumin, humani)

BAXTER S.A. - Belgija

RECOMBINATE 1000 (oktokog alfa)

RECOMBINATE 250 (oktokog alfa)

RECOMBINATE 500 (oktokog alfa)

BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

VASOVIST® (gadofosveset)

BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

HEPALIP FORTE® (esencijalni fosfolipidi, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, tokoferolacetat)

COOPER S.A. - Grčka

NEOSTIGMINE (neostigmin-metilsulfat)

EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija

OXALIPLATIN „3“ (oksaliplatin)

GLAXO WELLCOME GMBH & CO. KG - Nemačka

WELLBUTRIN® XR (bupropion)

HABIT PHARM A.D. - Srbija

DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM (diklofenak)

ONIRUX® (sertralin)

SMERTOPRAZOL® (omeprazol)

HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH - Nemačka

NALTREXONE (naltrekson)

HEMOFARM AD - Srbija

BELBIEN (zolpidem)

SOLABAN (lamotrigin)

TENSEC (bisoprolol)

TENSEC PLUS (bisoprolol, hidrohloriazid)

TREANA (olanzapin)

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

SIMVAX® (simvastatin)

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija

NIRYPAN® (metilprednizolon)

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

NOLPAZA® (pantoprazol)

ZOLSANA® (zolpidem)

LABORATORIOS LICONSA S.A. - Španija

OMICRAL (itrakonazol)

PROTONEXA (lansoprazol)

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

DIBIGLIM® (glimepirid)

MERCK KGaA - Nemačka

THYROZOL® (tiamazol)

NI MEDIC D.O.O. - Srbija

CETIRIZIN (cetirizin)

NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska

AZAX® (azitromicin)

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska

TASIGNA® (nilotinib)

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

CARBOPLASIN® (karboplatin)

FOLCASIN® (kalcijum-folinat)

IRINOTESIN® (irinotekan)

SANDOZ S.A. - Argentina

GEMCITABIN SANDOZ® (gemcitabin)

IRINOTEKAN SANDOZ® (irinotekan)

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska

DEPAKINE® CHRONO (valproinska kiselina, natrijum-valproat)

DEPAKINE® CHRONOSPHERE (valproinska kiselina, natrijum-valproat)

SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija

COLDREX® HOTREM MED I LIMUN (fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina)
 COLDREX® JUNIOR HOTREM (fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina)

VIPHARM S.A. - Poljska

HIDENSIL (pamidronska kiselina)

WULFING PHARMA GMBH - Nemačka

DOPAMIN ADMEDA 200 (dopamin)
 DOPAMIN ADMEDA 50 (dopamin)

WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija

PREVENAR (pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana)

PROMENE NAZIVA PROIZVODA (VARIJACIJE)

dosadašnji naziv: **MEGION®**

novi naziv: **LENDACIN®**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija**ceftriakson**

prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1g; bočica, 10x1 g

1066/2008/12 od 18.03.08
 2762/2008/12 od 25.08.2008

dosadašnji naziv: **IBUPROFEN PHARMASWISS**

novi naziv: **RAPIDOL®**

PHARMASWISS D.O.O. - Srbija**ibuprofen**

film tableta; 200mg; blister, 3x10 kom

3934/2008/12 od 23.10.08
 4075/2008/12 od 11.11.2008

film tableta; 400mg; blister, 3x10 kom

3931/2008/12 od 23.10.08
 4076/2008/12 od 11.11.2008

film tableta; 600mg; blister, 3x10 kom

3933/2008/12 od 23.10.08
 4077/2008/12 od 11.11.2008

KOREKCIJE U NACIONALNOM REGISTRU LEKOVA 2009

ANBOL® - GALENIKA AD – Srbija str. 43

acetilsalicilna kiselina - N02BA01

(Z) 1086800 tableta; 300mg; strip, 50x10 kom

8608808103736

umesto: 1207/2008/12 26.03.2008

treba: 4039/2008/12 03.11.2008; važi do 26.03.2013

BONDRONAT® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD – Švajcarska str. 81

ibandronska kiselina - M05BA06

(SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/6mL; bočica, 1x6 mL

(SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/6mL; bočica, 5x6 mL

(R) 1059085 film tableta; 50mg; bočica, 1x28 kom

(SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg; bočica, 1x2 mL

Novo doziranje: *prevencija pojava na kostima kod pacijenata sa rakom dojke i metastazama kostiju:* preporučena doza je 6mg u i.v. inf. tokom 1 sata, u intervalima od 3-4 nedelje. Sadržaj bočice (ili više bočica) treba dodati u 500mL izotonog rastvora natrijum hlorida ili 500mL 5% rastvora dekstroze. *Lečenje tumorom izazvane hiperkalcijemije sa metastazama ili bez njih:* kod većine bolesnika sa **teškom hiperkalcijemijom** (kalcijum u serumu korigovan za albumin ≥ 3 mmol/L ili ≥ 12 mg/dL) pojedinačna doza je 4mg, uz rehidriranje bolesnika 0.9% rastvorom natrijum hlorida pre terapije. Kod bolesnika sa **umerenom hiperkalcijemijom** (kalcijum u serumu korigovan za albumin < 3 mmol/L ili < 12 mg/dL) pojedinačna doza je 2mg u i.v. inf. tokom 2 sata. Sadržaj bočice treba dodati u 500mL izotonog rastvora natrijum hlorida (ili 500mL 5% rastvora dekstroze). **Lečenje započinje samo lekar koji ima iskustva sa lečenjem raka.** Bezbednost i efikasnost nisu utvrđeni kod mlađih od 18 godina. Potreban je oprez pri primeni kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre i bubrega.

MIACALCIC® - NOVARTIS PHARMA S.A.S. – Francuska str. 347

(R) 7040184 sprej za nos, rastvor; 200i.j./doza; bočica sa raspršivačem, 1x2 mL

Novo doziranje: *potvrđena postmenopauzalna osteoporozu:* preporučena doza je 200i.j. jednom dnevno; preporučuje se ubrizgavanje naizmenično u obe nozdrve prema uputstvu za primenu, uz istovremeni adekvatni unos kalcijuma i vitamina D. Terapija je dugotrajna.

SEPTOLETE® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. – Slovenija str. 473

1120106 komprimovana lozenga; 1mg+0.6mg+1.2mg+0.6mg+1mg; blister,

umesto: 2x15 kom.

treba: 3x10 kom.

SEPTOLETE® D - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. – Slovenija str. 474

1120107 komprimovana lozenga; 1mg+0.6mg+1.2mg+0.6mg+1mg; blister,

umesto: 2x15 kom.

treba: 3x10 kom.

VALCYTE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD – Švajcarska str. 535

1328610 film tableta; 450mg; bočica, 1x60 kom

Novo doziranje: *indukcija i terapija održavanja citomegalovirusnog (CMV) retinitisa kod bolesnika sa sindromom stečene imunodeficijencije (AIDS):* 2 puta po 900mg dnevno u toku 21 dan; ukoliko ne dolazi do poboljšanja, ponoviti inicijalnu terapiju, a zatim 900mg/dan kao doza održavanja; *prevencija bolesti CMV kod CMV-negativnih pacijenata koji su primili transplantirani organ od CMV-pozitivnog davaoca:* preporučena doza je 900mg (2 tablete) jednom dnevno, počevši u roku od 10 dana po transplantaciji i nastaviti do 100 po transplantaciji i kad god je moguće tablete uzimati uz obrok. Tabl. se ne sme lomiti, niti mrviti.

zidovudin, lamivudin, abakavir - J05AR04

umesto: film tableta; 300mg+300mg+150mg; bočica, 1x60 kom

treba: film tableta; 300mg+150mg+300mg; bočica, 1x60 kom

PROMENE PO OSNOVU VARIJACIJA

(izmene proizvođača i naziva leka, nove doze, oblici, pakovanja, nove indikacije, uslovi čuvanja, ean)

BERLITHION® 300 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka

tioktinska kiselina - A16AX01

**OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI
DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA**

A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma

(BR)	1089113 kapsula, meka; 300mg; blister, 2x15 kom <u>4013054015063</u> 3 godine, na temperaturi do 25° C.	3112/2008/12	10.09.2008 10.09.2013
(BR)	1089114 kapsula, meka; 300mg; blister, 1x15 kom <u>4013054015056</u> 3 godine, na temperaturi do 25° C.	3109/2008/12	10.09.2008 10.09.2013

BERLITHION® 600 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka

tioktinska kiselina - A16AX01

**OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI
DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA**

A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma

(BR)	1089115 kapsula, meka; 600mg; blister, 2x15 kom <u>4013054015087</u> 30 meseci, na temperaturi do 25° C.	3113/2008/12	10.09.2008 10.09.2013
(BR)	1089116 kapsula, meka; 600mg; blister, 1x15 kom <u>4013054015070</u> 30 meseci, na temperaturi do 25° C.	3114/2008/12	10.09.2008 10.09.2013

CALCIUM-SANDOZ FORTE® 500 - FAMAR FRANCE - Francuska

kalcijum-laktat-glukonat, kalcijum-karbonat - A12AA20

MINERALI

A12AA kalcijum

(BR)	1053092 šumeća tableta; 1132mg+875mg; fiola, 1x20 kom 3831061001630 2 godine, bez posebnih naznaka; u originalnom pakovanju; čuvati fiolu čvrsto zatvorenu.	2231/2008/12	25.08.2008 07.08.2013
------	--	--------------	--------------------------

CAMPTO® - PFIZER PTY LIMITED - Australija

irinotekan - L01XX19

ANTINEOPLASTICI

L01XX ostali antineoplastici

(SZ)	0039291 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica plastična, 1x5 mL <u>4034541007804</u> 3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.	2542/2008/12	11.08.2008 08.12.2008
------	--	--------------	--------------------------

CIFRAN – Ranbaxy Ireland LTD., Irska

film tablete, 10 po 500mg

film tablete, 10 po 250mg

umesto: proizvođača Ranbaxy Ireland LTD., Indija

uvodi se: prihvata se novi proizvođač: Ranbaxy Ireland LTD., Irska
varijacija važi od 27.01.2009

CIFRAN – Ranbaxy Ireland LTD., Irska

film tablete, 10 po 500mg

produženje roka upotrebe:

umesto: 24 meseca

treba: 36 meseci

varijacija važi od 27.01.2009

CIFRAN – Ranbaxy Ireland LTD., Irska

film tablete, 10 po 250mg

produženje roka upotrebe:

umesto: 24 meseca**treba:** 36 meseci

varijacija važi od 14.01.2009

CIFRAN – Ranbaxy Ireland LTD., Irska

film tablete, 10 po 500mg

film tablete, 10 po 250mg

pored: proizvođača Ranbaxy Ireland LTD., Irska**uvodi se:** dodatni proizvođač odgovoran za stavljanje leka u promet:

Cemelog-BRS Kft., Madjarska

varijacija važi od 27.01.2009

DIKLOFENAK DUO REMEVITA – Jugoremedija A.D., Srbija

kapsula sa produženim oslobadanjem, tvrda; 30 po 75mg

izmena naziva proizvoda u: **DIKLOFENAK DUO NINI**

varijacija važi od 29.01.2009

DIKLOFENAK DUO REMEVITA PLUS – Jugoremedija A.D., Srbija

kapsula sa produženim oslobadanjem, tvrda; 30 po 100mg

izmena naziva proizvoda u: **DIKLOFENAK DUO NINI PLUS**

varijacija važi od 29.01.2009

DULCOLAX® - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - Francuska**bisakodil** - A06AB02**LAKSATIVI****A06AB kontaktni laksativi**

(R) 1125070 gastrorezistentna tableta; 5mg; blister, 3x10 kom

8606103075178

3 godine, bez posebnih naznaka.

1910/2007/12 11.09.2007

13.01.2009

EFUDIX – ICN POLFA RZESZOW S.A., Poljska

krem, 5g 5%

pored već odobrenog pakovanja od 20guvodi se dodatno pakovanje od 5g

varijacija važi od 27.01.2009

EFUDIX – ICN POLFA RZESZOW S.A., Poljska

krem, 40g 5%

pored već odobrenog pakovanja od 20guvodi se dodatno pakovanje od 40g

varijacija važi od 27.01.2009

FLIXOTIDE – GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A., Poljska**flutikazon** - R03BA05

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; (250mcg/doza); kontejner pod pritiskom, 1x60 doza

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; (125mcg/doza); kontejner pod pritiskom, 1x60 doza

pored već odobrenog mesta proizvodnje, uvodi se novo proizvodno mesto:

Glaxo Wellcome S.A., Španija

varijacija važi od 09.09.2008

FLUIMUN - IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska**vakcina protiv gripa (inaktivisani površinski antigeni) - J07BB02****VAKCINE****J07BB vakcine protiv gripa (influence)**

- (Z) 0011923 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(15mcg+15mcg+15mcg)/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL
8606103010117 4071/2008/12 11.11.2008
1 godina, na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. 11.11.2013

GLIMEPIRID - M.D. NINI D.O.O. - Srbija**glimepirid - A10BB12****LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)****A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje**

- (R) 1042100 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom
8606103515957 4201/2008/12 21.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 25.05.2011
- (R) 1042101 tableta; 3mg; blister, 3x10 kom
8606103515964 4202/2008/12 21.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 25.05.2011
- (R) 1042102 tableta; 4mg; blister, 3x10 kom
8606103515971 4203/2008/12 21.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 25.05.2011
- (R) 1042103 tableta; 6mg; blister, 3x10 kom
8606103515988 4204/2008/12 21.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 25.05.2011

IDEOS® - INNOTHERA CHOUZY - Francuska**kalcijum-karbonat, holekalciferol - A11JB..****VITAMINI****A11JB vitamini sa mineralima**

- (R) 1053301 tableta za žvakanje; 1.25g+400i.j.; kontejner za tablete, 4x15 kom
3400970000906 3659/2008/12 15.10.2008
3 godine, bez posebnih naznaka. 07.08.2013

MELOXICAM – CIPLA LTD., Indija

tablete, 20 po 7.5mg

tablete, 30 po 15mg

izmena naziva proizvoda u: LOATROXY - CIPLA LTD., Indija

varijacija važi od 26.01.2009

OXALIPLATIN PLIVA-LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka**oksaliplatin - L01XA03****ANTINEOPLASTICI****L01XA jedinjenja platine**

- (SZ) 0031362 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica staklena, 1x100 mg
3850114221269 3914/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. 23.10.2013

OXALIPLATIN PLIVA-LACHEMA 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka**oksaliplatin - L01XA03****ANTINEOPLASTICI****L01XA jedinjenja platine**

- (SZ) 0031363 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica staklena, 1x50 mg
3850114221276 3913/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. 23.10.2013

PIKOVIT® FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

retinol, holkalciferol, askorbinska kiselina, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin, nikotinamid, folna kiselina, kalcijum-pantotenat, tokoferol - A11BA..

VITAMINI**A11BA multivitamini**

(BR) 1052110 obložena tableta; 5000i.j.+400i.j.+60mg+1.5mg+1.7mg+2mg+6mcg+20mg+0.4mg+10mg+15mg; blister, 2x15 kom
3838989559663 3581/2008/12 07.10.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 11.01.2012

PILFUD – Bosnalijek D.D., Bosna i Hercegovina

rastvor za kožu, bočica, 2%, 60mL

umesto: režim izdavanja – na recept (R)

prihvata se: režim izdavanja leka je bez recepta (BR), uz obavezu obeležavanja posebnog upozorenja na spoljašnjem pakovanju: "pre prve upotrebe konsultovati lekara".
varijacija važi od 26.09.2008

PILFUD – Bosnalijek D.D., Bosna i Hercegovina

sprej za kožu, rastvor, bočica sa raspršivačem, 5%, 60mL

umesto: režim izdavanja – na recept (R)

prihvata se: režim izdavanja leka bez recepta (BR) uz obavezu obeležavanja posebnog upozorenja na spoljašnjem pakovanju: "pre prve upotrebe konsultovati lekara". Na spoljašnjem pakovanju naglasiti da je namenjen isključivo muškarcima.
varijacija važi od 26.09.2008

PREDUCTAL MR – LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, Francuska

trimetazidin - C01EB15

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 35mg; blister, 2x30 kom

pored već odobrenog mesta proizvodnje, uvodi se novo mesto proizvodnje:
ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE S.A. (Anpharm), Poljska
varijacija važi od 21.01.2009

RAMITENS – PHARMASWISS D.O.O., Srbija

tablete, 28 po 2,5mg

prihvata se skraćeno roka upotrebe:

umesto: 24 meseca

treba: 18 meseci, ukoliko se lek čuva na temperaturi od 25°C
varijacija važi od 30.01.2009

RAMITENS – PHARMASWISS D.O.O., Srbija

tablete, 28 po 5mg

prihvata se skraćeno roka upotrebe:

umesto: 24 meseca

treba: 18 meseci, ukoliko se lek čuva na temperaturi od 25°C
varijacija važi od 26.01.2009

PROMENA ADRESE NOSIOCA DOZVOLE**KRKA FARMA D.O.O.**

umesto: Novi Sad

treba: KRKA FARMA D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26/V/III

SEPTOLETE® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

nana (*Mentha piperita*), etarsko ulje, eukaliptus (*Eucalyptus spp*), etarsko ulje, levomentol, timol, benzalkonijum-hlorid - A01AB11

STOMATOLOŠKI PREPARATI

A01AB antiinfektivni i antiseptici za lokalno - oralnu primenu

(BR) 1120106 komprimovana lozenga; 1mg+0.6mg+1.2mg+0.6mg+1mg; blister, 2x15 kom
3838989555306 3577/2008/12 07.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 01.03.2012

prihvata se izmena veličine unutrašnjeg pakovanja gotovog proizvoda: pored postojećeg pakovanja od 3x10 komprimovanih lozengi, uvodi se dodatno pakovanje od 2x9 komprimovanih lozengi.

SEPTOLETE® D - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

nana (*Mentha piperita*), etarsko ulje, eukaliptus (*Eucalyptus spp*), etarsko ulje, levomentol, timol, benzalkonijum-hlorid - A01AB11

STOMATOLOŠKI PREPARATI

A01AB antiinfektivni i antiseptici za lokalno - oralnu primenu

(BR) 1120107 komprimovana lozenga; 1mg+0.6mg+1.2mg+0.6mg+1mg; blister, 2x15 kom
3838989555313 3575/2008/12 07.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage. 01.03.2012

prihvata se izmena veličine pakovanja gotovog proizvoda: pored postojećeg unutrašnjeg pakovanja od 3x10 komprimovanih lozengi, uvodi se dodatno unutrašnje pakovanje od 2x15 komprimovanih lozengi.

SEPTOLETE® PLUS - Krka, Slovenija

komprimovane lozenge, 18x(1mg+5mg)

varijacija tipa IA:S-važi od 07.10.2008

- prihvata se izmena veličine unutrašnjeg pakovanja gotovog proizvoda: pored postojećeg pakovanja od 3x10 komprimovanih lozengi, uvodi se dodatno pakovanje od 2x9 komprimovanih lozengi.

SPIRONOLAKTON - GALENIKA AD - Srbija

spironolakton - C03DA01

DIURETICI

C03DA antagonisti aldosterona

(R) 1400441 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom
8608808107024 3887/2008/12 20.10.2008
3 godine, u originalnom pakovanju. 04.04.2013

TRASYLOL - BAYER HEALTHCARE AG, Nemačka

rastvor za infuziju, 1x500000KIJ/50mL

varijacija tipa II:S-važi od 26.09.2008

promena indikacije: profilaktička primena radi smanjenja perioperativnog gubitka krvi i potrebe za transfuzijom kod pacijenata pri operaciji kardiopulmonalnog by-passa kod kojih postoji povećan rizik od krvarenja ili povećana potreba za transfuzijom.

TRICAL® - A. MENARINI, MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L. - Italija

glimepirid - A10BB12

**LEKOWI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)**

A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje

(R) 1042820 tableta; 4mg; blister, 1x30 kom
4013054016176 4235/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C. 25.11.2013
(Z) 1042821 tableta; 4mg; blister, 2x30 kom
4013054016183 4256/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C. 25.11.2013
(Z) 1042822 tableta; 4mg; blister, 3x30 kom
4013054016190 4260/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C. 25.11.2013

(Z)	1042823 tableta; 4mg ; blister, 4x30 kom 4013054016206 2 godine, na temperaturi do 30°C.	4261/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(R)	1042824 tableta; 6mg ; blister, 1x30 kom 4013054016213 2 godine, na temperaturi do 30°C.	4243/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(Z)	1042825 tableta; 6mg ; blister, 2x30 kom 4013054016220 2 godine, na temperaturi do 30°C.	4257/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(Z)	1042826 tableta; 6mg ; blister, 3x30 kom 4013054016237 2 godine, na temperaturi do 30°C.	4258/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(Z)	1042827 tableta; 6mg ; blister, 4x30 kom 4013054016244 2 godine, na temperaturi do 30°C.	4259/2008/12	25.11.2008 25.11.2013

TRILEPTAL® - NOVARTIS FARMA S.P.A. - Italija

okskarbazepin - N03AF02

N03AF derivati karboksamida

ANTIEPILEPTICI

▲ (R)	1084711 film tableta; 300mg; blister, 5x10 kom 8606103543646 3 godine, na temperaturi do 30°C.	4063/2008/12	10.11.2008 24.11.2008
▲ (R)	1084712 film tableta; 600mg; blister, 5x10 kom 8606103543653 3 godine, na temperaturi do 30°C.	4064/2008/12	10.11.2008 24.11.2008

METFORMIN

film tablete, 30x850mg

umesto: Srbolek A.D., Srbija

novi proizvođač je: JAKA 80, Srbija

varijacija tipa IA:S-važi od 03.11.2008

ZAVEDOS

kapsula, tvrda, 1x5mg

liofilizat za rastvor za injekciju 1x10mg

umesto: PHARMACIA ITALIA S.p.A., Italija

novi proizvođač je: Pfizer Italia S. r.l., Italija

varijacija tipa IA:S-važi od 20.08.2008

PROMENA NAZIVA LEKA

umesto naziva:

MEGION - Sandoz, Austrija

prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 10x250mg – Sandoz, Austrija

prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 10x500mg – Sandoz, Austrija

prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 10x1g – Sandoz, Austrija

prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 10x2g – Sandoz, Austrija

uvodi se novi naziv: LENDACIN – Sandoz, Austrija

varijacija tipa IB:S-važi od 21.08.2008

INDEX

A

ACTRAPID® PENFILL®	7, 29
ALUVIA®	7, 32, 39
ANBOL®	43
AZAX®	7, 31, 40

B

BELBIEN	7, 27, 33, 39
BERLITHION® 300	27, 45
BERLITHION® 300 BERLIN	27
BERLITHION® 600	27, 45
BERLITHION® 600 BERLIN	27
BONDRONAT®	43

C

CALCIUM-SANDOZ FORTE® 500	45
CAMPTO®	45
CARBOPLASIN®	8, 32, 40
CETIRIZIN	8, 34, 40
CIFRAN	45, 46
COLDREX® HOTREM MED I LIMUN 8, 27, 34, 41	
COLDREX® JUNIOR HOTREM	8, 27, 34, 41
CONTROLOC®	9, 29

D

DEPAKINE® CHRONO	9, 33, 35, 40
DEPAKINE® CHRONOSPHERE	10, 33, 35, 40
DIANEAL® PD4	37
DIBIGLIM®	10, 30, 40
DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM	11, 32, 39
DIKLOFENAK DUO REMEVITA	46
DIKLOFENAK DUO REMEVITA PLUS	46
DOPAMIN ADMEDA 50	11, 30, 41
DOPAMIN ADMEDA 200	11, 30, 41
DULCOLAX®	46

E

EFUDIX	46
EXTRANEL®	37

F

FLIXOTIDE	46
FLUIMUN	47
FOLCASIN®	12, 34, 40

G

GEMCITABIN SANDOZ®	12, 32, 40
GLIMEPIRID	47

H

HEPALIP FORTE®	12, 27, 29, 35, 39
HIDENSIL	12, 33, 41
HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER	13, 30, 39

I

IBUPROFEN PHARMASWISS	18, 27, 32, 41
IDEOS®	47
INSULATARD® PENFILL®	13, 29
IRINOTEKAN SANDOZ®	13, 32, 40
IRINOTESIN®	14, 32, 40

K

KALETRA®	37
KANAZOL®	37
KLOSTERFRAU SEDINAL	25

L

LENDACIN	50
LENDACIN®	41

M

MEGION	50
MEGION®	41
MELOXICAM	47
METFORMIN	50
MIACALCIC®	43
MIXTARD® 30 PENFILL®	14, 30
MONOSAN®	37

N

NALTREXONE	14, 34, 39
NEOSTIGMINE	15, 33, 35, 39
NIRYPAN®	15, 31, 40
NOLPAZA®	15, 29, 40

O

OMICRAL	16, 31, 40
ONIRUX®	16, 33, 39
OXALIPLATIN „3“	39
OXALIPLATIN „EBEWE“	16, 32
OXALIPLATIN PLIVA-LACHEMA 50	47
OXALIPLATIN PLIVA-LACHEMA 100	47

P

PIKOVIT® FORTE	48
PILFUD	48
PREDUCTAL MR	48
PREVENAR	17, 32, 35, 41
PRIORIX™	28
PRITORPLUS®	17, 31
PROTONEXA	17, 29, 40

R

RAMITENS	48
RANITAL®	18, 29
RAPIDOL	18, 32
RAPIDOL®	41
RASETRON®	19, 29, 39
RASOLTAN®	19, 31, 39
RECOMBIMATE 250	20, 30, 39

RECOMBIMATE 500	20, 30, 39	TRILEPTAL®	50
RECOMBIMATE 1000	19, 30, 39	TRIZIVIR®	44
S		V	
SEPTOLETE®	43, 49	VALCYTE®	43
SEPTOLETE® D	43, 49	VASOVIST®	24, 34, 35, 39
SEPTOLETE® PLUS	49	VIATROMB®	24, 30
SIMVAX®	20, 31, 40	W	
SIMVOR®	21, 31	WELLBUTRIN® XR	25, 27, 33, 39
SMERTOPRAZOL®	22, 29, 39	Z	
SOLABAN	22, 33, 39	ZAVEDOS	50
SPIRONOLAKTON	49	ZOLSANA®	25, 27, 33, 40
T			
TASIGNA®	23, 32, 35, 40		
TENSEC	23, 30, 31, 39		
TENSEC PLUS	23, 31, 39		
THYROZOL®	23, 31, 40		
TRASYLOL	49		
TREANA	24, 27, 33, 39		
TRICAL®	39, 49		

BELEŠKE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

Za izdavača
Prim mr ph Tomislav Solarović

Lektor
Prof Radmila Arsenijević

Dizajn i prelom teksta
HELICON PUBLISHING

Tehnička obrada i kompjuterska priprema
Vladimir Đorđević

Tiraž
3000

Štampa
Grafolik, Beograd

CIP - Каталогизacija u publikaciji
Народна библиотека Србије, Београд

615

NACIONALNI registar lekova / glavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić. - 2006 - Beograd (Vojvode Stepe 458) : Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije : Helicon Publishing, 2006 (Beograd : Grafolik). - 22 cm

Godišnje
ISSN 1452-3337 = Nacionalni registar lekova
COBISS.SR-ID 127781900