



Agencija za lekove
i medicinska sredstva Srbije

NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

NRL
DODATAK
2

Beograd
jun 2009.

IZDAVAČ

**Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima**

Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd

www.alims.gov.rs

e-mail: registar@alims.gov.rs

Helicon Publishing

www.helicon.co.yu

office@helicon.co.yu

ZA IZDAVAČA

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

AUTORI I UREDNICI

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić

Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović

Prim. mr sc. ph. Milena Miljković

Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik

Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

SARADNICI

Mr sci. ph Danka Stefanović

Mr ph. Danka Tešić

Mr ph. Marija Mašković

Mr ph. Ivana Mihajlović

Dr vet. med Jelena Borlja

Dr med spec Zorica Stajković

Mr ph. Katarina Kovačević

Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović

Ing. Julija Grujić

Veselina Rakanović, farm. tehn.

Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SARADNICI NA PRIPREMI ID PODATAKA

Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević

Mr ph. Vladan Savić

Mr ph. Dejan Stevanović

Nataša Đukić

ŠTAMPA

GRAFOLIK, Beograd

TIRAZ:

2500

ISSN 1452-3337

PREDGOVOR

Dodatak 2 Nacionalnog registra lekova, 2009 godine sadrži pregledno klasifikovane stručne informacije o promenama vezanim za stavljanje lekova u promet u periodu februar, mart, april 2009. godine, a koje su date prema principima i sadržaju koji se nalazi u NRL, 2009.

U Dodatku 2 su obrađeni podaci o novoregistrovanim lekovima, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih podataka koji su bitni za praksu. To su podaci o: lekovima za koje je izvršena obnova registracije, izdata rešenja o prestanku dozvole za stavljanje u promet, novim dozama, pakovanjima, farmaceutskim oblicima registrovanih lekova, izmenama EAN koda za pojedine lekove, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih stručnih podataka o lekovima.

Napominjemo, da kod lekova za koje je izvršena obnova registracije, sada nisu menjani podaci o indikacijama i doziranju, a isti će biti obrađeni prema novim sažecima karakteristika lekova i navedeni u sledećem izdanju NRL.

Uz želju i obavezu da vas i dalje ažurno informišemo o promenama u oblasti registracije lekova, očekujemo vaše sugestije.

Autori i urednici

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno.

© Sva prava zadržana.

SADRŽAJ

Predgovor	3
Abecedni spisak novoregistrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama	7
Abecedni spisak novoregistrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama.....	39
Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija novoregistrovanih lekova	41
Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija novoregistrovanih biljnih lekova.....	51
Abecedni spisak novih internacionalnih nezaštićenih naziva supstanci sa pripadajućim lekovima	53
Abecedni spisak novih nezaštićenih biljnih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .	55
Tradicionalni lekovi	57
Registrovani homeopatski lekovi	57
Abecedni spisak novoregistrovanih lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR).....	59
Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (S▲).....	60
Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom (▲)	60
Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti (△).....	60
Abecedni spisak lekova za koje je izvršena obnova registracije sa pripadajućim EAN kôdom	61
Nova pakovanja i izmene pakovanja	71
Promene naziva proizvođača	73
Promene po osnovu varijacija	75
Promene naziva proizvoda	79
Izmena EAN koda	83
Abecedni spisak lekova za koje su izdata rešenja o prestanku važnosti dozvole za stavljanje u promet .	87
Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom novoregistrovanih lekova	89

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA, CENAMA I PARALELAMA

ACTAFENAK® - ACTAVIS HF. - Island

diklofenak - M01AB05

ANTIINFLAMATORNI

I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance

(R)	1162573 film tableta; 25mg; blister, 1x10 tabl. 5690528112054	Cena: 27,90din 4491/2008/12	15.12.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka		15.12.2013
(R)	1162574 film tableta; 50mg; blister, 1x10 tabl. 5690528112016	Cena: 50,40din 4489/2008/12	15.12.2008
	3 godine, bez posebnih naznaka		15.12.2013

Doziranje: *bolovi u reumatskim bolestima* (reumatoidni artritis, osteoartritis, periartritis, tendinitis, tendosinovitis, burzitis), *posttraumatska bolna stanja* (iščašenje, uganuće, frakture, dislokacije), *ankilozirajući spondilitis*, *akutni giht*, *napadi migrene*: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze; doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; za decu stariju od 14 god. preporučena dnevna doza iznosi 75-100mg, podeljena u 2-3 pojedinačne doze; *dismenoreja*: 50-150mg dnevno; *migrena*: početna doza od 5mg se daje već kod pojave prvih znakova napada. Ako se ne postigne kontrola bola nakon 2 sata od uzimanja prve doze, može se uzeti sledeća doza od 50mg. Ako je potrebno, naredne doze leka od 50mg mogu se uzeti u intervalima od 4-6 sati, s tim da se ne sme prekoračiti ukupna dnevna doza od 200mg. Tabl. treba celu progutati sa čašom vode, poželjno pre jela. Ne sme se žvakati ni deliti.

Paralelni lekovi: Diclac®, DicloRapid®, Diclofenac Duo, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss, Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Duo, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Naklofen® retard, Raptan rapid, Raptan-K®, Raptan® Duo

AMITRIPTYLINE - REMEDICA LTD - Kipar

amitriptilin - N06AA09

PSIHOANALEPTICI

N06AA neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina

(R)	1072762 film tableta; 10mg; blister, 10x10 tabl. 5290665003736	Cena: 236,30din 4513/2008/12	15.12.2008
	5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage		15.12.2013
(R)	1072763 film tableta; 25mg; blister, 3x10 tabl. 5290665002852	Cena: 80,20din 4515/2008/12	15.12.2008
	5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage		15.12.2013

Doziranje: *depresija*: uobičajena doza je 75mg dnevno podeljeno u više dnevnih doza ili kao pojedinačna doza koja se uzima uveče, doza se po potrebi postepeno povećava do 150mg dnevno, a dodatne doze se daju kasno popodne ili uveče; doza održavanja iznosi 50-100mg dnevno. Terapija bi trebalo da traje bar tri meseca u kontinuitetu, pre nego što se postepeno ukine. Primena u stacionarnim ustanovama obično počinje sa dozom od 100mg, po potrebi se može postepeno povećati od 200-300mg dnevno. Adolescenti ili stariji pacijenti uzimaju 10-50mg dnevno, podeljeno u više doza ili kao pojedinačna doza koja se uzima uveče. Polovina uobičajene doze održavanja je često dovoljna. Ne preporučuje za lečenje depresije kod dece ispod 16 godina starosti.

AVAMYS® - GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija**flutikazonfuroat** - R01AD12**NAZALNI PREPARATI****R01AD kortikosteroidi**

(R) 7110033 sprej za nos, suspenzija; 27,5mcg/doza;

bočica sa pumpom za doziranje, 1x120 doza

8606103683427

Cena: 1238,20din

264/2009/12 28.01.2009

3 godine, ne držati u frižideru, ne zamrzavati

28.01.2014

Doziranje: *alergijski rinitis: odrasli, adolescenti (12 godina) i stariji* preporučena početna doza je dva spreja (27,5mcg) u svaku nozdrvu, jednom dnevno (ukupna dnevna doza 110mcg), u *terapiji održavanja* doza može biti smanjena na jedan sprej u svaku nozdrvu jednom dnevno (ukupna dnevna doza 55mcg); deca (6.-11. godine starosti) preporučena početna doza je jedan sprej (27,5mcg) u svaku nozdrvu jednom dnevno (ukupna dnevna doza 55mcg).

AVODART® - CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska**dutasterid** - G04CB02**UROLOŠKI LEKOVI****G04CB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze**

(R) 1134305 kapsula, meka; 0,5mg; blister, 3x10 kaps.

8606103683182

Cena: 1877,60din

4225/2008/12 25.11.2008

4 godine, na temperaturi do 30°C

25.11.2013

Doziranje: *benigna hiperplazija prostate (BHP), smanjenje rizika od nastanka akutne urinarne retencije (AUR) i operacije kod pacijenata sa umerenim/teškim simptomima BHP:* 1 kapsula (0,5mg) dnevno. Kapsulu treba progutati celu, ne žvakati ili otvarati, uz ili nezavisno od obroka. Kontraindikovan je kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre.

BISOBEL® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska**bisoprolol** - C07AB07**BLOKATORI****BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA****C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni**

(R) 1107033 tableta; 5mg; blister, 1x30 tabl.

3850343045124

Cena: 287,90din

255/2009/12 28.01.2009

3 godine, bez posebnih naznaka

28.01.2014

Doziranje: *hipertenzija, angina pektoris (koronarna srčana bolest):* početna doza je 5mg dnevno, uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, maks. 20mg dnevno; tabl. progutati sa vodom, mlekom ili drugom tečnosti, najbolje svaki dan u isto vreme; *stabilna hronična srčana insuficijencija:* terapiju započeti sa 1,25mg jednom dnevno tokom prve nedelje, u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu, pod nadzorom lekara; terapija održavanja je 10mg jednom dnevno; tabl. uzimati ujutro, celu, ne žvakati, progutati sa tečnošću. Kod bolesnika sa teškim poremećajem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 20 mL/min), doza bisoprolola ne sme biti veća od 10mg jedanput na dan. Lečenje se ne sme naglo prekinuti. Ukoliko je potrebno, dozu treba postepeno smanjivati za polovinu u nedeljnim intervalima.

Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, Concor®, Concor® COR, Tensec

BONAP - HEMOFARM AD - Srbija**alendronska kiselina** - M05BA04**LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU****M05BA bifosfonati**

(R) 1059079 tableta; 70mg; blister, 1x4 tabl.

8600097404303

Cena: 1046,30din

4509/2008/12 15.12.2008

2 godine, na temperaturi do 25°C

15.12.2013

Doziranje: *postmenopausalna osteoporoza:* 70mg (1 tabl.) jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.

Paralelni lekovi: Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Forosa®, Fosamax®, Lindron

CAMPRAL® - MERCK SANTE S.A.S. - Francuska**akamprosát** - N07BB03**OSTALI LEKOWI****KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM****N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti**

(SZR)	1075310 gastorozistentna tableta; 333mg; blister, 7x12 tabl.	Cena:	1538,50din
	8606105311243	855/2009/12	20.03.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		20.03.2014

Doziranje: održavanje *apstinencije kod pacijenata zavisnih od alkohola* osobe sa 60 ili više kg uzimaju 2 tabl. ujutro, u podne i uveče; osobe sa manje od 60kg uzimaju 2 tabl. ujutru, 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče, između obroka. Preporučeno trajanje terapije je godinu dana.

CASODEX® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija**bikalutamid** - L02BB03**ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA****L02BB antiandrogeni**

(R)	1037079 film tableta; 150mg; blister, 2x14 tabl.	Cena:	-
	5000455005884	4495/2008/12	15.12.2008
	4 godine, na temperaturi do 30°		15.12.2013

Doziranje: *lokalno uznapredovali karcinom prostate*: 1 tabl. od 150mg dnevno, terapiju sprovesti u kontinuitetu najmanje 2 godine, odnosno do pojave znakova sistemske progresije bolesti.

Paralelni lekovi: Bicadex®, Bicusan®**CO-PRENESSA® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija****perindopril, indapamid** - C09BA04**LEKOWI KOJI DELUJU NA****RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09BA inhibitori ACE i diuretici**

(R)	1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x10 tabl.	Cena:	-
	3838989560935	4239/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(R)	1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 2x15 tabl.	Cena:	-
	3838989560928	4251/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(R)	1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 1x30 tabl.	Cena:	-
	3838989530518	4254/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(R)	1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x10 tabl.	Cena:	-
	3838989561000	4236/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(R)	1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 1x30 tabl.	Cena:	-
	3838989530532	4249/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(R)	1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 2x15 tabl.	Cena:	-
	3838989560966	4252/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(Z)	1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x30 tabl.	Cena:	-
	3838989530525	4250/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(Z)	1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 9x10 tabl.	Cena:	-
	3838989560959	4253/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(Z)	1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 6x15 tabl.	Cena:	-
	3838989560942	4255/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013
(Z)	1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 9x10 tabl.	Cena:	-
	3838989560997	4240/2008/12	25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		25.11.2013

(Z)	1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x30 tabl. 3838989530549	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju	4244/2008/12	25.11.2008 25.11.2013
(Z)	1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 6x15 tabl. 3838989560980	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju	4245/2008/12	25.11.2008 25.11.2013

Doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija (kada je potrebna kombinovana terapija):

1 tabl. dnevno kao pojedinačna doza, ujutro, pre doručka. Kontraindikovana je primena kod teške renalne insuficijencije kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod 30 mL/min).

Paralelni lekovi: Prexanil® Combi, Prexanil® Combi LD

COLDREX® CAPLETS - GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO., KG - Nemačka

paracetamol, kofein, fenilefrin - R01BA53

NAZALNI PREPARATI

R01BA adenomimetici

(BR)	1111216 film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl. 8606103683786	Cena:	-
	2 godine, bez posebnih naznaka	804/2009/12	15.12.2008 15.12.2013

Doziranje: ublažavanje bola u sinusima, ublažavanje simptoma prehlade i gripa: odrasli i starije osobe 2 tabl. do 4 puta dnevno; **deca od 6-12 god.** uzimaju 1 tabl. do četiri puta dnevno. Ne primenjivati kod dece mlađe od 6 god. života.

COLDREX® CAPLETS - GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska

paracetamol, kofein, fenilefrin - R01BA53

NAZALNI PREPARATI

R01BA adenomimetici

(BR)	1111216 film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl. 8606103683571	Cena:	-
	2 godine, bez posebnih naznaka	4510/2008/12	15.12.2008 15.12.2013

Doziranje: ublažavanje bola u sinusima, ublažavanje simptoma prehlade i gripa: odrasli i starije osobe 2 tabl. do 4 puta dnevno; **deca od 6-12 god.** uzimaju 1 tabl. do četiri puta dnevno. Ne primenjivati kod dece mlađe od 6 god. života.

COLOSPA RETARD - SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

mebeverin - A03AA04

LEKOWI ZA FUNKCIONALNE

GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

A03AA sintetski antiholinergici, aminoalkoholni estri

(R)	1123404 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg; blister, 2x15 kaps. 8606103442369	Cena:	968,10din
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati	747/2009/12	23.02.2009 23.02.2014
(R)	1123405 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg; blister, 4x15 kaps. 8606103442376	Cena:	1936,20din
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati	748/2009/12	23.02.2009 23.02.2014

Doziranje: simptomatska terapija sindroma nadraženih creva: odrasli i stariji: 2 puta po 1 kaps. dnevno (ujutru i uveče). Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: Rudakol®

COLOSPA RETARD - SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska**mebeverin** - A03AA04**LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE****A03AA sintetski antiholinergici, aminoalkoholni estri**

- (R) 1123404 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda;
200mg; blister, 2x15 kaps. **Cena:** 968,10din
8606103442291 656/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014
- (R) 1123405 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda;
200mg; blister, 4x15 kaps. **Cena:** 1936,20din
8606103442307 657/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014

Doziranje: *simptomatska terapija sindroma nadraženih creva:* odrasli i stariji: 2 puta po 1 kaps. dnevno (ujutru i uveče). Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: Rudakol®

DIPROSALIC® - SCHERING PLOUGH - Francuska**betametazon, salicilna kiselina** - D07BC01**KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI****D07BC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antisepticima**

- (R) 7153640 rastvor za kožu; 0.5mg/g+20mg/g; bočica, 1x30 mL **Cena:** 265,90din
8606103170385 1395/2009/12 10.04.2009
2 godine, ili 3 godine, u frižideru (od 2°C do 8°C), na temperaturi do 25°C 17.05.2012

Doziranje: *ublažavanje inflamatornih manifestacija psorijaze i seboreje kosmatog dela glave, ublažavanje simptoma inflamacije i svraba kod psorijaze van kosmatog dela glave, dermatoze koje reaguju na kortikosteroide:* 2 puta dnevno (ujutro i uveče) nekoliko kapi rastvora naneti na oboleli deo kože ili kosmati deo glave i nežno potpuno utrljati.

Paralelni lekovi: Belosalic®

DOBUTAMIN ADMEDA 250 - WULFING PHARMA GMBH - Nemačka**dobutamin** - C01CA07**TERAPIJA BOLESTI SRCA****C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi**

- (Z) 0105401 koncentrat za rastvor za infuziju; 250mg/50mL; ampula, 1x50 mL **Cena:** -
4260099070247 3304/2008/12 01.10.2008
4 godine, bez posebnih naznaka 01.10.2013

Doziranje: individualno. *Srčana insuficijencija* (inotropna podrška): odrasli obično 2.5-10mcg/kg/min u inf., deca 1-15mcg/kg/min. u i.v. inf. Primenjuje se kao nerazblažen uz pumpu za inf. sa konstantnom brzinom. Može se alternativno razblažiti pre upotrebe sa 5% rastvorom glukoze, fiziološkim ili rastvorom Ringer laktata i primeniti i.v. putem igle ili katetera i seta za davanje. Terapiju nikada ne treba naglo obustaviti, nego dozu postepeno smanjivati, do potpunog prekida.

DUPHALAC® - SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija**laktuloza** - A06AD11**LAKSATIVI****A06AD osmotski laksativi**

- (BR) 2127420 oralni rastvor; 667g/l; kesica, 10x15 mL **Cena:** 333,00din
8715554002029 242/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014
- (BR) 3127423 oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x200 mL **Cena:** 215,30din
8715554002005 241/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014
- (BR) 3127425 oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x500 mL **Cena:** 591,60din
8715554002012 240/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014

Doziranje: individualno. *Konstipacija* (hronična, habitualna): početna doza za odrasle iznosi 15-45mL/dan, a doza održavanja je 10-25mL/dan; početna doza za decu od 7-14 godina iznosi 15mL/dan, a doza održavanja je 10mL/dan; početna doza za decu od 1-6 godina iznosi 10 mL/dan, a doza održavanja je 5-10mL/dan; početna i doza održavanja za odojčad iznosi 5mL/dan; *portalna sistemska encefalopatija (PSE), prevencija i lečenje hepatičke pretkome i kome:* početna doza je 3 puta po 30-50mL dnevno, a doza održavanja je individualna, tako da svakog dana pacijent ima 2-3 stolice. U akutnim situacijama se može davati u vidu retencione klizme u odnosu 300mL leka:700mL vode. Može se uzimati sam, ili pomešan sa tečnošću ili hranom.

Paralelni lekovi: Lactulose-MIP, Portalak®

DUPHASTON® - SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

didrogesteron - G03DB01

POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

G03DB derivati pregnadiena

(R)	1048293 film tableta; 10mg; blister, 1x20 tabl. 8715554001992	Cena: 431,90din 4494/2008/12	15.12.2008
	5 godina, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		15.12.2013

Doziranje: *endometrioza:* 2-3 puta po 10mg, od 5.-25. dana ciklusa ili kontinuirano; *disfunkcionalna krvarenja:* 2 puta po 10mg od 11.-25. dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; *dismenoreja:* 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa; *hormonska supstitucionna terapija:* standardna doza je 10mg dnevno tokom poslednjih 14 dana svakog 28-dnevnog ciklusa estrogenskog lečenja, može se povećati na 2 puta po 10mg dnevno ili uspostaviti drugi režim primene, zavisno od stanja i indikacije za primenu. Zaboravljena (propuštena) doza: Ako se doza propusti, treba je uzeti što je pre moguće. Ako protekne više od 12 sati, preporučuje se nastavak narednom dozom, bez uzimanja propuštene tablete.

Paralelni lekovi: Dabroston®

ELOCOM® - SCHERING PLOUGH SPA - Italija

mometazon - D07AC13

KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)

(R)	7153442 rastvor za kožu; 0.1%; bočica, 1x20 mL 8606103170392	Cena: 329,00din 1263/2009/12	07.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C		17.05.2012

Doziranje: *inflamatorne i pruritičke dermatoze (psorijaza, atopijski dermatitis):* nekoliko kapi rastvora naneti na obolelo mesto, uključujući i kosmati deo glave, jednom dnevno; rastvor nežno utrljati na obolelo mesto dok se u potpunosti ne upije.

ESCAPELLE® - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

levonorgestrel - G03AC03

POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

G03AC gestageni

(BR)	1135251 tableta; 1.5mg; blister, 1x1 tabl. 5997001314067	Cena: 576,20din 4508/2008/12	15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka		15.12.2013

Doziranje: *zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima:* (11-18 dana menstrualnog ciklusa) jedna tabl. u roku od 12 sati, a najkasnije 72 sata nakon nezaštićenog seksualnog odnosa.

Paralelni lekovi: Postinor®-2

ESPERAL® - CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD. - Mađarska**disulfiram** - N07BB01**OSTALI LEKOVICI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM****N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti**

(R)	1075091 tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20 tabl. 3582910007722	Cena:	233.4din
	3 godine, bez posebnih naznaka	4178/2008/12	05.12.2008 05.12.2013

Doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: jedna tableta dnevno, sa pola čaše vode, ujutro uz doručak, posle najmanje 24 sata uzdržavanja od konzumiranja alkohola.

FENTANYL SANDOZ® MAT - HEXAL AG - Nemačka**fentanil** - N02AB03**ANALGETICI****N02AB derivati fenilpiperidina**

♠▲(R)	9087800 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890666	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4403/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087801 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890673	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4411/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087802 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890659	Cena:	4511,10din
	2 godine, u originalnom pakovanju	4406/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087803 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890574	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4409/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087804 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890581	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4404/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087805 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890567	Cena:	1423,30din
	2 godine, u originalnom pakovanju	4408/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087806 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890604	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4407/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087807 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890611	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4410/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087808 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890598	Cena:	2604,40din
	2 godine, u originalnom pakovanju	4405/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087808 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890628	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4412/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087809 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890635	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4402/2008/12	10.12.2008 10.12.2013
♠▲(R)	9087810 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890642	Cena:	-
	2 godine, u originalnom pakovanju	4413/2008/12	10.12.2008 10.12.2013

Doziranje: jaki hronični bolovi: Kod bolesnika koji nisu primali snažne opijate, terapija se započinje najnižom dozom (25mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/parenteralno korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovnu potrebu za opijatom koji je do tada dat (TD flaster sa sadržajem fentanila i brzinom oslobađanja od 100mcg/h ima istu efikasnost kao 60mg morfina datog i.m. u dozi od 10mg u intervalima od 4^h tokom perioda od 24^h). Potrebu dozu treba prilagoditi pacijentu i preispitivati u redovnim intervalima.

Način primene: Neposredno po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površinu na gornjem delu tela (grudi, leđa, nadlaktica). Na mesto na koje se flaster lepi ne smeju se nanositi kreme, ulja, losioni i puderi. Flaster treba menjati na svakih 72^h, za svaku upotrebu mora se odabirati novo mesto na koži, a ista površina kože se može koristiti 7 dana nakon uklanjanja prethodnog flastera. Flaster se ne sme oštetiti, deliti ili rezati.

Paralelni lekovi: Durogesic®, Fentanyl Sandoz® TTS

FENTANYL SANDOZ® TTS - HEXAL AG - Nemačka

fentanil - N02AB03

ANALGETICI

N02AB derivati fenilpiperidina

§ ▲ (R)	9087812 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890789 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4400/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087813 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890796 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4401/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087814 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890772 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4392/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087815 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890697 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4398/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087816 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890703 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4397/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087817 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890680 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4390/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087818 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890727 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4391/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087819 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890734 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4395/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087820 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890710 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4394/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087821 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1 kom 8606010890758 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4399/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087822 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1 kom 8606010890765 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4396/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013
§ ▲ (R)	9087823 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom 8606010890741 3 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		4393/2008/12	10.12.2008
			10.12.2013

Doziranje: *jaki hronični bolovi:* Kod bolesnika koji nisu primali snažne opijate, terapija se započinje najnižom dozom (25mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/parenteralno korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovnu potrebu za opijatom koji je do tada dat (TD flaster sa sadržajem fentanila i brzinom oslobađanja od 100mcg/h ima istu efikasnost kao 60mg morfina datog i.m. u dozi od 10mg u intervalima od 4^h tokom perioda od 24^h). Potrebnu dozu treba prilagoditi pacijentu i preispitivati u redovnim intervalima.

Način primene: Neposredno po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površinu na gornjem delu tela (grudi, leđa, nadlaktica). Na mesto na koje se flaster lepi ne smeju se

nanositi kreme, ulja, losioni i puderi. Flaster treba menjati na svakih 72^h, za svaku upotrebu mora se odabirati novo mesto na koži, a ista površina kože se može koristiti 7 dana nakon uklanjanja prethodnog flastera. Flaster se ne sme oštetiti, deliti ili rezati.

Paralelni lekovi: Durogesic[®], Fentanyl Sandoz[®] MAT

FEVARIN[®] - SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

fluvoksamin - N06AB08

PSIHOANALEPTICI

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

(R)	1072137 film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl. 8606103442345	Cena: 511,70din 4512/2008/12 15.12.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	15.12.2013
(R)	1072138 film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl. 8606103442352	Cena: 1023,50din 4525/2008/12 15.12.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	15.12.2013

Doziranje: *depresija:* odrasli početna doza je 50 ili 100mg, u pojedinačnoj dozi uveče, po potrebi doze korigovati tokom 3-4 nedelje od početka lečenja, maks. 300mg dnevno. Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze, a najmanje 6 meseci. *Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP):* odrasli početna doza je 50mg dnevno, preporučena doza je od 100-300mg dnevno, maks. 300mg dnevno. Doza od 150mg dnevno može se uzimati jednokratno, uveče. Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze. Ukoliko se ne uoči poboljšanje za 10 nedelja, treba ponovo proceniti terapiju. Dugotrajna efikasnost (preko 24 nedelje) leka kod lečenja OKP nije pokazana. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa insuficijencijom jetre ili bubrega.

FEVARIN[®] - SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

fluvoksamin - N06AB08

PSIHOANALEPTICI

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

(R)	1072137 film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl. 8606103442246	Cena: 511,70din 4524/2008/12 15.12.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	15.12.2013
(R)	1072138 film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl. 8606103442253	Cena: 1023,50din 4514/2008/12 15.12.2008
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	15.12.2013

Doziranje: *depresija:* odrasli početna doza je 50 ili 100mg, u pojedinačnoj dozi uveče, po potrebi doze korigovati tokom 3-4 nedelje od početka lečenja, maks. 300mg dnevno. Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze, a najmanje 6 meseci. *Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP):* odrasli početna doza je 50mg dnevno, preporučena doza je od 100-300mg dnevno, maks. 300mg dnevno. Doza od 150mg dnevno može se uzimati jednokratno, uveče. Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze. Ukoliko se ne uoči poboljšanje za 10 nedelja, treba ponovo proceniti terapiju. Dugotrajna efikasnost (preko 24 nedelje) leka kod lečenja OKP nije pokazana. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa insuficijencijom jetre ili bubrega.

FLUDARABINE-TEVA - TEVA PHARMACHEMIE B.V. - Holandija

fludarabin - L01BB05

ANTI NEOPLASTICI

L01BB analozi purina

(SZ)	0034800 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 25mg/mL; bočica staklena, 1x2 mL 8606010920196	Cena: - 236/2009/12 28.01.2009
	30 meseci, u frizideru na temperaturi od 2°C do 8°C u originalnom pakovanju, ne zamrzavati	28.01.2014

Doziranje: *hronična limfocitna leukemija B ćelija:* odrasli: preporučena doza je 25mg/m² telesne površine i.v. dnevno, tokom 5 uzastopnih dana, svakih 28 dana, tokom 6 ciklusa. Za i.v. bolus inj. može se izvršiti razblaženje sa 10mL 0,9% rastvora natrijum-hlorida ili sa 100mL 0,9% rastvora natrijum-hlorida kao i.v. inf. tokom 30 minuta; primenjivati pod nadzorom specijaliste sa iskustvom u lečenju kancera. Trajanje terapije zavisi od uspešnosti terapije i tolerancije prema

leku. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa oštećenjem jetre i/ili bubrega i kod starijih od 70 godina.

Paralelni lekovi: Fludara®

FOROSA® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

alendronska kiselina - M05BA04

LEKIVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU

M05BA bifosfonati

(R)	1059902 film tableta; 70mg; blister, 1x2 tabl. 8606010891175	Cena: 523,10din 652/2009/12 23.02.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju	23.02.2014
(R)	1059903 film tableta; 70mg; blister, 1x4 tabl. 8606010891182	Cena: 1046,30din 651/2009/12 23.02.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju	23.02.2014
(R)	1059904 film tableta; 70mg; blister, 2x4 tabl. 8606010891199	Cena: 2016,50din 653/2009/12 23.02.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju	23.02.2014

Doziranje: *postmenopausalna osteoporoz*a: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i ostati u uspravnom položaju još najmanje 30 minuta. Tabl. treba progutati celu, ne žvakati ili sisati, niti dozvoliti da se otopi u ustima. Ne preporučuje se primena kod bolesnika sa oštećenom bubrežnom funkcijom.

Paralelni lekovi: Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Bonap, Fosamax®, Lindron

GORDIUS® - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

gabapentin - N03AX12

ANTIEPILEPTICI

N03AX ostali antiepileptici

△(R)	1084096 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kaps. 5997001313640	Cena: - 4264/2008/12 25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju	25.11.2013
△(R)	1084097 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kaps. 5997001313657	Cena: - 4263/2008/12 25.11.2008
	2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju	25.11.2013

Doziranje: individualno. *Epilepsija: odrasli i adolescenti:* lečenje se započinje titriranjem doze ili davanjem 300mg tri puta dnevno prvog dana. Na osnovu individualnog terapijskog odgovora i tolerancije pacijenta, doza može dalje da se povećava za po 300 mg/dan svakih 2-3 dana, maks. 3600mg/dan, podeljeno u 3 doze. Deca od 6 godina starosti i preko: početna doza je od 10-15 mg/kg/dan, uz rastuću titraciju u trajanju od približno tri dana; efektivna doza iznosi 25-35mg/kg/dan podeljeno u 3 pojedinačne doze. *Neuropatski bol:* odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u 3 doze. Lek uzimati u toku ili između obroka, kaps. progutati celu uz dosta tečnosti (čaša vode). Opres pri primeni i prilagođavanje doze su potrebni kod starijih i bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre i/ili bubrega. Ukoliko je potrebno prekinuti lečenje, preporučuje se postepeno smanjenje doze u trajanju od najmanje jedne nedelje.

Paralelni lekovi: Gabagamma® 100, Gabagamma® 300, Gabagamma® 400, Gabalept®, Gabaneural®, Katena®, Neurontin®

HABITAX - HABIT PHARM A.D. - Srbija

paklitaksel - L01CD01

ANTINEOPLASTICI

L01CD taksani

(SZ)	0039711 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7 mL 8606010720055	Cena: 22300,00din 644/2009/12 23.02.2009
	2 godine, bez posebnih naznaka	23.02.2014

- (SZ) 0039712 koncentrat za rastvor za infuziju;
30mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL
8606010720031
2 godine, bez posebnih naznaka
- Cena:** 7130,00din
645/2009/12 23.02.2009
23.02.2014
- (SZ) 0039713 koncentrat za rastvor za infuziju;
30mg/5mL; bočica staklena, 10x5 mL
8606010720048
2 godine, bez posebnih naznaka
- Cena:** 71000,00din
646/2009/12 23.02.2009
23.02.2014

Doziranje: prema protokolu; *karcinom ovarijuma:* tretman prve linije 175mg/m² telesne površine u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m² svake 3 nedelje ili 135mg/m² u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m² sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m² u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; *karcinom dojke:* tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m² u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m² u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; *mikrocelularni karcinom pluća:* 175mg/m² u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m² sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa.

Paralelni lekovi: Paclitaxel Ebewe, Paclitaxel PharmaSwiss, Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxol®

HEPAN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

- heparin, dekspantenol** - C05BA53 **VAZOPROTEKTIVI**
C05BA heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu
- (BR) 4108172 gel; 500i.j./g+5mg/g; tuba, 1x50 g
3858881053328
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C
- Cena:** 205,10din
642/2009/12 23.02.2009
23.02.2014

Doziranje: *površinski tromboflebitis* (adjuvantna terapija): gel se nanosi u tankom sloju na bolno, upaljeno područje vena, 2-4 puta na dan, bez utrljavanja u kožu; površina se prekrije gazom i povije. Trajanje terapije je najčešće 1-2 nedelje, a u ozbiljnijim slučajevima i više nedelja. Duža upotreba treba da bude pod lekarskim nadzorom.

INFANRIX® -IPV+HIB - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana - J07CA06

VAKGINE

J07CA bakterijske i virusne vakcine, kombinacija

- (Z) 0011925 prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju; (30i.j.+25mcg+40D.j.+8D.j.+32D.j.+25mcg+8mcg+40i.j.+10mcg PRP/0.5mLi 20-40mcg T)/0.5mL; napunjen injekcioni špric i bočica, 1x0.5 mL
8606103683489
3 godine, na temperaturi 2°C do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati
- Cena:** 66,60din
852/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Doziranje: *aktivna imunizacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, poliomijelitisa i Haemophilus influenzae tip b* (kod dece starije od 2. meseca života): **Primarna vakcinacija:** podrazumeva primenu dve ili tri doze, u skladu sa nacionalnim preporukama. Prva doza se daje kod dece od navršenog 2. meseca života. Naredne doze treba dati u razmaku ne kraćem od četiri nedelje. **Buster vakcinacija:** Nakon primarne vakcinacije po šemi od dve doze, neophodno je primeniti buster dozu i to najmanje 6 meseci nakon poslednje primljene doze, najbolje između 11. i 13. meseca života. **Primenjuje se putem duboke i.m. inj. u anterolateralnu regiju butine.** Ne savetuje se primena kod dece starije od 3 godine života. Uz oprez primenjivati kod osoba sa trombocitopenijom ili poremećajima koagulacije. Nakon primene vakcine, injekciono mesto treba snažno pritisnuti u trajanju od najmanje dva minuta.

Paralelni lekovi: Pentaxim

IRDA® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**irbesartan** - C09CA04**LEKOVI KOJI DELUJU****NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni**

(R)	1103441 film tableta; 150mg; blister, 2x14 tabl. 8699540098459	Cena: 1094,60din 832/2009/12 20.03.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju	20.03.2014
(R)	1103442 film tableta; 300mg; blister, 2x14 tabl. 8699540098503	Cena: 1477,40din 830/2009/12 20.03.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju	20.03.2014
(R)	1103443 film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl. 8699540098404	Cena: 966,50din 829/2009/12 20.03.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju	20.03.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* uobičajena preporučena početna doza, kao i doza održavanja je 150mg jednom dnevno, nezavisno od hrane. Kod osoba na hemodijalizi i starijih od 75 godina početna doza je 75mg. Doza se može povećati na 300mg ili uvesti još jedan antihipertenzivni lek (diuretik). *Kod osoba sa hipertenzijom i dijabetes melitus-om tipa 2,* početna doza je 150mg jednom dnevno, a doza održavanja 300mg jednom dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.

ISENTRESS® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija**raltegravir** - J05AX08**ANTIVIRUSNI LEKOVI****ZA SISTEMSKU PRIMENU****J05AX ostali antivirusni lekovi**

(R)	1328660 film tableta; 400mg; bočica, 1x60 tabl. 8600103453615	Cena: 83545,40din 239/2009/12 28.01.2009
	30 meseci, bez posebnih naznaka	28.01.2010

Doziranje: *lečenje infekcija izazvanih virusom humane imunodeficijencije (HIV-1)* kod odraslih prethodno lečenih pacijenata, u kombinaciji sa drugim anti-retrovirusnim lekovima: *odrasli* preporučeno doziranje je 400mg dva puta dnevno, sa ili bez hrane. Ne preporučuje se žvakanje, lomljenje ili deljenje tableta. Potreban je oprez pri primeni kod starijih osoba i kod pacijenata koji imaju ozbiljna oštećenja jetre. Bezbednost i efikasnost leka nisu utvrđeni kod pacijenata mladih od 16 godina. Terapiju treba da odredi lekar koji ima iskustvo u lečenju HIV infekcije.

KLACID® IV - NI MEDIC D.O.O. - Srbija**klaritromicin** - J01FA09**ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI****ZA SISTEMSKU PRIMENU****J01FA makrolidi**

(SZ)	0325526 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica staklena, 1x500 mg 8606010301407	Cena: 1195,00din 782/2009/12 04.03.2009
	4 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti	04.03.2014

Doziranje: *infekcije donjeg respiratornog trakta* (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa), *lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija, infekcije gornjeg respiratornog trakta* (bakterijski faringitis i akutni bakterijski sinuzitis), *lakše do umereno teške infekcije kože i mekih tkiva* (folikulitis, celulitis, erizipel): *odrasli* 2 puta po 500mg dnevno u obliku i.v. inf. tokom 60 minuta, 2-5 dana. Kod bolesnika sa oštećenjem bubrega (klirens kreatinina manji od 30mL/min., preporučenu dozu smanjiti na polovinu. Osnovni rastvor za infuziju pripremiti prema uputstvu sa *Aquae pro Injectione*, upotrebiti samo bistro i slabo žuto obojene rastvore (mogu se dodati: rastvor NaCl 0,9%, rastvor glukoze 5%, rastvor Ringer-laktata ili rastvor Ringer-laktata sa rastvorom 5% glukoze). Pripremljena i.v. infuzija se može čuvati najviše 6 sati na 25°C ili 24 sata na 5°C. Priprema se i primenjuje isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, pod kontrolom zdravstvenog osoblja.

KLACID® MR - NI MEDIC D.O.O. - Srbija**klaritromicin** - J01FA09**ANTIBAKTERIJSKI LEKOV
ZA SISTEMSKU PRIMENU****J01FA makrolidi**

- (R) 1325527 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem;
500mg; blister, 1x7 tabl.
8606010301421
3 godine, na temperaturi od 30°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti

Cena: 640,00din
781/2009/12 04.03.2009
04.03.2014

Doziranje: *infekcije donjeg respiratornog trakta* (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa), *lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija*, *infekcije gornjeg respiratornog trakta* (bakterijski faringitis, akutni bakterijski sinuzitis), *lakše do umereno teške infekcije kože i mekih tkiva* (folikulitis, celulitis, erizipel): jedna tableta dnevno i može se uzeti uz obrok, 7 do 14 dana; kod jačih infekcija, doza se može povećati na dve tablete dnevno. Ne sme se koristiti kod pacijenata sa oštećenjem bubrega (klirens kreatinina manji od 30 mL/min).

Paralelni lekovi: Clarithromycin, Clathrocyn®, Fromilid®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, Zymbaktar

KLOPIDOGREL - M.D. NINI D.O.O. - Srbija**klopidogrel** - B01AC04**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)****B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin**

- (R) 1068236 film tableta; 75mg; blister, 6x14 tabl.
8606103515933
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju
- (R) 1068237 film tableta; 75mg; blister, 1x14 tabl.
8606103515919
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju
- (R) 1068238 film tableta; 75mg; blister, 4x14 tabl.
8606103515926
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju
- (R) 1068239 film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.
8606103515636
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju

Cena: 4396,50din
845/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Cena: 804,00din
846/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Cena: 2931,00din
847/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Cena: 1465,50din
848/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Doziranje: *prevencija aterotrombotičnih događaja* (u kombinaciji sa ASK), u jednokratnoj dnevnoj dozi od 75mg uz obrok ili van njega. Kod *akutnog koronarnog sindroma* bez elevacije ST-segmenta (nestabilna angina ili infarkt miokarda bez Q zupca) lečenje započeti jednokratnom udarnom dozom od 300mg, a zatim nastaviti sa 75mg jednom dnevno (uz ASK 75-325mg dnevno). Kod *akutnog infarkta miokarda* sa elevacijom ST segmenta, lečenje se sprovodi jednom dnevnom dozom od 75mg, a započinje udarnom dozom u kombinaciji sa ASK, sa/bez trombolitika. Kod pacijenata starijih od 75 godina, lečenje ne treba započinjati udarnom dozom.

Paralelni lekovi: Clopidogrel, Plavix®, Rožak®, Zyllt®

KLOPIDOGREL - SRBOLEK A.D. - Srbija**klopidogrel** - B01AC04**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)****B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin**

- (R) 1068235 film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.
8608809002694
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju

Cena: 1465,50din
844/2009/12 20.03.2009
20.03.2014

Doziranje: *prevencija aterotrombotičnih događaja* (u kombinaciji sa ASK), u jednokratnoj dnevnoj dozi od 75mg uz obrok ili van njega. Kod *akutnog koronarnog sindroma* bez elevacije ST-segmenta (nestabilna angina ili infarkt miokarda bez Q zupca) lečenje započeti jednokratnom udarnom dozom od 300mg, a zatim nastaviti sa 75mg jednom dnevno (uz ASK 75-325mg dnevno). Kod *akutnog infarkta miokarda* sa elevacijom ST segmenta, lečenje se sprovodi jednom dnevnom dozom od 75mg, a započinje udarnom dozom u kombinaciji sa

ASK, sa/bez trombolitika. Kod pacijenata starijih od 75 godina, lečenje ne treba započinjati udarnom dozom.

Paralelni lekovi: Clopidogrel, Plavix®, Rožak®, Zyllt®

LEUCOVORIN-TEVA - TEVA PHARMACHEMIE B.V. - Holandija

kalcijum-folinat - V03AF03

SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI

V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima

(SZ)	0184105 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL	Cena:	-
	8606010920189	3922/2008/12	23.10.2008
	2 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C		23.10.2013

Doziranje: za smanjenje toksičnosti i sprečavanje dejstva antagonista folne kiseline (u kombinaciji sa metotreksatom u citotoksičnoj terapiji i pri predoziranju kod odraslih i dece, u kombinaciji sa 5-fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji): za i.v. i i.m. primenu, po protokolu. Doziranje i trajanje zaštitne terapije prvenstveno zavise od tipa i doziranja u terapiji metotreksatom, pojave simptoma toksičnosti i individualnog kapaciteta za izlučivanje metotreksata. Po pravilu, prva doza kalcijum folinata je 15mg (6-12mg/m²) i treba je dati 12-24^h (najkasnije 24^h) nakon početka infuzije metotreksata. Ista doza se daje svakih 6^h tokom perioda od 72^h. Nakon nekoliko parenteralnih doza, terapija se može nastaviti oralnim oblicima leka.

Paralelni lekovi: Calciumfolinat „Ebewe“, Folcasin®, Leucovorin Ca Pliva - Lachema 25, Leucovorin Kalcijum

LINDYNETTE® 20 - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

gestoden, etinilestradiol - G03AA10

POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

G03AA gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije

(R)	1135300 obložena tableta; 75mcg+20mcg; blister, 1x21 tabl.	Cena:	387,70din
	5997001314081	245/2009/12	28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		28.01.2014
(R)	1135301 obložena tableta; 75mcg+20mcg; blister, 3x21 tabl.	Cena:	917,80din
	5997001314227	246/2009/12	28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		28.01.2014

Doziranje: *oralna kontracepcija:* jedna tableta dnevno uzastopno 21 dan (najbolje u isto doba dana). Svaki sledeći ciklus uzimanja tableta počinje posle perioda od 7 dana pauze (bez tableta). Prva tabl. se uzima prvog dana menstruacije.

Paralelni lekovi: Logest®

LINDYNETTE® 30 - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

gestoden, etinilestradiol - G03AA10

POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

G03AA gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije

(R)	1135302 obložena tableta; 75mcg+30mcg; blister, 1x21 tabl.	Cena:	-
	5997001314098	247/2009/12	28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		28.01.2014
(R)	1135303 obložena tableta; 75mcg+30mcg; blister, 3x21 tabl.	Cena:	-
	5997001314234	248/2009/12	28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		28.01.2014

Doziranje: *oralna kontracepcija:* jedna tableta dnevno uzastopno 21 dan (najbolje u isto doba dana). Svaki sledeći ciklus uzimanja tableta počinje posle perioda od 7 dana pauze (bez tableta). Prva tabl. se uzima prvog dana menstruacije.

Paralelni lekovi: Logest®

LIPIDRA® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**atorvastatin** - C10AA05**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104136 film tableta; 10mg; blister, 2x15 tabl. 8699540091900	Cena: 1009,00din 4484/2008/12 15.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju	15.12.2013
(R)	1104137 film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl. 8699540091924	Cena: 1685,00din 4485/2008/12 15.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju	15.12.2013
(R)	1104138 film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl. 8699540091948	Cena: 2009,30din 4483/2008/12 15.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju	15.12.2013
(R)	1104139 film tableta; 80mg; blister, 5x6 tabl. 8699540091887	Cena: 2515,20din 4482/2008/12 15.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju	15.12.2013

Doziranje: *primarna hiperholesterolemija, heterozigotna porodična hiperholesterolemija, mešovita hiperlipidemija* kod odraslih i dece starije od 10 godina, kada dijeta i druge nefarmakološke mere nisu dovoljne, *primarna prevencija kod dijabetesa tipa II:* odrasli uobičajena početna doza je 10mg na dan. Doza se prilagođava individualno prema vrednostima LDL-holesterola pre započinjanja lečenja i prema kliničkom odgovoru na terapiju; dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan; maks. doza 80mg/dan; deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno, maks. doza 20mg dnevno.

Paralelni lekovi: Atacor®, Atoris®, Sortis®, Torvalipin®, Tulip®

LUXETA® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska**sertralín** - N06AB06**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R)	1072814 film tableta; 50mg; blister, 2x14 tabl. 3850114221702	Cena: - 654/2009/12 23.02.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka	23.02.2014

Doziranje: *terapija simptoma depresivnog oboljenja sa pridruženom anksioznošću:* kod odraslih, inicijalna doza od 50mg jednom dnevno, može se (ukoliko je potrebno) postupno povećavati za 50mg u toku nekoliko nedelja, do maks. doze od 200mg/dan; uobičajena doza održavanja je 50mg/dan. Ne primenjuje se kod osoba mlađih od 18 godina. *Opsesivno-kompulsivni poremećaj:* kod dece starije iznad 13 godina, adolescenata i odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se postupno povećati do najviše 200mg/dan (za 50mg u toku nekoliko nedelja), kod dece uzrasta 6-12 godina inicijalna doza od 25mg/dan može se povećati nakon 7 dana na 50mg/dan i potom u intervalima od najmanje 7 dana do najviše 200mg/dan. *Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP):* započeti sa 25mg/dan, a posle jedne nedelje dozu povećati na 50 mg/dan. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Paralelni lekovi: Asentra®, Onirux®, Optibel®, Serlift®, Sertiva®, Sertralín ICP®, Sidata, Zolof®

MELOXEP - EXTRACTUMPHARMA CO. LTD. - Mađarska**meloksikam** - M01AC06**ANTIINFLAMATORNI****I ANTIREUMATSKI PROIZVODI****M01AC oksikami**

(R)	1161106 tableta; 15mg; blister, 2x10 tabl. 8606104873018	Cena: 293,80din 253/2009/12 28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	28.01.2014
(R)	1161107 tableta; 15mg; blister, 3x10 tabl. 8606104873025	Cena: 446,70din 257/2009/12 28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	28.01.2014

Doziranje: *Osteoartrza:* početna doza je 7.5mg/dan, ukoliko je neophodno, doza se može povećati do 15mg/dan; *reumatoidni artritis:* 15mg/dan, može se smanjiti smanjiti na 7.5mg/dan, u skladu sa terapijskim odgovorom; *ankilozirajući spondilitis:* 15mg/dan; maks. doza

je 15mg/dan. Preporučena doza za dugotrajnu primenu kod starijih osoba je 7.5mg/dan. Kod bolesnika sa ozbiljnim renalnim oštećenjem koji su na dijalizi ili sa hepatičkim poremećajima, doza ne sme prelaziti 7.5mg/dan. Tablete treba progutati sa vodom ili nekom drugom tečnošću za vreme jela.

Paralelni lekovi: Loartroxy®, Lormed®, Medoxicam, Meloksikam, Melox, Melox Fort, Movalis®

MIMPARA® - AMGEN EUROPE B.V. - Holandija

sinakalset - H05BX01

HOMEOSTAZA KALCIJUMA

H05BX drugi anti-paratiroidni agensi

(R)	1040300 film tableta; 30mg; blister, 1x14 tabl. 8715131002893	Cena: 8994,90din 4496/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040301 film tableta; 30mg; blister, 2x14 tabl. 8715131002909	Cena: 17989,90din 4502/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040302 film tableta; 30mg; blister, 6x14 tabl. 8715131002916	Cena: 53969,60din 4501/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040303 film tableta; 60mg; blister, 1x14 tabl. 8715131002923	Cena: 16605,80din 4498/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040304 film tableta; 60mg; blister, 2x14 tabl. 8715131002930	Cena: 33211,70din 4500/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040305 film tableta; 60mg; blister, 6x14 tabl. 8715131002947	Cena: 99635,00din 4504/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040306 film tableta; 90mg; blister, 1x14 tabl. 8715131002954	Cena: 24909,00din 4497/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040307 film tableta; 90mg; blister, 2x14 tabl. 8715131002961	Cena: 49818,00din 4503/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013
(R)	1040308 film tableta; 90mg; blister, 6x14 tabl. 8715131002978	Cena: 149454,10din 4499/2008/12 15.12.2008
	4 godine, bez posebnih naznaka	15.12.2013

Doziranje: sekundarni hiperparatiroidizam (HPT) kod bolesnika sa bolešću bubrega u terminalnoj fazi (ESRD) koji su na dijalizi: preporučena početna doza za odrasle je 30mg jednom dnevno, doza se može povećavati svake 2-4 nedelje do maks. 180mg jednom dnevno; karcinom paratiroidne i primarni hiperparatiroidizam 2 puta dnevno po 30mg, doza se može povećavati na svake 2-4 nedelje i to dozama 30mg dva puta dnevno, 60mg dva puta dnevno, 90mg dva puta dnevno, ili 90mg tri do četiri puta dnevno, maks. doza je 4 puta na dan po 90mg; sekundarni hiperparatiroidizam odrasli i osobe starijeg životnog doba (>65 godina) 30mg jednom dnevno do maks. 180mg jednom dnevno, doza se može povećavati svake 2-4 nedelje do maks. 180mg jednom dnevno. Tabl. se uzimaju uz obrok ili ubrzo posle jela, cele i ne treba ih deliti.

MINIRIN MELT - FERRING AB - Švedska

dezmpresin - H01BA02

HORMONI HIPOFIZE

I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01BA vazopresin i analozi

(R)	1045082 oralni liofilizat; 120mcg; blister, 3x10 kom 8606007080742	Cena: 3442,50din 4415/2008/12 10.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage	10.12.2013

(R)	1045083 oralni liofilizat; 240mcg; blister, 3x10 kom 8606007080759	Cena: 7167,20din 4414/2008/12	10.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage		10.12.2013
(R)	1045084 oralni liofilizat; 60mcg; blister, 3x10 kom 8606007080735	Cena: 1725,50din 4416/2008/12	10.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage		10.12.2013

Doziranje: *insipidni dijabetes centralnog tipa:* preporučena početna doza za decu i odrasle je 60mcg, sublingvalno, 3 puta dnevno; doza se prilagođava u zavisnosti od odgovora pacijenta. *Primarna nokturnalna enureza:* preporučena početna doza je 120mcg pre spavanja, sublingvalno, doza se može povećati do 240mcg. *Nokturija:* preporučena početna doza je 60mcg pre spavanja, sublingvalno. Ukoliko se primenjena doza tokom prve nedelje pokaže neefikasnom, može se u nedeljnim intervalima povećati na 120mcg, a zatim i na 240mcg. Unos tečnosti mora biti ograničen. **Oral. liofilizat od 240mcg dezmopresina (u obliku acetata) odgovara primeni 2 tabl. po 200mcg dezmopresin-acetata.**

MINIRIN MELT - FERRING GMBH - Nemačka

dezmopresin - H01BA02

HORMONI HIPOFIZE

I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01BA vazopresin i analozi

(R)	1045082 oralni liofilizat; 120mcg; blister, 3x10 kom 8606007081831	Cena: 3442,50din 1007/2009/12	10.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage		10.12.2013
(R)	1045083 oralni liofilizat; 240mcg; blister, 3x10 kom 8606007081848	Cena: 7167,20din 1006/2009/12	10.12.2008
	2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage		10.12.2013
(R)	1045084 oralni liofilizat; 60mcg; blister, 3x10 kom 8606007081824	Cena: 1725,50din 1008/2009/12	10.12.2008
	2 godine, na sobnoj temperaturi do 25 °C, na suvom mestu		10.12.2013

Doziranje: *insipidni dijabetes centralnog tipa:* preporučena početna doza za decu i odrasle je 60mcg, sublingvalno, 3 puta dnevno; doza se prilagođava u zavisnosti od odgovora pacijenta. *Primarna nokturnalna enureza:* preporučena početna doza je 120mcg pre spavanja, sublingvalno, doza se može povećati do 240mcg. *Nokturija:* preporučena početna doza je 60mcg pre spavanja, sublingvalno. Ukoliko se primenjena doza tokom prve nedelje pokaže neefikasnom, može se u nedeljnim intervalima povećati na 120mcg, a zatim i na 240mcg. Unos tečnosti mora biti ograničen. **Oral. liofilizat od 240mcg dezmopresina (u obliku acetata) odgovara primeni 2 tabl. po 200mcg dezmopresin-acetata.**

NASIC - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

ksilometazolin, dekspantenol - R01AB06

NAZALNI PREPARATI

R01AB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida

(BR)	7110400 sprej za nos, rastvor; 0.1%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 mL 4008617225218	Cena: - 251/2009/12	28.01.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		28.01.2014

Doziranje: *nazalna kongestija* (kod prehlade, vazomotornog rinitisa, alergijskih poremećaja ili infekcije sinusa), *otežano disanje kroz nos posle operacije nosa:* deca starija od 12 godina, adolescenti i odrasli: 1-3 puta dnevno ubrizgati po 1 sprej-dozu u svaku nozdrvnu, dišući lagano kroz nos i držeći bočicu uspravno. Ne koristiti lek više od 3 puta dnevno, ni duže od 5 dana.

Paralelni lekovi: Nasic za decu

NASIC ZA DECU - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

ksilometazolin, dekspantenol - R01AB06

NAZALNI PREPARATI

R01AB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida

(BR)	7110401 sprej za nos, rastvor; 0.05%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 mL 4008617225225	Cena: - 252/2009/12	28.01.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		28.01.2014

Doziranje: *nazalna kongestija* (kod prehlade, vazomotornog rinitisa, alergijskih poremećaja ili infekcije sinusa), *otežano disanje kroz nos posle operacije nosa*: deca uzrasta od 2-12 godina: 1-3 puta dnevno ubrizgati po 1 sprej-doza u svaku nozdrvnu, dišući lagano kroz nos i držeći bočicu uspravno. Ne koristiti lek više od 3 puta dnevno, ni duže od 3 dana, niti kod dece mlađe od 2 godine.

Paralelni lekovi: Nasic

NEOTIGASON® - CENEXI SAS - Francuska

acitretin - D05BB02

LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)

D05BB retinoidi u terapiji psorijaze

(R)	1155510 kapsula, tvrda; 10mg; blister, 3x10 kaps. 5690528199024 3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage	Cena: 1546,70din 1923/2008/12 26.05.2008 05.06.2011
(R)	1155511 kapsula, tvrda; 10mg; blister, 10x10 kaps. 5690528199055 3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage	Cena: 5155,70din 1927/2008/12 26.05.2008 07.06.2011
(R)	1155512 kapsula, tvrda; 25mg; blister, 3x10 kaps. 5690528199079 3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage	Cena: 3311,60din 1926/2008/12 26.05.2008 07.06.2011
(R)	1155513 kapsula, tvrda; 25mg; blister, 10x10 kaps. 5690528199109 3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage	Cena: 11038,70din 1925/2008/12 26.05.2008 07.06.2011

Doziranje: *teški oblici psorijaze rezistentni na drugu terapiju, palmo-plantarna pustularna psorijaza i teški oblici folikularne keratoze*: inicijalna doza je individualna i obično iznosi 25-30mg jednom dnevno (uz obrok ili sa mlekom) tokom 2-4 nedelje; doza održavanja zavisi od inicijalnog odgovora i obično iznosi 25-50mg dnevno tokom narednih 6-8 nedelja; *teški oblici kongenitalne ihtioze*: inicijalna doza obično iznosi 10mg i oprezno se povećava zbog mogućnosti pojave izomorfnihi reakcija. Ne koristiti lek duže od 6 meseci, niti kod dece.

OMICRAL - MEDICO UNO D.O.O. - Srbija

itrakonazol - J02AC02

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

J02AC derivati triazola

(R)	1327505 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kaps. 8606105717113 2 godine, na temperaturi do 30°C	Cena: 1381,00din 1147/2009/12 01.04.2009 15.12.2013
(R)	1327506 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 4x7 kaps. 8606105717120 2 godine, na temperaturi do 30°C	Cena: 2312,00din 1148/2009/12 01.04.2009 15.12.2013
(R)	1327507 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kaps. 8606105717106 2 godine, na temperaturi do 30°C	Cena: 392,00din 1146/2009/12 01.04.2009 15.12.2013

Doziranje: *orofaringealna kandidijaza*: 100mg/dan tokom 15 dana (200mg/dan tokom 15 dana kod pacijenata koji imaju AIDS ili neutropeniju); *vulvovaginalna kandidijaza*: 2 puta po 200mg u jednom danu; *pityriasis versicolor*: 200mg/dan tokom 7 dana; *tinea corporis i tinea cruris*: 100mg/dan tokom 15 dana ili 200mg/dan tokom 7 dana; *tinea pedis i tinea manuum*: 100mg/dan tokom 30 dana ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana; *ohinomikoze*: 200mg/dan tokom 3 meseca ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana u 2-3 ciklusa (nakon pauze od 3 nedelje); *sistemске aspergiloze, kandidijaze i kriptokokoze, nakon neuspeha prethodne terapije*: 200mg/dan tokom 3 meseca (2 puta po 200mg/dan kod kriptokoknog meningitisa i drugih invazivnih infekcija) i uz održavanje terapije sa 200mg/dan kod pacijenata koji imaju AIDS ili neutropeniju. Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 12 godina.

Paralelni lekovi: Funit, Kanazol®, Prokanazol®

OMNISCAN™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska**gadodiamid** - V08CA03**KONTRASTNA SREDSTVA****V08CA paramagnetna kontrastna sredstva**

(Z)	0199420	rastvor za injekciju; 0,5mmol/mL; bočica staklena, 10x10 mL	Cena:	31170,90din
	8606104307148		1209/2009/12	06.03.2009
		3 godine, zaštićeno od svetlosti		04.03.2014
(Z)	0199421	rastvor za injekciju; 0,5mmol/mL; bočica staklena, 10x15 mL	Cena:	46292,70din
	8606104307155		1210/2009/12	06.03.2009
		3 godine, zaštićeno od svetlosti		04.03.2014
(Z)	0199422	rastvor za injekciju; 0,5mmol/mL; bočica staklena, 10x20 mL	Cena:	60481,40din
	8606104307162		1211/2009/12	06.03.2009
		3 godine, zaštićeno od svetlosti		04.03.2014

Doziranje: *kontrastno sredstvo za ispitavanje mozga i kičmene moždine magnetnom rezonancom:* odrasli i deca uobičajeno 0,1mmol/kg telesne mase (kod pacijenata ≤100kg: 0,2mL/kg, a >100kg: 20mL kontrasta) u vidu pojedinačne i.v. bolus inj., a kod suspektne metastaze: 0,3mmol/kg telesne mase (kod pacijenata ≤100kg: 0,6mL/kg, a >100kg: 60mL kontrasta); *magnetna rezonanca celog tela:* odrasli i deca starija od 6 meseci: 0,1mmol/kg (0,2mL/kg); *angiografija:* odrasli 0,1mmol/kg (0,2mL/kg), a kod stenoze abdominalnih i ilijakalnih arterija 0,3mmol/kg (0,6 mL/kg).

OXIS® TURBUHALER® - ASTRAZENACA AB - Švedska**formoterol** - R03AC13**LEKOWI KOJI SE PRIMENJUJU****U OPSTRUKTIVNOJ PLUČNOJ BOLESTI****R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora**

(R)	7114162	prašak za inhalaciju; 4,5mcg/doza; kontejner višedozni, 1x60 doza	Cena: 1203,10din
	7321839710766		250/2009/12 28.01.2009
		2 godine, na temperaturi do 30°C, zatvoren zaštitnim poklopcem	28.01.2014
(R)	7114163	prašak za inhalaciju; 9mcg/doza; kontejner višedozni, 1x60 doza	Cena: 2063,90din
	7321839710773		249/2009/12 28.01.2009
		2 godine, na temperaturi do 30°C, zatvoren zaštitnim poklopcem	28.01.2014

Doziranje: *simptomatska terapija hronične opstruktivne bolesti pluća:* 1 inhalaciona doza od 9mcg jednom ili dva puta dnevno; *dodatna terapija na tretman održavanja hronične astme inhalacionim kortikosteroidima, radi olakšanja bronhoopstruktivnih simptoma:* deca starija od 6 godina, adolescenti i odrasli: 1 inhalaciona doza od 9mcg jednom ili dva puta dnevno (redovna primena) i ako je potrebno: 1 inhalaciona doza od 9mcg neposredno pre vežbanja (preventivna primena), pojedinačna doza ne treba da bude veća od 18mcg kod odraslih i 9mcg kod dece. Ne koristiti lek kod dece mlađe od 6 godina. Ne koristiti lek u akutnom napadu bronhijalne astme.

Paralelni lekovi: **Respilong®****PANADOL® BABY - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska****paracetamol** - N02BE01**ANALGETICI****N02BE anilidi**

(BR)	3086741	oralna suspenzija; 120mg/5mL; bočica staklena, 1x100 mL	Cena:	-
	3830029291724		4511/2008/12	15.12.2008
		3 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati		15.12.2013

Doziranje: *slabi do umereno jaki bolovi i febrilna stanja:* deca od 1-3 meseca: 1,25-2,5mL (30-60mg) svakih 8 sati; deca od 3 meseca do 1 godine: 2,5-5mL (60-120mg) svakih 4-6 sati; deca od 1-6 godina: 5-10mL (120-240 mg) svakih 4-6 sati; deca od 6-12 godina: 10-20mL (240-480mg) svakih 4-6 sati (primeniti najviše 4 doze leka u toku 24 sata i ne primenjivati lek duže od 3 dana); *postimunizaciona piroksija:* kod dece uzrasta od 2-3 meseca doza je 2,5mL (60mg) i može se

ponoviti nakon 6 sati ukoliko je neophodno. Kod dece mlađe od 1 godine, za precizno doziranje koristiti sterilnu brizgalicu od 5mL.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Paracetamol, Paracetamol Sopharma, Perfalgan®

PARACETAMOL SOPHARMA - SOPHARMA PLC - Bugarska

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

(BR) 3086742 sirup; 120mg/5mL; bočica staklena, 1x125 mL

Cena: -

3800010650731

237/2009/12 28.01.2009

3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati

28.01.2014

Doziranje: *slabi do umereno jaki bolovi i febrilna stanja:* deca od 1-3 meseca: 1,25-2,5mL (30-60mg) svakih 8 sati; deca od 3 meseca do 1 godine: 2,5-5mL (60-120mg) svakih 4-6 sati; deca od 1-6 godina: 5-10mL (120-240 mg) svakih 4-6 sati; deca od 6-12 godina: 10-20mL (240-480mg) svakih 4-6 sati (primeniti najviše 4 doze leka u toku 24 sata i ne primenjivati lek duže od 3 dana); *postimunizaciona pireksija:* kod dece uzrasta od 2-3 meseca doza je 2,5mL (60mg) i može se ponoviti nakon 6 sati ukoliko je neophodno. Kod dece mlađe od 1 godine, za precizno doziranje koristiti sterilni špric od 5mL.

Paralelni lekovi: Efferalgan®, Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol, Perfalgan®

PAVULON® - ORGANON S.A. - Francuska

pankuronijum-bromid - M03AC01

MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03AC ostala kvaternerna amonijum jedinjenja

(SZ) 0082350 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 50x2 mL

Cena: 4788.80din

8600103419352

1015/2009/12 27.03.2009

3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C zaštićeno od svetlosti

22.01.2013

Doziranje: *mišićna relaksacija* tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorođenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno.

PENTASA® - FERRING - LEČIVA, A.S. - Češka

mesalazin - A07EC02

ANTIDIJARIOCI, INTESTINALNI

ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFektivNI LEKOVİ

A07EC aminosalicilna kiselina i slični preparati

(R) 5129132 rektalna suspenzija; 1g/100mL; bočica, 7x100 mL

Cena: -

8606102233128

4110/2008/12 13.11.2008

2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju; na zamrzavati

13.11.2013

Doziranje: *lakši i umereni oblici ulceroznog kolitisa sigmoidnog kolona i rektuma, aktivna bolest:* odrasli 1000mg pre spavanja (100mL rektalne suspenzije) tokom 2-4 nedelje, pre primene preporučuje se pražnjenje creva; *lakši i umereni oblici ulceroznog kolitisa, aktivna bolest i održavanje remisije:* akutni napad 3 puta po 1000mg dnevno (najviše 4g dnevno ili 8 tableta sa produženim oslobađanjem), terapija održavanja: 3 puta po 500mg dnevno; *lakši i umereni oblici Crohnov-og ileokolitisa, aktivna bolest:* 3 puta po 500mg dnevno tokom 6 nedelja. Ne koristiti lek kod dece mlađe od 6 godina.

Paralelni lekovi: 5-ASA, Asacol®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500

PERFALGAN® - BIEFFE MEDITAL SPA - Italija

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

(SZ) 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL

Cena: 3265,80din

8606007081589

1028/2009/12 23.10.2008

2 godine, na temperaturi do 30° C

23.10.2013

Doziranje: *kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana:* odrasli >50kg: 1000mg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g;

deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

PERFALGAN® - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (SZ) | 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL
8606007081602 | Cena: 3265,80din
1027/2009/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30° C | | 23.10.2013 |
| (SZ) | 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL
8606007081572 | Cena: 1633,20din
1026/2009/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30° C | | 23.10.2013 |

Doziranje: *kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana:* odrasli >50kg: 1000mg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

PERFALGAN® - BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - Italija

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (SZ) | 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL
8606007081558 | Cena: 3265,80din
3916/2008/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30°C, ne cuvati u frizideru i ne zamrzavati | | 23.10.2013 |
| (SZ) | 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL
8606007081541 | Cena: 1633,20din
3915/2008/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30°C, ne cuvati u frizideru i ne zamrzavati | | 23.10.2013 |

Doziranje: *kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana:* odrasli >50kg: 1000mg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

PERFALGAN® - RENAUDIN LABORATORIES - Francuska

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (SZ) | 0086692 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL
8606007081596 | Cena: 3265,80din
1025/2009/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30° C | | 23.10.2013 |
| (SZ) | 0086693 rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL
8606007081565 | Cena: 1633,20din
1024/2009/12 | 23.10.2008 |
| | 2 godine, na temperaturi do 30° C | | 23.10.2013 |

Doziranje: *kratkotrajna terapija umerenog bola i febrilnih stanja nakon hirurških intervencija ili u drugim urgentnim stanjima, kada je i.v. primena paracetamola klinički opravdana:* odrasli >50kg: 1000mg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 4g; deca >33kg (10 godina) i odrasli >50 kg: 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 3g; deca >10kg (1 godina): 15mg/kg paracetamola po jednoj inf., maks. dnevna doza je 2g. Interval između pojedinih doza (inf.) ne sme biti manji od 4 sata.

PHYSIOTENS® - SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska**moksonidin** - C02AC05**ANTIHIPERTENZIVI****C02AC agonisti imidazolinskih receptora**

△(R)	1103481 film tableta; 0,2mg; blister, 2x14 tabl. 8606103442260	Cena: 552,90din 244/2009/12 28.01.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C	28.01.2014
△(R)	1103482 film tableta; 0,4mg; blister, 2x14 tabl. 8606103442277	Cena: 903,10din 243/2009/12 28.01.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C	28.01.2014

Doziranje: blaga do umerena esencijalna ili primarna hipertenzija: uobičajena početna doza je 0,2mg dnevno, maks. dnevna doza je 0,6mg (u dve podeljene doze), a maks. pojedinačna doza je 0,4mg (doza održavanja se podešava individualno, u skladu sa odgovorom pacijenta). Kod pacijenata na hemodijalizi početna doza je 0,2mg dnevno. Ne koristiti lek kod dece i adolescenata mlađih od 16 godina.

Paralelni lekovi: Moxogamma 0.2, Moxogamma 0.3, Moxogamma 0.4

PRADAXA® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka**dabigatraneteksilat** - B01AE07**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA****(ANTIKOAGULANSI)****B01AE direktni inhibitori trombina**

(SZR)	1069610 kapsula, tvrda; 110mg; blister, 6x10 kaps. 8606103075239	Cena: - 862/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069610 kapsula, tvrda; 110mg; bočica plastična, 1x60 kaps. 8606103075253	Cena: - 863/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069611 kapsula, tvrda; 75mg; blister, 3x10 kaps. 8606103075192	Cena: 7449,60din 858/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069612 kapsula, tvrda; 75mg; blister, 6x10 kaps. 8606103075208	Cena: - 856/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069612 kapsula, tvrda; 75mg; bočica plastična, 1x60 kaps. 8606103075246	Cena: - 859/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069613 kapsula, tvrda; 110mg; blister, 1x10 kaps. 8606103075215	Cena: 2493,80din 860/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069614 kapsula, tvrda; 110mg; blister, 3x10 kaps. 8606103075222	Cena: 7449,60din 861/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014
(SZR)	1069615 kapsula, tvrda; 75mg; blister, 1x10 kaps. 8606103075185	Cena: 2493,80din 857/2009/12 20.03.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	20.03.2014

Doziranje: primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata, nakon elektivnog hirurškog zahvata (totalne zamene kolena ili kuka): totalna zamena kolena: terapiju početi 1-4 sata posle završetka operacije sa 1 kaps. (110mg) i nakon toga nastaviti sa 2 kaps. (220mg) jednom dnevno, tokom ukupno 10 dana; totalna zamena kuka: terapiju početi 1-4 sata posle završetka operacije sa 1 kaps. (110mg) i nakon toga nastaviti sa 2 kaps. (220mg) jednom dnevno, tokom ukupno 28-35 dana. Ukoliko nije postignuta hemostaza, početak terapije treba odložiti (kod obe vrste operacija). Kada se sa terapijom ne počne na dan operacije, treba je započeti sa 2 kaps. jednom dnevno.

PRALIP® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija**pravastatin** - C10AA03**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104485 tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl. 8606010890819	Cena: 566,00din 3917/2008/12	23.10.2008
	3 godine, u originalnom pakovanju		23.10.2013
(R)	1104486 tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl. 8606010890826	Cena: 1092,00din 3923/2008/12	23.10.2008
	3 godine, u originalnom pakovanju		23.10.2013
(R)	1104487 tableta; 20mg; blister, 9x10 tabl. 8606010890833	Cena: 1698,70din 3936/2008/12	23.10.2008
	3 godine, u originalnom pakovanju		23.10.2013
(R)	1104488 tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl. 8606010890840	Cena: 3276,20din 3935/2008/12	23.10.2008
	3 godine, u originalnom pakovanju		23.10.2013

Doziranje: hiperholesterolemija: 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje, do 40mg dnevno.

Paralelni lekovi: PravaCor®, Pravapres®

PRAVAPRES® - SOPHARMA PLC - Bugarska**pravastatin** - C10AA03**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104453 tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl. 3800041903172	Cena: 470,20din 4506/2008/12	15.12.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C		15.12.2013
(R)	1104454 tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl. 3800041903189	Cena: 566,00din 4507/2008/12	15.12.2008
	2 godine, na temperaturi do 25°C		15.12.2013

Doziranje: hiperholesterolemija: 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje, do 40mg dnevno.

Paralelni lekovi: Pralip®, PravaCor®

PRIMOVIŠT® - BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka**gadoksetinska kiselina** - V08CA10**KONTRASTNA SREDSTVA****V08CA paramagnetna kontrastna sredstva**

(Z)	0199535 rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni špric, 1x10 mL 8600103492522	Cena: 16719,70din 238/2009/12	28.01.2009
	5 godina, bez posebnih naznaka		28.01.2014
(Z)	0199536 rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni špric, 5x10 mL 8600103492515	Cena: 83598,50din 235/2009/12	28.01.2009
	5 godina, bez posebnih naznaka		28.01.2014

Doziranje: dijagnostik za klasifikaciju i karakterizaciju fokalnih lezija jetre (magnetna rezonanca-NMR): odrasli: i.v. bolus inj. od 0.1mL/kg telesne mase; pacijent treba da leži, i da ne uzima hranu dva sata pre snimanja, a posle inj. se mora posmatrati najmanje 30 min. zbog mogućih neželjenih dejstava. Proceduru treba da sprovodi posebno obučan lekar za ove procedure ispitivanja.

PROTONEXA - MEDICO UNO D.O.O. - Srbija**lansoprazol - A02BC03****LEKOWI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA****A02BC inhibitori protonске pumpe**

(R)	1122950 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 2x7 kaps. 8606105717052	Cena: 300,80din 1166/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013
(R)	1122951 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 4x7 kaps. 8606105717069	Cena: 601,00din 1167/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013
(R)	1122952 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 1x7 kaps. 8606105717045	Cena: 150,00din 1165/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013
(R)	1122953 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 2x7 kaps. 8606105717083	Cena: 485,00din 1170/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013
(R)	1122954 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 4x7 kaps. 8606105717090	Cena: 1048,00din 1171/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013
(R)	1122955 gastrozerezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x7 kaps. 8606105717076	Cena: 242,00din 1169/2009/12	01.04.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage		25.11.2013

Doziranje: *benigni gastrični ulkus:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 8 nedelja; *duodenusni ulkus:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 4 nedelje i održavanje sa 15mg/dan; *duodenusni ili gastrični ulkus usled primene NSAID:* lečenje 30mg/dan tokom 4 nedelje i ako je potrebno još 4 nedelje, *profilaksa* 15-30mg/dan; *eradikacija H. Pylori:* 2 puta po 30mg/dan uz amoksisilin 2 puta po 1g/dan ili klaritromicin 2 puta po 500mg/dan ili metronidazol 2 puta po 400mg/dan; *Zollinger-Ellison-ov sindrom:* inicijalna doza 60mg/dan ili 2 puta po 60mg/dan prilagođava se odgovoru; *gastroezofagusni refluks:* 30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 4 nedelje i ako je potrebno još 4 nedelje i održavanje sa 15-30mg/dan; *dispepsija usled hiperaciditeta:* 15-30mg u jednoj jutarnjoj dozi tokom 2-4 nedelje.

Paralelni lekovi: Lansoprazol ICP®, Lanzul®, Lanzul® S, Sabax®

REGULON® - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska**dezagostrel, etinilestradiol - G03AA09****POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA****G03AA gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije**

(R)	1135233 film tableta; 0.15mg+0.03mg; blister, 1x21 tabl. 5997001314043	Cena: 298,60din 3920/2008/12	23.10.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		23.10.2013
(R)	1135234 film tableta; 0.15mg+0.03mg; blister, 3x21 tabl. 5997001314050	Cena: 895,90din 3921/2008/12	23.10.2008
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		23.10.2013

Doziranje: *oralna kontracepcija:* prvog dana menstruacije 1 tabl. dnevno (preporučuje se uvek u isto vreme, najbolje uveče) bez prekida tokom 21 dana. Nakon toga sledi pauza od 7 dana, bez uzimanja tableta. Svako naredno pakovanje se uzima nakon proteklog 7-dnevnog perioda pauze. Ukoliko je menstruacija već započela (2, 3 ili 4 dana ranije), uzimanje tabl. treba započeti 5. dana menstruacije, ali u tom slučaju moraju biti korišćene dodatne mere kontracepcije tokom prvih 7 dana uzimanja tableta. Korišćenje sledećeg pakovanja sa 21 tabl. trebalo bi da počne 8. dana nakon proteklog 7-dnevnog perioda pauze bez tabl. (4 nedelje posle uzimanja prve tabl., u istom danu u nedelji), čak i ako krvarenje još uvek nije prestalo. Sa ovakvim rasporedom doza trebalo bi nastaviti sve dok je kontracepcija neophodna.

Paralelni lekovi: Mercilon®, Novynette

REXETIN® - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska**paroksetin** - N06AB05**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

▲(R) 1072913 film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.

Cena: -

5997001313398

643/2009/12 23.02.2009

3 godine, u originalnom pakovanju, bez posebnih naznaka

23.02.2014

Doziranje: *depresija, socijalni i generalizovani anksiozni poremećaji, posttraumatski stresni poremećaji:* obično 20mg/dan, po potrebi, povećati za po 10mg, do maks. 50mg/dan, najkraće 6 meseci; *opsesivno kompulzivni poremećaj:* početna doza je 20mg/dan, po potrebi, povećavati postepeno, za po 10mg/dan, do maks. 60mg/dan, nekoliko meseci; *panični poremećaji:* savetuje se doza od 40mg/dan, početi sa 10mg/dan, po potrebi povećavati do maks. 60mg/dan. Tabl. progutati ujutro, uz jelo, ne žvakati.

Paralelni lekovi: Seroxat**ROTARIX® - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija****živa vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom** - J07BH01**VAKCINE****J07BH vakcine protiv dijareje izazvane rota virusom**(Z) 2011921 prašak i rastvarač za oralnu suspenziju; 10⁶ CCID50/ml;**Cena:** -

bočica i rastvarač u oralnom aplikatoru, 1x1 mL

3310/2008/12 02.10.2008

8606103683298

02.10.2013

3 godine, na temperaturi 2-8°C

Doziranje: *aktivna imunizacija dece od šeste nedelje života u cilju prevencije gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusom:* Imunizacija se sastoji od dve doze. Prva doza se može primeniti počev od 6. nedelje života. Interval između primene dve doze treba da bude najmanje četiri nedelje. Poželjno je da se vakcinacija završi pre 16. nedelje života, ali se mora završiti zaključno sa navršene 24 nedelje života. Vakcinu treba primeniti odmah nakon rekonstitucije, a rekonstituisana vakcina je stabilna tokom 24 časa, kada se čuva na sobnoj temperaturi (18°C do 25°C). Dete treba se postavi u sedeći položaj, sa naslonjenim leđima; sadržaj iz oralnog aplikatora istisnutu na unutrašnju stranu obraza. Primenu vakcine treba odložiti ukoliko postoji akutno, teško febrilno stanje, dijareja ili povraćanje; prisustvo blage infekcije ne predstavlja kontraindikaciju za imunizaciju. Vakcina nije namenjena za primenu kod odraslih osoba.

Paralelni lekovi: Rotateq**ROZAMET® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska****metronidazol** - D06BX01**ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU****D06BX ostali hemioterapeutici**

(R) 4150420 krem; 1%; tuba, 1x25 g

Cena: 349,50din

3858881053069

234/2009/12 28.01.2009

2 godine, na temperaturi do 25°C

28.01.2014

Doziranje: *inflamatorne lezije i eritem kod rozacee:* 1-2 puta dnevno (ujutro i uveče) u tankom sloju naneti na obolelo mesto. Lečenje obično traje 1-2 meseca, a tokom primene treba izbegavati izlaganje suncu. Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: COLPOCIN-T**SERLIFT® - MEDICO UNO D.O.O. - Srbija****sertralín** - N06AB06**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R) 1072501 film tableta; 50mg; blister, 2x14 tabl.

Cena: 489,30din

8606105717137

739/2009/12 25.02.2009

3 godine, Na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od vlage

06.03.2011

(R) 1072502 film tableta; 100mg; blister, 2x14 tabl.

Cena: 852,10din

8606105717144

740/2009/12 25.02.2009

3 godine, Na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od vlage

06.03.2011

Doziranje: *terapija simptoma depresivnog oboljenja sa pridruženom anksioznošću:* kod odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan, u jednoj pojedinačnoj dozi, može se (ukoliko je potrebno) postupno povećavati za 50mg u toku nekoliko nedelja, do maks. doze od 200mg/dan; *opsesivno-kompulsivni poremećaj:* inicijalna doza od 50mg/dan može se postupno povećati do najviše 200mg/dan, u intervalima od najmanje nedelju dana; *panični poremećaji sa ili bez agorafobije:* inicijalna doza je 25mg jednom dnevno, može se povećati nakon nedelju dana na 50mg/dan i potom u intervalima od najmanje 7 dana do najviše 200mg/dan. Ne primenjuje se za lečenje dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Asetra®, Luxeta®, Onirux®, Optibel®, Sertiva®, Sertralín ICP®, Sidata, Zoloft®

SILDENA - HEMOFARM AD - Srbija

sildenafil - G04BE03

UROLOŠKI LEKOVÍ

G04BE lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije

(R)	1139106 film tableta; 100mg; blister, 1x1 tabl. 8600097409506	Cena: 618,90din 256/2009/12 28.01.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	28.01.2014
(R)	1139107 film tableta; 25mg; blister, 1x1 tabl. 8600097409483	Cena: 469,70din 254/2009/12 28.01.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	28.01.2014
(R)	1139108 film tableta; 50mg; blister, 1x1 tabl. 8600097409490	Cena: 512,10din 258/2009/12 28.01.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage	28.01.2014

Doziranje: *terapija erektilne disfunkcije:* preporučena doza je 50mg, na oko 1 sat pre seksualne aktivnosti. U zavisnosti od efikasnosti i podnošljivosti, doza može da se poveća na 100mg ili smanji na 25mg. Najveća preporučena doza je 100mg, maks. preporučena učestalost doziranja je jednom dnevno. Kada se lek uzme uz jelo može doći do odloženog početka dejstva u odnosu na lek uzet našte. Kod starijih od 65 godina nije potrebna modifikacija doze. Nije indikovana za primenu kod osoba mlađih od 18 godina. Pre početka terapije neophodno je uzeti anamnezu, odrediti potencijalne rizike i lekar treba da razmotri stanje kardiovaskularnog sistema osobe kao i eventualno oštećenje bubrežne i funkcije jetre). Treba upozoriti na mogućnost pojave vrtoglavice i poremećaja vida, i opasnosti upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Paralelni lekovi: Viagra®

SINPLATIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

cisplatin - L01XA01

ANTINEOPLASTICI

L01XA jedinjenja platine

(SZ)	0031223 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/10mL; bočica staklena, 1x10 mL 5944720220209	Cena: 484,40din 650/2009/12 23.02.2009
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	23.02.2014
(SZ)	0031224 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/50mL; bočica staklena, 1x50 mL 5944720220216	Cena: 1412,20din 649/2009/12 23.02.2009
	18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	23.02.2014

Doziranje: *metastatski karcinomi testisa i ovarijuma, tumor cerviksa, karcinom pluća i bešike:* monoterapija odrasli i deca 50-120mg/m² dnevno kao i.v. inj., na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m² i.v. dnevno, tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Kombinovana terapija: primenjuju se niže doze; prema protokolu. 8-12-sati pre primene, preporučuje se inf. 1-2 litra tečnosti da bi se izazvala diureza.

Paralelni lekovi: Cisplatin, Cisplatin PharmaSwiss, Cisplatin-Teva, Platidiam 10, Platidiam 50, Platinex®

SINTOPOZID® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija**etopozid** - L01CB01

ANTINEOPLASTICI

L01CB derivati podofilotoksina

(SZ) 0030122 koncentrat za rastvor za infuziju;

100mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL

5944720230086

3 godine, bez posebnih naznaka

Cena: 1209,30din

4237/2008/12 25.11.2008

25.11.2013

Doziranje: *karcinom testisa, mikrocelularni karcinom pluća, akutna nelimfocitna leukemija, Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom:* odrasli najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima; spora i.v. inf. 50-100mg/m² dnevno, u trajanju od 30-60 minuta, prvih 5 dana, ili 100mg/m² 1., 3. i 5. dana, uz pauzu od 3-4 nedelje između dva terapijska ciklusa. Rastvoriti sa 250mL 0,9% natrijum klorida ili rastvorom 0,5% glukoze. Kod bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega, potrebno je korigovati doze. Terapiju mora sprovoditi lekar specijalista.

Paralelni lekovi: Etoposid „Ebewe“, Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide-Teva, Lastet Cap. 100, Lastet Cap. 25, Lastet Cap. 50, Lastet inj., Vepesid

TAMOSIN® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska**tamsulosin** - G04CA02

UROLOŠKI LEKOWI

G04CA antagonisti alfa adrenoreceptora

(R) 1134238 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda;

0.4mg; blister, 2x15 kaps.

3850343045131

3 godine, na temperaturi do 30°C

Cena: 680,70din

655/2009/12 23.02.2009

23.02.2014

Doziranje: *simptomatsko lečenje benigne hiperplazije prostate (BHP):* obično 1 kaps. dnevno, progutati celu sa čašom vode, nezavisno od obroka. Bolesnike treba upozoriti o mogućoj pojavi pospanosti, poremećaja vida, vrtoglavice i sinkope za vreme primene leka. Kontraindikovano je kod ortostatske hipotenzije i teške insuficijencije jetre.

Paralelni lekovi: Betamsal, Flosin®, Tamsol®, Tamsudil®

TAMSUDIL® - SYNTHON HISPANIA, S.L. - Španija**tamsulosin** - G04CA02

UROLOŠKI LEKOWI

G04CA antagonisti alfa adrenoreceptora

(R) 1134239 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda;

0.4mg; blister, 3x10 kaps.

5690528166019

4 godine, bez posebnih naznaka

Cena: 680,70din

831/2009/12 20.03.2009

20.03.2014

Doziranje: *simptomatsko lečenje donjih delova urinarnog trakta kod benigne hiperplazije prostate (BHP):* 1 kaps. dnevno, sa ili bez hrane. Kaps. treba progutati celu, sa čašom vode, bez drobljenja ili žvakanja. Hrana ne utiče na brzinu i veličinu absorpcije. Kontraindikovano je kod ortostatske hipotenzije u anamnezi i teške insuficijencije jetre i bubrega.

Paralelni lekovi: Betamsal, Flosin®, Tamsosin®, Tamsol®

TENAXUM® - LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska**rilmenidin** - C02AC06

ANTIHIPERTENZIVI

C02AC agonisti imidazolinskih receptora

(R) 1103892 tableta; 1mg; blister, 2x15 tabl.

3594455500217

2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju

Cena: 788,50din

4487/2008/12 15.12.2008

15.12.2013

Doziranje: *arterijska hipertenzija:* 1 tabl. dnevno, ujutru. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajući posle jednogmesecnog tretmana, doza se može povećati na 2 tabl.e dnevno, u podeljenim dozama (1 tabl. ujutru, 1 uveče), pre obroka. Kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom nije potrebno podešavanje doze kada je klirens kreatinina veći od 15mL/min., može se upotrebljavati i kod starijih osoba i kod pacijenata sa šećernom bolesti i hipertenzijom. Ukoliko treba ukinuti terapiju sa dozom od 2mg dnevno, dozu treba smanjivati na 1mg dnevno u toku 3 dana, pa tek onda ukinuti.

TERTENSIF® SR - ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska**indapamid** - C03BA11**DIURETICI****C03BA sulfonamidski diuretici, monokomponentni**

(R) 1103041 tableta sa produženim oslobađanjem;

1.5mg; blister, 1x30 tabl.

Cena: 505,90din

5906740201514

1267/2008/12 01.04.2008

2 godine, bez posebnih naznaka

28.03.2013

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* oralno 1,5mg jednom dnevno, najbolje ujutru; progutati celu tabletu sa malo vode.**Paralelni lekovi:** Indapamid, Indapres®, Indapres® SR, Rawel® SR**THIOGAMMA® 600 ORAL - BANO GMBH & CO. KG - Austrija****tioktinska kiselina (alfa-lipoinna kiselina)** - A16AX01**OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI****DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA****A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma**

(BR) 1089120 film tableta; 600mg; blister, 3x10 tabl.

Cena: 1722,90din

4030674003362

4572/2008/12 24.12.2008

3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti

02.10.2011

(BR) 1089121 film tableta; 600mg; blister, 6x10 tabl.

Cena: 3161,40din

4030674003379

4573/2008/12 24.12.2008

3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti

02.10.2011

Doziranje: *čulni poremećaji kod dijabetičke polineuropatije:* 1 tbl., 30 min. pre obroka, sa dosta tečnosti.**Paralelni lekovi:** Berlithion® 300 oral, Berlithion® 300, Berlithion® 600**TIMOPRAM® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija****citalopram** - N06AB04**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R) 1072706 film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.

Cena: 666,40din

8606007082272

4226/2008/12 25.11.2008

2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju

25.11.2013

Doziranje: *depresija:* 20mg dnevno kao pojedinačna doza ujutro ili uveče; ako je potrebno, povećavati dozu do maks. 60mg dnevno; stariji bolesnici, maks. do 40mg dnevno. *Panični poremećaji:* početna doza 10mg dnevno, posle 7 dana povećati na 20mg dnevno, po potrebi povećati do maks. 60mg dnevno. Optimalna doza je 20-30mg dnevno; stariji bolesnici maks. 40mg dnevno. Ne preporučuje se primena leka kod dece.**Paralelni lekovi:** Citalex®, Citalopram Hexal®, Zyloram®**TRI-REGOL - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska****levonorgestrel, etinilestradiol** - G03AB03**POLNI HORMONI I MODULATORI****GENITALNOG SISTEMA****G03AB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati**

(R) 1135271 obložena tableta; blister, 1x21 tabl.; ružičaste 6 po (50mcg+30mcg)+bele 5 po

(75 mcg+40 mcg)+oker 10 po (125 mcg+30 mcg)

Cena: 253,80din

5997001314036

4227/2008/12 25.11.2008

5 godina, bez posebnih naznaka

25.11.2013

(R) 1135272 obložena tableta; blister, 3x21 tabl.; ružičaste 6 po (50mcg+30mcg)+bele 5 po

(75 mcg+40 mcg)+oker 10 po (125 mcg+30 mcg)

Cena: 761,50din

5997001314241

4228/2008/12 25.11.2008

5 godina, bez posebnih naznaka

25.11.2013

Doziranje: *oralna kontracepcija:* 1 tabl. dnevno, redosledom navedenim na pakovanju, otprilike u isto vreme od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze.

TRIAPIN® - CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska**felodipin, ramipril** - C09BB05

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09BB inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala

(R) 1403020 tableta sa produženim oslobađanjem; 5mg+5mg;

blister, 2x14 tabl.

5013841202361

30 meseci, na temperaturi do 30° C

Cena: 1166,90din

4486/2008/12 15.12.2008

15.12.2013

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* kod bolesnika kod kojih se krvni pritisak ne može adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila: 1 tabl. dnevno, nezavisno od hrane ili nakon laganog obroka sa niskim sadržajem masti ili ugljenih hidrata. Tabl. progutati celu, sa dovoljno tečnosti, ne sme se deliti, mrviti, niti žvakati. Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: Triapin® Mite**TRIAPIN® MITE - CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska****felodipin, ramipril** - C09BB05

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09BB inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala

(R) 1403021 tableta sa produženim oslobađanjem;

2.5mg+2.5mg; blister, 2x14 tabl.

5013841202378

2 godine, na temperaturi do 30° C

Cena: 592,20din

4488/2008/12 15.12.2008

15.12.2013

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* kod bolesnika kod kojih se krvni pritisak ne može adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila: 1 tabl. dnevno, nezavisno od hrane ili nakon laganog obroka sa niskim sadržajem masti ili ugljenih hidrata, maks. 2 tabl. dnevno. Tabl. progutati celu, sa dovoljno tečnosti, ne sme se deliti, mrviti, niti žvakati. Ne preporučuje se primena kod dece.

Paralelni lekovi: Triapin®**VENOSAN® - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina****heparin, esencijalni fosfolipidi, escin** - C05BA53

VAZOPROTEKTIVI

C05BA heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu

(BR) 4108173 gel; 100i.j./g+10mg/g+10mg/g; tuba, 1x40 g

3870010004612

2 godine, na temperaturi do 25° C

Cena: 197,20din

648/2009/12 23.02.2009

23.02.2014

Doziranje: *varices cruris i varikozni sindrom, promene na koži oko ulcus cruris-a, post-tromboflebitički sindrom, površinski tromboflebitis, edematozne povrede, promrzline, smetnje venskog protoka pri dugom stajanju, ubodi insekata:* gel se blago nanosi u tankom sloju 2-4 puta dnevno na bolna i otečena mesta. Lečenje ne bi trebalo da traje duže od 15 dana bez ponovnog lekarskog pregleda. Ne preporučuje se primena kod dece.

VINORELBIN „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**vinorelbin** - L01CA04

ANTINEOPLASTICI

L01CA alkaloidi vinke i analozi

(SZ) 0030242 koncentrat za rastvor za infuziju;

50mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL

9088882452743

3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti

Cena: 9228,60din

4230/2008/12 25.11.2008

25.11.2013

(SZ) 0030243 koncentrat za rastvor za infuziju;

10mg/mL; bočica staklena, 1x1 mL

9088882452729

3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti

Cena: 1919,40din

4229/2008/12 25.11.2008

25.11.2013

Doziranje: *metastatski karcinom dojke (stadijum IV), uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća (stadijum III ili IV) kao mono- ili kombinovana terapija: odrasli monoterapija* uobičajeno i.v. inj. od 25-30mg/m² telesne površine nedeljno; u kombinovanoj terapiji i.v. inj. od 25-30mg/m² telesne površine svake treće nedelje 1. i 5. dana ili svake treće nedelje 1. i 8. dana.

Može se primeniti u obliku spore bolus inj. (5-10 min.) nakon razblaživanja sa 20-50mL fiziološkog rastvora ili 5% rastvora glukoze ili u obliku kratkotrajne inf. (20-30min.) posle razblaživanja sa 125mL fiziološkog rastvora ili 5% rastvora glukoze. Maks. pojedinačna doza je oko 35mg/m² telesne površine. Nakon primene, potrebno je dati inf. fiziološkog rastvora radi ispiranja vene. Terapiju treba sprovoditi uz pažljivo praćenje hematoloških parametara.

Paralelni lekovi: Vinorelbin, Vinorelsin®

XARELTO® - BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka

rivaroksaban - B01AX06

**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)**

B01AX ostala antikoagulantna sredstva

(SZR)	1069600 film tableta; 10mg; blister, 1x10 tabl. 8606007910667	Cena: 5185,80din 261/2009/12 28.01.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka	28.01.2014
(SZR)	1069601 film tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl. 8606007910674	Cena: 15556,40din 260/2009/12 28.01.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka	28.01.2014

Doziranje: *prevencija venske tromboembolije* kod odraslih koji se podvrgavaju ugradnji veštačkog kuka ili kolena: 10mg jednom dnevno, uz obrok ili nezavisno od obroka, a početi 6-10 sati posle hirurške intervencije ako je uspostavljena hemostaza. Kod ugradnje kuka lečenje traje 5 nedelja, a kod ugradnje kolena 2 nedelje. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Kontraindikovano je kod oboljenja jetre koje je udruženo sa koagulopatijom i klinički značajnim rizikom od krvarenja, u trudnoći, za vreme laktacije i klinički značajnog aktivnog krvarenja.

ZALASTA® Q-TAB® - KRKA POLSKA SPOLKA Z.O.O. - Poljska

olanzapin - N05AH03

PSIHOLEPTICI

N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini

▲(R)	1070975 oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 4x7 tabl. 3838989563080	Cena: 6439,20din 708/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070976 oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 4x7 tabl. 3838989563097	Cena: - 706/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070977 oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 4x7 tabl. 3838989563110	Cena: - 707/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070978 oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 4x7 tabl. 3838989563134	Cena: - 705/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070979 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 4x7 tabl. 3838989563127	Cena: 3144,50din 704/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070980 oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 8x7 tabl. 3838989563141	Cena: - 701/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070981 oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 8x7 tabl. 3838989563158	Cena: - 699/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070982 oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 8x7 tabl. 3838989563165	Cena: - 700/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014
▲(R)	1070983 oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 8x7 tabl. 3838989563189	Cena: - 703/2009/12 23.02.2009
	2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage	23.02.2014

- | | | | |
|------|--|--------------|--------------------------|
| ▲(R) | 1070984 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 8x7 tabl.
3838989563172 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 702/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |

Doziranje: *shizofrenija*: preporučena početna doza za odrasle je 10mg dnevno; *manična epizoda*: početna doza u monoterapiji iznosi 15mg/dan, kod kombinovane terapije doza iznosi 10mg/dan; *prevencija recidiva manične faze bipolarnog poremećaja*: preporučena početna doza iznosi 10mg/dan, dnevna doza se može podešavati na osnovu individualnog kliničkog stanja u granicama od 5-20mg/dan.. Može se uzimati pre ili posle obroka, hrana ne utiče na resorpciju leka. Kod starijih bolesnika i bolesnika sa oštećenjem bubrega i/ili jetre, preporučuje se lečenje nižim dozama. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata, mlađih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Treana, Zalasta®

ZALASTA® Q-TAB® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

olanzapin - N05AH03

PSIHOLEPTICI

N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini

- | | | | |
|------|--|--------------|--------------------------|
| ▲(R) | 1070975 oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 4x7 tabl.
3838989548704 | Cena: | 6439,20din |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 667/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070976 oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 4x7 tabl.
3838989548728 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 665/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070977 oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 4x7 tabl.
3838989548773 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 666/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070978 oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 4x7 tabl.
3838989548681 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 664/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070979 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 4x7 tabl.
3838989548667 | Cena: | 3144,50din |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 663/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070980 oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 8x7 tabl.
3838989548711 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 660/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070981 oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 8x7 tabl.
3838989548735 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 658/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070982 oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 8x7 tabl.
3838989548780 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 659/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070983 oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 8x7 tabl.
3838989548698 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 662/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |
| ▲(R) | 1070984 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 8x7 tabl.
3838989548674 | Cena: | - |
| | 2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage | 661/2009/12 | 23.02.2009
23.02.2014 |

Doziranje: *shizofrenija*: preporučena početna doza za odrasle je 10mg dnevno; *manična epizoda*: početna doza u monoterapiji iznosi 15mg/dan, kod kombinovane terapije doza iznosi 10mg/dan; *prevencija recidiva manične faze bipolarnog poremećaja*: preporučena početna doza iznosi 10mg/dan, dnevna doza se može podešavati na osnovu individualnog kliničkog stanja u granicama od 5-20mg/dan.. Može se uzimati pre ili posle obroka, hrana ne utiče na resorpciju leka. Kod starijih bolesnika i bolesnika sa oštećenjem bubrega i/ili jetre, preporučuje se lečenje nižim dozama. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata, mlađih od 18 godina.

Paralelni lekovi: Treana, Zalasta®

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH BILJNIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA I PARALELAMA

GINKO SANDOZ® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

list ginka, suvi standardizovani ekstrakt - HN06DX..

NERVNI SISTEM

HN06DX ostali lekovi za terapiju demencije

(BR)	1073104 film tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl. 8606010891076	Cena:	-
		4218/2008/12	25.11.2008
(BR)	1073105 film tableta; 80mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891083	Cena:	-
		4216/2008/12	25.11.2008
(BR)	1073106 film tableta; 120mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891090	Cena:	-
		4217/2008/12	25.11.2008
(BR)	1073107 film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl. 8606010891069	Cena:	-
		4215/2008/12	25.11.2008

Doziranje: *sindrom demencije* (adjuvantna terapija): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina 120-240mg/dan, najmanje 12 nedelja; *okluzivno oboljenje perifernih arterija*: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina 120-160mg/dan, najkraće 6 nedelja; *vertigo i tinitus vaskularnog porekla*: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina 120-160mg/dan, najduže 6-8 nedelja. Tabl. progutati uz dovoljnu količinu tečnosti (vode), bez žvakanja, posle obroka. Pre prve upotrebe konsultovati lekara. Ukoliko se očekuje hirurška intervencija, 2 nedelje pre, prekinuti uzimanje leka. Zbog sadržaja glukoze u tabl., ne smeju lek koristiti bolesni od naslednog oboljenja netolerancije na glukozu.

IMMUNAL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

osušeni sok herbe purpurne ehinacee - HL03AW..

IMUNOSTIMULANSI

HL03AW biljni imunomodulatori

(BR)	1015111 tableta; 80mg; blister, 1x20 tabl. 8606010891472	Cena:	-
		1475/2008/12	24.04.2008
	18 meseci, na temperaturi do 30°C		24.04.2013

Doziranje: *kratkotrajna prevencija i tretman ranih simptoma prehlade* kod odraslih, starijih osoba i adolescenata starijih od 12 godina: 3-4 puta dnevno po 1 tabl. Kontraindikovana je primena kod dece mlađe od godinu dana, a kod dece između 1-12 godina se ne preporučuje. Lek ne treba koristiti duže od 10 dana, a posle prekida terapije se može koristiti ponovo tek posle 14 dana.

ANATOMSKO TERAPIJSKO HEMIJSKA KLASIFIKACIJA NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

A

**ALIMENTARNI TRAKT I
METABOLIZAM (LEKOVI KOJI
DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG
SISTEMA I METABOLIZMA)**

A02

**LEKOVI ZA POREMEĆAJE
ACIDITETA**

**A02B lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i
gastroezofagusnog refluksa**

A02BC inhibitori protonске pumpe

A02BC03 lansoprazol

oralno

PROTONEXA; MEDICO UNO D.O.O. - Srbija

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 1x7 kaps.

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 2x7 kaps.

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 15mg; blister, 4x7 kaps.

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x7 kaps.

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 2x7 kaps.

gastrorezistentna kapsula, tvrda; 30mg; blister, 4x7 kaps.

A03

**LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE
POREMEĆAJE**

A03A lekovi za funkcionalne poremećaje creva

**A03AA sintetski antiholinergici,
aminoalkoholni estri**

A03AA04 mebeverin

oralno

COLOSPA RETARD;

SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;

blister, 2x15 kaps.

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;

blister, 4x15 kaps.

COLOSPA RETARD;

SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;

blister, 2x15 kaps.

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;

blister, 4x15 kaps.

A06

LAKSATIVI

A06A laksativi

A06AD osmotski laksativi

A06AD11 laktuloza

oralno

DUPHALAC®; SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x500 mL

oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x200 mL

oralni rastvor; 667g/l; kesica, 10x15 mL

A07

**ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI**

A07E intestinalni antiinflamatorni lekovi

**A07EC aminosalicilna kiselina i slični
preparati**

A07EC02 mesalazin

rektalno

PENTASA®; FERRING - LEČIVA, A.S. - Češka

rektalna suspenzija; 1g/100mL; bočica, 7x100 mL

A16

**OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG
SISTEMA I METABOLIZMA**

**A16A ostali proizvodi koji deluju na bolest
digestivnog sistema i metabolizma**

**A16AX različiti proizvodi koji deluju na
bolesti digestivnog sistema i
metabolizma**

**A16AX01 tioktinska kiselina (alfa-lipoinna
kiselina)**

oralno

THIOGAMMA® 600 ORAL;

BANO GMBH & CO. KG - Austrija

film tableta; 600mg; blister, 3x10 tabl.

film tableta; 600mg; blister, 6x10 tabl.

B

**KRV I KRVOTVORNI ORGANI
(LEKOVİ ZA LEČENJE BOLESTI KRVİ
I KRVOTVORNIH ORGANI)**

B01

**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)**

- B01A antitrombotička sredstva
(antikoagulansi)**
- B01AC inhibitori agregacije trombocita,
isključujući heparin**

B01AC04 klopidogrel

oralno

KLOPIDOGREL; M.D. NINI D.O.O. - Srbija

film tableta; 75mg; blister, 1x14 tabl.

film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.

film tableta; 75mg; blister, 4x14 tabl.

film tableta; 75mg; blister, 6x14 tabl.

KLOPIDOGREL; SRBOLEK A.D. - Srbija

film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.

B01AE direktni inhibitori trombina

B01AE07 dabigatraneteksilat

oralno

**PRADAXA®; BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
GMBH & CO.KG - Nemačka**

kapsula, tvrda; 75mg; blister, 1x10 kaps.

kapsula, tvrda; 75mg; blister, 3x10 kaps.

kapsula, tvrda; 75mg; blister, 6x10 kaps.

kapsula, tvrda; 75mg; bočica plastična, 1x60 kaps.

kapsula, tvrda; 110mg; blister, 1x10 kaps.

kapsula, tvrda; 110mg; blister, 3x10 kaps.

kapsula, tvrda; 110mg; blister, 6x10 kaps.

kapsula, tvrda; 110mg; bočica plastična, 1x60 kaps.

B01AX ostala antikoagulantna sredstva

B01AX06 rivaroksaban

oralno

XARELTO®; BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka

film tableta; 10mg; blister, 1x10 tabl.

film tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl.

C

**KARDIOVASKULARNI SISTEM
(LEKOVİ KOJI DELUJU NA
KARDIOVASKULARNI SISTEM)**

C01

TERAPIJA BOLESTI SRCA

**C01C STIMULANSI SRČANOG RADA,
ISKLUČUJUĆI SRČANE GLIKOZIDE**

**C01CA adrenergički
i dopaminergički lekovi**

C01CA07 dobutamin

parenteralno

DOBUTAMIN ADMEDA 250;

WULFING PHARMA GMBH - Nemačka

koncentrat za rastvor za infuziju; 250mg/50mL; ampula, 1x50 mL

C01E ostali lekovi u terapiji bolesti srca

C01EB ostali lekovi u terapiji bolesti srca

C01EB15 trimetazidin

oralno

**PREDUCTAL MR; ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska**

tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 35mg;

blister, 2x30 tabl.

C02

ANTIHIPERTENZIVI

C02A antiadrenergički, centralnog delovanja

**C02AC agonisti imidazolinskih
receptora**

C02AC05 moksonidin

oralno

PHYSIOTENS®; SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

film tableta; 0.2mg; blister, 2x14 tabl.

film tableta; 0.4mg; blister, 2x14 tabl.

C02AC06 rilmenidin

oralno

**TENAXUM®; LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE - Francuska**

tableta; 1mg; blister, 2x15 tabl.

C03

DIURETICI

C03B slabi diuretici, isključujući tiazide

**C03BA sulfonamidski diuretici,
monokomponentni**

C03BA11 indapamid

oralno

**TERTENSIF® SR; ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska**

tableta sa produženim oslobađanjem; 1.5mg; blister, 1x30 tabl.

C05

VAZOPROTEKTIVI

C05B antivarikozna terapija**C05BA** heparin ili heparinoidi
za lokalnu primenu**C05BA53** heparin, dekspantenol
oralnoHEPAN*;
JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
gel; 500i.j./g+5mg/g; tuba, 1x50 g**C05BA53** heparin, esencijalni fosfolipidi,
escin
oralnoVENOSAN*;
BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
gel; 100i.j./g+10mg/g+10mg/g; tuba, 1x40 g

C07

BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH
RECEPTORA**C07A** blokatori beta adrenergičkih receptora**C07AB** blokatori beta adrenergičkih
receptora, selektivni**C07AB07** bisoprolol
oralnoBISOBEL*;
BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
tableta; 5mg; blister, 1x30 tabl.

C09

LEKOVİ KOJI DELUJU NA RENIN-
ANGIOTENZIN SISTEM**C09B** inhibitori ACE, kombinacije**C09BA** inhibitori ACE i diuretici**C09BA04** perindopril, indapamid
oralnoCO-PRENESSA*;
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x10 tabl.
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 1x30 tabl.
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 2x15 tabl.
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 9x10 tabl.
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 6x15 tabl.
tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x30 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 2x15 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 1x30 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x10 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 9x10 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 6x15 tabl.
tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x30 tabl.**C09BB** inhibitori ACE i blokatori
kalcijumskih kanala**C09BB05** felodipin, ramipril
oralnoTRIAPIN* MITE; CHINOIN PHARMACEUTICAL AND
CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska
tableta sa produženim oslobađanjem; 2.5mg+2.5mg;
blister, 2x14 tabl.
TRIAPIN* CHINOIN PHARMACEUTICAL AND
CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska
tableta sa produženim oslobađanjem; 5mg+5mg;
blister, 2x14 tabl.**C09C** antagonisti receptora angiotenzina II,
monokomponentni**C09CA** antagonisti receptora
angiotenzina II,
monokomponentni**C09CA04** irbesartan
oralnoIRDA*;
NOBELFARMA ILAC SANAYII
VE TICARET A.S. - Turska
film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.
film tableta; 150mg; blister, 2x14 tabl.
film tableta; 300mg; blister, 2x14 tabl.

C10

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)**C10A** lekovi koji smanjuju nivo holesterola
i triglicerida**C10AA** inhibitori HMG CoA reduktaze**C10AA03** pravastatin
oralnoPRALIP*;
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.
tableta; 20mg; blister, 9x10 tabl.
tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl.
tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl.
PRAVAPRES*;
SOPHARMA PLC - Bugarska
tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl.
tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.**C10AA05** atorvastatin
oralnoLIPIDRA*;
NOBELFARMA ILAC SANAYII
VE TICARET A.S. - Turska
film tableta; 10mg; blister, 2x15 tabl.
film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.
film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl.
film tableta; 80mg; blister, 5x6 tabl.

D KOŽA I POTKOŽNO TKIVO (LEKVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA)

D05 LEKVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)

- D05B** antipsorijatici za sistemsku primenu
D05BB retinoidi u terapiji psorijaze
D05BB02 acitretin
oralno

NEOTIGASON®; CENEXI SAS - Francuska

kapsula, tvrda; 25mg; blister, 10x10 kaps.

kapsula, tvrda; 25mg; blister, 3x10 kaps.

kapsula, tvrda; 10mg; blister, 10x10 kaps.

kapsula, tvrda; 10mg; blister, 3x10 kaps.

D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

- D06B** hemioterapeutici za lokalnu primenu
D06BX ostali hemioterapeutici
D06BX01 metronidazol
lokalno

ROZAMET®;

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
 krem; 1%; tuba, 1x25 g

D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI

- D07A** kortikosteroidi, monokomponentni
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja
(grupa III)
D07AC13 mometazon
lokalno

ELOCOM®; SCHERING PLOUGH SPA - Italija

rastvor za kožu; 0.1%; bočica, 1x20 mL

- D07B** kortikosteroidi,
kombinacije sa antisepticima
D07BC kortikosteroidi, jakog delovanja,
kombinacije sa antisepticima
D07BC01 betametazon, salicilna kiselina
lokalno

DIPROSALIC®; SCHERING PLOUGH - Francuska

rastvor za kožu; 0.5mg/g+20mg/g; bočica, 1x30 mL

G GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)

G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

- G03A** hormonski kontraceptivi
za sistemsku primenu
G03AA gestageni i estrogeni,
fiksne kombinacije
G03AA09 dezogestrel, etinilestradiol
oralno
G03AA10 gestoden, etinilestradiol
oralno

REGULON®; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

film tableta; 0.15mg+0.03mg; blister, 1x21 tabl.

film tableta; 0.15mg+0.03mg; blister, 3x21 tabl.

LINDYNETTE® 20; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
 obložena tableta; 75mcg+20mcg; blister, 1x21 tabl.
 obložena tableta; 75mcg+20mcg; blister, 3x21 tabl.

LINDYNETTE® 30; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
 obložena tableta; 75mcg+30mcg; blister, 1x21 tabl.
 obložena tableta; 75mcg+30mcg; blister, 3x21 tabl.

- G03AB** gestageni i estrogeni,
sekvencijalni preparati
G03AB03 levonorgestrel, etinilestradiol
oralno

TRI-REGOL; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

obložena tableta; blister, 1x21 tabl.; ružičaste 6 po
 (50mcg+30mcg)+bele 5 po (75 mcg+40 mcg)+oker 10 po
 (125 mcg+30 mcg)

obložena tableta; blister, 3x21 tabl.; ružičaste 6 po
 (50mcg+30mcg)+bele 5 po (75 mcg+40 mcg)+oker 10 po
 (125 mcg+30 mcg)

- G03AC** gestageni
G03AC03 levonorgestrel
oralno

ESCAPELLE®; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
 tableta; 1.5mg; blister, 1x1 tabl.

- G03D** gestageni
G03DB derivati pregnadiena
G03DB01 didrogesteron
oralno

DUPHASTON®;

SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

film tableta; 10mg; blister, 1x20 tabl.

G04 UROLOŠKI LEKOVİ

- G04B ostali urološki lekovi, uključujući spazmolitike**
G04BE lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije

G04BE03 sildenafil
oralno

SILDENA; HEMOFARM AD - Srbija
 film tableta; 25mg; blister, 1x1 tabl.
 film tableta; 50mg; blister, 1x1 tabl.
 film tableta; 100mg; blister, 1x1 tabl.

G04C lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate

G04CA antagonisti alfa adrenoreceptora
G04CA02 tamsulosin
oralno

TAMOSIN®; BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
 blister, 2x15 kaps.

TAMSUDIL®; SYNTHON HISPANIA, S.L. - Španija
 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
 blister, 3x10 kaps.

G04CB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze

G04CB02 dutasterid
oralno

AVODART®; CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska
 kapsula, meka; 0.5mg; blister, 3x10 kaps.

H HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE

H01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

- H01B hormoni zadnjeg reznja hipofize**
H01BA vazopresin i analozi
H01BA02 dezmopresin
oralno

MINIRIN MELT; FERRING AB - Švedska
 oralni liofilizat; 60mcg; blister, 3x10 kom
 oralni liofilizat; 120mcg; blister, 3x10 kom
 oralni liofilizat; 240mcg; blister, 3x10 kom
MINIRIN MELT; FERRING GMBH - Nemačka
 oralni liofilizat; 60mcg; blister, 3x10 kom
 oralni liofilizat; 120mcg; blister, 3x10 kom
 oralni liofilizat; 240mcg; blister, 3x10 kom

H05 HOMEOSTAZA KALCIJUMA

- H05B antiparatiroidni hormoni**
H05BX drugi anti-paratiroidni agensi
H05BX01 sinakalcet
oralno

MIMPARA®; AMGEN EUROPE B.V. - Holandija
 film tableta; 30mg; blister, 1x14 tabl.
 film tableta; 30mg; blister, 2x14 tabl.
 film tableta; 30mg; blister, 6x14 tabl.
 film tableta; 60mg; blister, 1x14 tabl.
 film tableta; 60mg; blister, 2x14 tabl.
 film tableta; 60mg; blister, 6x14 tabl.
 film tableta; 90mg; blister, 1x14 tabl.
 film tableta; 90mg; blister, 2x14 tabl.
 film tableta; 90mg; blister, 6x14 tabl.

J ANTIINFektivNI LEKOVİ ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01F makrolidi, linkozamidi i streptogramini

J01FA makrolidi

J01FA09 klaritromicin
oralno

KLACID® MR; NI MEDIC D.O.O. - Srbija
 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem;
 500mg; blister, 1x7 tabl.

parenteralno

KLACID® IV; NI MEDIC D.O.O. - Srbija
 prašak za rastvor za infuziju; 500mg;
 bočica staklena, 1x500 mg

J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

- J02A antimikotici za sistemsku primenu**
J02AC derivati triazola
J02AC02 itrakonazol
oralno

OMICRAL; MEDICO UNO D.O.O. - Srbija
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kaps.
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kaps.
 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 4x7 kaps.

J05

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA
SISTEMSKU PRIMENU

J05A lekovi sa direktnim delovanjem
na viruse

J05AX ostali antivirusni lekovi

J05AX08 raltegravir
oralno

ISENTRESS®;
MERCCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
film tableta; 400mg; bočica, 1x60 tabl.

J07

VAKCINE

J07C bakterijske i virusne vakcine,
kombinacija

J07CA bakterijske i virusne vakcine,
kombinacija

J07CA06 vakcina protiv difterije,
tetanusa, pertusisa (acelularna),
poliomijelitisa (inaktivisana) i
Haemophilus influenzae tip b
(konjugovana, adsorbovana),
kombinovana
parenteralno

INFANRIX® -IPV+HIB;
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju; (30i.j.+25mcg
+40D.j.+8D.j.+32D.j.+25mcg+8mcg+40i.j.+10mcg
PRP/0.5mLi 20-40mcg T)/0.5mL; napunjen injekcioni špric i
bočica, 1x0.5 mL

J07B virusne vakcine

J07BH vakcine protiv dijareje izazvane
rota virusom

J07BH01 živa vakcina protiv gastroenteritisa
izazvanog rotavirusom
oralno

ROTARIX®;
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
prašak i rastvarač za oralnu suspenziju; 10⁶ CCID50/mL; bočica
i rastvarač u oralnom aplikatoru, 1x1 mL

L

ANTINEOPLASTICI I
IMUNOMODULATORI

L01

ANTINEOPLASTICI

L01B antimetaboliti

L01BB analozi purina

L01BB05 fludarabin
parenteralno

FLUDARABINE-TEVA;
PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 25mg/mL;
bočica staklena, 1x2 mL

L01C biljni alkaloidi i drugi prirodni
proizvodi

L01CA alkaloidi vinke i analozi

L01CA04 vinorelbin
parenteralno

VINORELBIN "EBEWE"; EBEWE PHARMA
GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
koncentrat za rastvor za infuziju;
50mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL
koncentrat za rastvor za infuziju;
10mg/mL; bočica staklena, 1x1 mL

L01CB derivati podofilotoksina

L01CB01 etopozid
parenteralno

SINTOPOZID - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. -
RUMUNJA

koncentrat za rastvor za infuziju;
100mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL

L01X ostali antineoplastici

L01XA jedinjenja platine

L01XA01 cisplatin
parenteralno

SINPLATIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/10mL;
bočica staklena, 1x10 mL
koncentrat za rastvor za infuziju;
50mg/50mL; bočica staklena, 1x50 mL

M MIŠIČNO-KOSTNI SISTEM (LEKIVI ZA BOLESTI MIŠIČNO- KOSTNOG SISTEMA)

M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIUREUMATSKI PROIZVODI

**M01A nesteroidni antiinflamatorni
i antiureumatski proizvodi**

**M01AB derivati sirćetne kiseline
i srodne supstance**

M01AB05 diklofenak

oralno

ACTAFENAK®; ACTAVIS HF. - Island

film tableta; 25mg; blister, 1x10 tabl.

film tableta; 50mg; blister, 1x10 tabl.

M01AC oksikami

M01AC06 meloksikam

oralno

MELOXEP;

EXTRACTUMPHARMA CO. LTD. - Mađarska

tableta; 15mg; blister, 2x10 tabl.

tableta; 15mg; blister, 3x10 tabl.

M03 MIŠIČNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

**M03A miorelaksansi sa perifernim
delovanjem**

**M03AC ostala kvaternerna amonijum
jedinjenja**

M03AC01 pankuronijum-bromid

parenteralno

PAVULON®; ORGANON S.A. - Francuska

rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 50x2 mL

M05 LEKIVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU

**M05B lekovi koji deluju na strukturu kosti
i mineralizaciju**

M05BA bifosfonati

M05BA04 alendronska kiselina

oralno

BONAP; HEMOFARM AD - Srbija

tableta; 70mg; blister, 1x4 tabl.

FOROSA®;

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

film tableta; 70mg; blister, 1x2 tabl.

film tableta; 70mg; blister, 1x4 tabl.

film tableta; 70mg; blister, 2x4 tabl.

N NERVENI SISTEM (LEKIVI KOJI DELUJU NA NERVENI SISTEM)

N02 ANALGETICI

N02A opiodi

N02AB derivati fenilpiperidina

N02AB03 fentanil

lokalno

FENTANYL SANDOZ® MAT; HEXAL AG - Nemačka

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1 kom

FENTANYL SANDOZ® TTS; HEXAL AG - Nemačka

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1 kom

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 20x1 kom

N02B ostali analgetici i antipiretici

N02BE anilidi

N02BE01 paracetamol

oralno

PANADOL® BABY;

GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska

oralna suspenzija; 120mg/5mL; bočica staklena, 1x100 mL

PARACETAMOL SOPHARMA;

SOPHARMA PLC - Bugarska

sirup; 120mg/5mL; bočica staklena, 1x125 mL, parenteralno

parenteralno

PERFALGAN®; BIEFFE MEDITAL SPA - Italija

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL

PERFALGAN®;

BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL

PERFALGAN®;

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - Italija

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL

PERFALGAN®;

RENAUDIN LABORATORIES - Francuska

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x100 mL

rastvor za infuziju; 10mg/mL; boca staklena, 12x50 mL

N03**ANTIEPILEPTICI****N03A antiepileptici****N03AX ostali antiepileptici****N03AX12 gabapentin****oralno****GORDIUS®; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska**

kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kaps.

kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kaps.

N05**PSIHOLEPTICI****N05A antipsihotici****N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini****N05AH03 olanzapin****oralno****ZALASTA® Q-TAB®;****KRKA POLSKA SPOLKA Z.O.O. - Poljska**

oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 8x7 tabl.

ZALASTA® Q-TAB®;**KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija**

oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 7.5mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 8x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 4x7 tabl.

oralna disperzibilna tableta; 20mg; blister, 8x7 tabl.

N06**PSIHOANALEPTICI****N06A antidepresivi****N06AA neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina****N06AA09 amitriptilin****oralno****AMITRIPTYLINE; REMEDICA LTD - Kipar**

film tableta; 10mg; blister, 10x10 tabl.

film tableta; 25mg; blister, 3x10 tabl.

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**N06AB04 citalopram****oralno****TIMOPRAM®; PHARMASWISS D.O.O. - Srbija**

film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.

N06AB05 paroksetin**oralno****REXETIN®; GEDEON RICHTER PLC - Mađarska**

film tableta; 20mg; blister, 3x10 tabl.

N06AB06 sertralini**oralno****LUXETA®; PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska**

film tableta; 50mg; blister, 2x14 tabl.

N06AB08 fluvoksamin**oralno****FEVARIN®; SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija**

film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl.

film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl.

FEVARIN®; SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl.

film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl.

N07**OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM****N07B lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti****N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti****N07BB01 disulfiram****oralno****ESPERAL®; CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD. - Mađarska**

tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20 tabl.

N07BB03 akamprosat**oralno****CAMPRAL®; MERCK SANTE S.A.S. - Francuska**

gastrorezistentna tableta; 333mg; blister, 7x12 tabl.

R RESPIRATORNI SISTEM (LEKOVİ ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA)

R01 NAZALNI PREPARATI

**R01A dekongestivi i ostali nazalni preparati
za lokalnu primenu**

**R01AB adrenomimetici, kombinacije
bez kortikosteroida**

R01AB06 ksilometazolin, deksipantenol
nazalno

NASIC ZA DECU;
KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka
sprej za nos, rastvor; 0.05%+5%; bočica sa pumpom za
doziranje, 1x10 mL

NASIC; KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka
sprej za nos, rastvor; 0.1%+5%; bočica sa pumpom za
doziranje, 1x10 mL

R01AD kortikosteroidi

R01AD12 flutikazonfuroat
nazalno

AVAMYS®; GLAXO OPERATIONS UK LIMITED -
Velika Britanija
sprej za nos, suspenzija; 27.5mcg/doza; bočica sa pumpom za
doziranje, 1x120 doza

**R01B nazalni dekongestivi za sistemsku
primenu**

R01BA adrenomimetici

R01BA53 paracetamol, kofein, fenilefrin
oralno

COLDREX® CAPLETS; GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE GMBH & CO., KG - Nemačka
film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

COLDREX® CAPLETS; GLAXOSMITHKLINE
DUNGARVAN LTD - Irska
film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

R03 LEKOVİ KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

R03A adrenergici, inhalacioni

**R03AC selektivni agonisti beta 2
adrenergičkih receptora**

R03AC13 formoterol
inhalaciono

OXIS® TURBUHALER®;
ASTRAZENECA AB - Švedska
prašak za inhalaciju; 4.5mcg/doza; kontejner višedozni, 1x60 doza
prašak za inhalaciju; 9mcg/doza; kontejner višedozni, 1x60 doza

V03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI

V03A svi ostali terapijski proizvodi

**V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji
antineoplasticima**

V03AF03 kalcijum-folinat
parenteralno

LEUCOVORIN-TEVA;
PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL

V08 KONTRASTNA SREDSTVA

**V08C kontrastna sredstva
za magnetnu rezonancu**

**V08CA paramagnetna
kontrastna sredstva**

V08CA03 gadodiamid
parenteralno

OMNISCAN™; GE HEALTHCARE IRELAND - Irska
rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x10 mL
rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x15 mL
rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x20 mL

V08CA10 gadoksetinska kiselina
parenteralno

PRIMOVISt®;
BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni
špric, 1x10 mL
rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni
špric, 5x10 mL

ANATOMSKO TERAPIJSKO HEMIJSKA KLASIFIKACIJA NOVOREGISTROVANIH BILJNIH LEKOVA



**ANTINEOPLASTICI I
IMUNOMODULATORI**

HL03

IMUNOSTIMULANSI

HL03A CITOKINI I IMUNOMODULATORI

HL03AW biljni imunomodulatori

**HL03AW.. osušeni sok herbe purpurne
ehinacee**

oralno

IMMUNAL®;
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
tableta; 80mg; blister, 1x20 tabl.



NERVNI SISTEM

HN06

NERVNI SISTEM

HN06D PSIHOEPILEPTICI

**HN06D lekovi demencije za terapiju
demencije**

HN06DX ostali lekovi za terapiju demencije

oralno

**HN06DX.. list ginka, suvi standardizovani
ekstrakt**

GINKO SANDOZ® -
LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
film tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl.
tableta; 80mg; blister, 3x10 tabl.
film tableta; 120mg; blister, 3x10 tabl.
film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl.

ABECEDNI SPISAK NOVIH INTERNACIONALNIH NEZAŠTIĆENIH NAZIVA SUPSTANCI SA PRIPADAJUĆIM LEKOVIMA

akamprosot,

oralno,

CAMPRAL® MERCK SANTE S.A.S. - Francuska
gastrorezistentna tableta; 333mg; blister, 7x12 tab.

amitriptilin,

oralno,

AMITRIPTYLINE REMEDICA LTD - Kipar
film tableta; 10mg; blister, 10x10 tab.
film tableta; 25mg; blister, 3x10 tab.

dabigatraneteksilat,

oralno,

PRADAXA® BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
kapsula, tvrda; 75mg; blister, 1x10 kaps.
kapsula, tvrda; 75mg; blister, 3x10 kaps.
kapsula, tvrda; 75mg; blister, 6x10 kaps.
kapsula, tvrda; 75mg; bočica plastična, 1x60 kaps.
kapsula, tvrda; 110mg; blister, 1x10 kaps.
kapsula, tvrda; 110mg; blister, 3x10 kaps.
kapsula, tvrda; 110mg; blister, 6x10 kaps.
kapsula, tvrda; 110mg; bočica plastična, 1x60 kaps.

dutasterid,

oralno,

AVODART® CTALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska
kapsula, meka; 0.5mg; blister, 3x10 kaps.

felodipin, ramipril

oralno

TRIAPIN® CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska
tableta sa produženim oslobađanjem; 5mg+5mg; blister, 2x14 tabl.

TRIAPIN® MITE CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska
tableta sa produženim oslobađanjem; 2.5mg+2.5mg; blister, 2x14 tabl.

flutikazonfuroat

nazalno

AVAMYS® GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija
sprej za nos, suspenzija; 27.5mcg/doza; bočica sa pumpom za doziranje, 1x120 doza

fluvoksamin

oralno

FEVARIN® SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl.
film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl.

FEVARIN® SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

film tableta; 100mg; blister, 1x15 tabl.
film tableta; 100mg; blister, 2x15 tabl.

gadoksetinska kiselina

parenteralno

PRIMOVIST® BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni špric, 1x10 mL
rastvor za injekciju; 181.43mg/mL; napunjen injekcioni špric, 5x10 mL

heparin, deksantenol

lokalno

HEPAN® JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
gel; 500i.j./g+5mg/g; tuba, 1x50 g

heparin, esencijalni fosfolipidi, escin

lokalno

VENOSAN® BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
gel; 100i.j./g+10mg/g+10mg/g; tuba, 1x40 g

irbesartan

oralno

IRDA® NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
film tableta; 75mg; blister, 2x14 tabl.
film tableta; 150mg; blister, 2x14 tabl.
film tableta; 300mg; blister, 2x14 tabl.

ksilometazolin, dekspantenol

nazalno

NASIC KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka
sprej za nos, rastvor; 0.1%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 mL

NASIC ZA DECU KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

sprej za nos, rastvor; 0.05%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 mL

omalizumab**parenteralno****XOLAIR® NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150mg/1.2mL; bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1.2 mL

paracetamol, kofein, fenilefrin**oralno****COLDREX® CAPLETS GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO., KG - Nemačka**

film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

COLDREX® CAPLETS GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska

film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

raltegravir**oralno****ISENTRESS® MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija**

film tableta; 400mg; bočica, 1x60 tabl.

rilmidenin**oralno****TENAXUM® LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska**

tableta; 1mg; blister, 2x15 tabl.

rivaroksaban**oralno,****XARELTO® BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka**

film tableta; 10mg; blister, 1x10 tabl.

film tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl.

sinakalcet**oralno****MIMPARA® AMGEN EUROPE B.V. - Holandija**

film tableta; 30mg; blister, 1x14 tabl.

film tableta; 30mg; blister, 2x14 tabl.

film tableta; 30mg; blister, 6x14 tabl.

film tableta; 60mg; blister, 1x14 tabl.

film tableta; 60mg; blister, 2x14 tabl.

film tableta; 60mg; blister, 6x14 tabl.

film tableta; 90mg; blister, 1x14 tabl.

film tableta; 90mg; blister, 2x14 tabl.

film tableta; 90mg; blister, 6x14 tabl.

telbivudin**oralno****SEBIVO® NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**

film tableta; 600mg; blister, 2x14 tabl.

ABECEDNI SPISAK NOVIH NEZAŠTIĆENIH BILJNIH NAZIVA FARMACEVTSKIH SUPSTANCI SA PRIPADAJUĆIM LEKOVIMA

list ginka, suvi standardizovani ekstrakt

oralno

**GINKO SANDOZ® LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA
D.D. - Slovenija**

film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl.

film tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl.

film tableta; 80mg; blister, 3x10 tabl.

film tableta; 120mg; blister, 3x10 tabl.

osušeni sok herbe purpurne ehinacee

oralno

**IMMUNAL® LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
- Slovenija**

tableta; 80mg; blister, 1x20 tabl.

TRADICIONALNI LEKOWI

CEFAKLIMAN - CEFAK KG - Nemačka

rizom cimicifuge, suvi standardizovani ekstrakt -

(BR) kapsula, tvrda; 2.675mg; blister, 5x10 kaps.
4260031680305

Cena: -
730/2009/12 25.02.2009

REGISTROVANI HOMEOPATSKI LEKOWI

KINDINORM - Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG. - Nemačka

Calcium hypophosphorosum dil. D4, Chamomilla dil. D12, Cuprum metallicum dil. D10, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12, Valeriana dil. D6

(BR) granule; (0.0167g+0.0167g+0.0167g+0.0167g+0.0167g)/10g;
bočica staklena, 1x20 g
4029917002125

Cena: -
2134/2008/12 20.06.2008

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA KOJI SE MOGU IZDAVATI BEZ LEKARSKOG RECEPTA (BR)

CEFAKLIMAN CEFAC KG - Nemačka

kapsula, tvrda; 2.675mg; blister, 5x10 kaps.

COLDREX® CAPLETS GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO., KG - Nemačka

film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

COLDREX® CAPLETS GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska

film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8 tabl.

DUPHALAC® SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x500 ml

oralni rastvor; 667g/l; boca plastična, 1x200 ml

oralni rastvor; 667g/l; kesica, 10x15 ml

ESCAPELLE® GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

tableta; 1.5mg; blister, 1x1 kom

GINKO SANDOZ® LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

film tableta; 40mg; blister, 3x10 tabl.

film tableta; 40mg; blister, 9x10 tabl.

film tableta; 80mg; blister, 3x10 tabl.

film tableta; 120mg; blister, 3x10 tabl.

HEPAN® JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

gel; 500i.j./g+5mg/g; tuba, 1x50 g

IMMUNAL® LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

tableta; 80mg; blister, 1x20 tabl.

KINDINORM Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG. - Nemačka

granule; (0.0167g+0.0167g+0.0167g+0.0167g+0.0167g)/10g; bočica staklena, 1x20 g

NASIC KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

sprej za nos, rastvor; 0.1%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 ml

NASIC ZA DECU KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

sprej za nos, rastvor; 0.05%+5%; bočica sa pumpom za doziranje, 1x10 ml

PANADOL® BABY GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska

oralna suspenzija; 120mg/5ml; bočica staklena, 1x100 ml

PARACETAMOL SOPHARMA SOPHARMA PLC - Bugarska

sirup; 120mg/5ml; bočica staklena, 1x125 ml

VENOSAN® BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

gel; 100i.j./g+10mg/g+10mg/g; tuba, 1x40 g

ABECEDNI SPISAK REGISTROVANIH LEKOVA SVRSTANIH U GRUPU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ČIJI SE PROMET KONTROLIŠE I KOJI IMAJU JAK UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI (§▲)

§▲ FENTANYL SANDOZ® MAT (fentani); HEXAL AG - Nemačka

§▲ FENTANYL SANDOZ® TTS (fentani); HEXAL AG - Nemačka

LEKOVI KOJI IMAJU JAK UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI, ZA VREME TERAPIJE NIJE DOZVOLJENO UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM, NITI RAD SA MAŠINOM (▲)

▲ REXETIN® (paroksetin); GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

LEKOVI KOJI MOGU UTICATI NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI (△)

△ GORDIUS® (gabapentin); GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

△ PHYSIOTENS® (moksonidin); SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZVRŠENA OBNOVA REGISTRACIJE SA PRIPADAJUĆIM EAN KÔDOM

5-ASA® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

mesalazin

- (R) supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom
8605000800029 1405/2009/12 14.04.2009

5-FLUOROURACIL „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija

fluorouracil

- (SZ) koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5 mL
9088881320685 4321/2008/12 05.12.2008

ALDIPETE-T® - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - Srbija

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana

- (Z) suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje)+4i.j. (najmanje))/0.5mL;
bočica, 1x5 mL
8605001700861 825/2009/12 18.03.2009
- (Z) suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje)+4i.j. (najmanje))/0.5mL;
bočica, 10x5 mL
8605001700458 826/2009/12 18.03.2009

AMINOSOL 10% E - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora

alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin, fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid

- (SZ) rastvor za infuziju; 15g/l+15g/l+14g/l+12g/l+9.18g/l+9.28g/l+7.4g/l+6.6g/l+
6.2g/l+5.1g/l+5g/l+4.4g/l+4.3g/l+3g/l+2g/l+0.842g/l+1.016g/l+0.734g/l;
boca staklena, 1x500 mL
8600097200363 298/2009/12 06.02.2009

ANDOL® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska

acetilsalicilna kiselina

- (BR) tableta; 300mg; blister, 2x10 tabl.
3850114217897 1134/2009/12 01.04.2009

ANDOL® 100 - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska

acetilsalicilna kiselina

- (BR) tableta; 100mg; blister, 2x10 tabl.
3850114217903 1133/2009/12 01.04.2009

ARTANE - HEMOFARM AD - Srbija

trihexsifenidil

- (R) tableta; 5mg; kontejner za tablete, 1x100 tabl.
8600097011129 195/2009/12 27.01.2009
- (R) tableta; 2mg; kontejner za tablete, 1x100 tabl.
8600097011112 194/2009/12 27.01.2009

AUGMENTIN® - SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS - Velika Britanija

amoksicilin, klavulanska kiselina

- (R) film tableta; 875mg+125mg; blister, 2x7 tabl.
8606103683458 155/2009/12 23.01.2009

**BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,
VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - Srbija**
vakcina protiv tuberkuloze

(Z)	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1 mg/mL; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 5x1 mL 8605001700281	800/2009/12	09.03.2009
-----	---	-------------	------------

CIFRAN® - RANBAXY IRELAND LTD. - Irska
ciprofloksacin

(R)	film tableta; 250mg; blister, 1x10 tabl. 8901296015834	198/2009/12	27.01.2009
(R)	film tableta; 500mg; blister, 1x10 tabl. 8901296015858	199/2009/12	27.01.2009

CILAZAPRIL - HABIT PHARM A.D. - Srbija
cilazapril

(R)	film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 tabl. 8600102463233	59/2009/12	19.01.2009
-----	---	------------	------------

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 10x0.6 mL 5013011005648	503/2009/12	17.02.2009
-------	--	-------------	------------

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 2x1 mL 3587080001266	691/2009/12	17.02.2009
-------	---	-------------	------------

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 2x0.8 mL 3582910021636	509/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 2x1 mL 3582910014010	505/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 2x0.6 mL 3587080001273	690/2009/12	17.02.2009
-------	---	-------------	------------

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 10x0.8 mL 5013011005655	504/2009/12	17.02.2009
-------	--	-------------	------------

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
enoksaparin-natrijum

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL; napunjen injekcioni špic sa iglom, 10x0.6 mL 5000283653134	694/2009/12	17.02.2009
-------	--	-------------	------------

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.4 mL 5000283653127	693/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.2 mL 5000283653110	695/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**enoksaparin-natrijum**

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x1 mL 5013011005661	500/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.2 mL 3587080002164	501/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**enoksaparin-natrijum**

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.8 mL 3587080001280	689/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.2 mL 3587080000207	688/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**enoksaparin-natrijum**

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.4 mL 3587080002171	502/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.2 mL 3582910021599	506/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**enoksaparin-natrijum**

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.4 mL 3587080000214	692/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.8 mL 5000283653141	696/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x1 mL 5000283653158	697/2009/12	17.02.2009

CLEXANE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**enoksaparin-natrijum**

(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.4 mL 3582910021605	507/2009/12	17.02.2009
(SZR)	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.6 mL 3582910021612	508/2009/12	17.02.2009

CO-DIOVAN® - NOVARTIS FARMA S.P.A. - Italija**valsartan, hidrohloriazid**

(R)	film tableta; 80mg+12.5mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543721	230/2009/12	16.01.2009
(R)	film tableta; 160mg+12.5mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543738	232/2009/12	16.01.2009
(R)	film tableta; 160mg+25mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543745	231/2009/12	16.01.2009

CO-DIOVAN® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**valsartan, hidrohloriazid**

(R)	film tableta; 160mg+12.5mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543769	21/2009/12	16.01.2009
(R)	film tableta; 160mg+25mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543776	22/2009/12	16.01.2009
(R)	film tableta; 80mg+12.5mg; blister, 2x14 tabl. 8606103543752	20/2009/12	16.01.2009

COMBIVIR® - GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija**zidovudin, lamivudin**

(SZR)	film tableta; 300mg+150mg; blister, 6x10 tabl. 8606103683595	303/2009/12	06.02.2009
-------	---	-------------	------------

COMBIVIR® - GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska**zidovudin, lamivudin**

(SZR)	film tableta; 300mg+150mg; blister, 6x10 tabl. 8606103683588	698/2009/12	06.02.2009
-------	---	-------------	------------

DIANEAL® PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska**glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid**

(SZ)	rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86% m/v (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l; plastična kesha, 1x5000 mL 5413760016092	158/2009/12	22.01.2009
------	---	-------------	------------

DILTIAZEM - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**diltiazem**

(R)	tableta sa produženim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 tabl. 8605000800272	56/2009/12	19.01.2009
-----	--	------------	------------

DITEVAKSAL-T® - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - Srbija**vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana**

(Z)	suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje))+40i.j. (najmanje))/0.5mL; bočica, 10x5 mL 8605001700410	820/2009/12	18.03.2009
-----	---	-------------	------------

DITEVAKSAL-T® ZA ODRASLE - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU,**VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - Srbija****vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana**

(Z)	suspenzija za injekciju; (30i.j. (najviše))+40i.j. (najmanje))/0.5mL; bočica, 10x5 mL 8605001700359	821/2009/12	18.03.2009
-----	--	-------------	------------

DOXORUBICIN „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**doksorubicin**

(SZ)	koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL 9088881300519	69/2009/12	19.01.2009
(SZ)	koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/25mL; bočica staklena, 1x25 mL 9088881300526	68/2009/12	19.01.2009

ECOBEC® - IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka**beklometazon**

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
8594737199219 | 4219/2008/12 | 25.11.2008 |
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
8594737199417 | 4220/2008/12 | 25.11.2008 |

ECOBEC® - NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND - Irska**beklometazon**

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
5023497032625 | 4212/2008/12 | 25.11.2008 |
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
5023497031611 | 4211/2008/12 | 25.11.2008 |

ECOBEC® EASI-BREATHE - IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka**beklometazon**

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
8594737174919 | 4221/2008/12 | 25.11.2008 |
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
8594737199615 | 4213/2008/12 | 25.11.2008 |

ECOBEC® EASI-BREATHE - NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND - Irska**beklometazon**

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
5023497032649 | 4214/2008/12 | 25.11.2008 |
| (R) | rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200 doza
5023497031635 | 4222/2008/12 | 25.11.2008 |

ESPERAL® - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija**disulfiram**

- | | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| (R) | tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20 tabl.
3582910015376 | 4324/2008/12 | 05.12.2008 |
|-----|---|--------------|------------|

ETOPOSID „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**etopozid**

- | | | | |
|------|--|--------------|------------|
| (SZ) | koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL
9088881303596 | 4325/2008/12 | 05.12.2008 |
|------|--|--------------|------------|

FLUOROGAL® - GALENIKA AD - Srbija**natrijum-fluorid**

- | | | | |
|------|--|-------------|------------|
| (BR) | tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 tabl.
8608808103675 | 295/2009/12 | 06.02.2009 |
| (BR) | tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 tabl.
8608808103682 | 296/2009/12 | 06.02.2009 |

FLUXILAN® - AEGIS LTD - Kipar**fluoksetin**

- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|
| (R) | kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kaps.
5291171000530 | 714/2009/12 | 24.02.2009 |
| (R) | kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kaps.
5291171001117 | 715/2009/12 | 24.02.2009 |

FORTTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska**makrogol, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat**

- | | | | |
|-----|---|------------|------------|
| (R) | prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74 g
3582182886223 | 72/2009/12 | 19.01.2009 |
|-----|---|------------|------------|

GLUCOSE 5% FRESENIUS - FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. - Italija**glukoza**

- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|
| (Z) | rastvor za infuziju; 5%; boca staklena, 49x100 mL
8606010925511 | 819/2009/12 | 18.03.2009 |
| (Z) | rastvor za infuziju; 5%; boca staklena, 20x500 mL
8606010925528 | 818/2009/12 | 18.03.2009 |

HAEMACCEL® - THERASELECT GMBH - Nemačka**poligelin**

- | | | | |
|------|---|-------------|------------|
| (SZ) | rastvor za infuziju; 3.5%; boca plastična, 14x500 mL
8606103100252 | 510/2009/12 | 17.02.2009 |
|------|---|-------------|------------|

HALOPERIDOL - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**haloperidol**

- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|
| (R) | tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl.
8600064117663 | 305/2009/12 | 06.02.2009 |
| (R) | tableta; 2mg; blister, 5x5 tabl.
8600064117649 | 304/2009/12 | 06.02.2009 |

HEMODROPS - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora**hipromeloza**

- | | | | |
|------|---|--------------|------------|
| (BR) | kapi za oči, rastvor; 0.5%; bočica staklena, 1x10 mL
8600097200196 | 4382/2008/12 | 08.12.2008 |
|------|---|--------------|------------|

HEXORAL® - HEMOFARM AD - Srbija**heksetidin**

- | | | | |
|------|--|-------------|------------|
| (BR) | rastvor za usnu sluznicu; 1mg/mL; boca staklena, 1x200 mL
8600097010245 | 196/2009/12 | 27.01.2009 |
|------|--|-------------|------------|

HLORAMFENIKOL ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija**hloramfenikol**

- | | | | |
|-----|---|------------|------------|
| (R) | mast za oči; 1%; tuba, 1x5 g
5310001204075 | 23/2009/12 | 16.01.2009 |
|-----|---|------------|------------|

INFLUREX® - IVANČIĆ I SINOVI D.O.O. - Srbija**fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina**

- | | | | |
|------|---|-------------|------------|
| (BR) | prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg; kesica, 5x1 kom
8600101515032 | 306/2009/12 | 06.02.2009 |
|------|---|-------------|------------|

KANSEN® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**klotrimazol**

- | | | | |
|-----|---|------------|------------|
| (R) | vaginalna tableta; 200mg; blister, 1x3 kom
8600064111470 | 64/2009/12 | 19.01.2009 |
|-----|---|------------|------------|

(R)	vaginalni krem; 2%; tuba, 1x20 kom 8600064111456	200/2009/12	27.01.2009
(BR)	krem; 1%; tuba, 1x20 g 8600064111463	65/2009/12	19.01.2009

LEUCOVORIN KALCIJUM - PFIZER (PERTH) PTY. LIMITED - Australija**kalcijum-folinat**

(SZ)	rastvor za injekciju; 50mg/5mL; ampula, 10x5 mL 4034541008191	7/2009/12	13.01.2009
------	--	-----------	------------

LIPANOR® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska**ciprofibrat**

(R)	kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x10 kaps. 3582910014577	716/2009/12	24.02.2009
-----	---	-------------	------------

LORATADIN - SRBOLEK A.D. - Srbija**loratadin**

(R)	tableta; 10mg; blister, 1x10 tabl. 8608809000355	4326/2008/12	05.12.2008
-----	---	--------------	------------

MACMIROR® COMPLEX - DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. - Italija**nistatin, nifuratel**

(R)	vaginalni krem; (4000000i.j.+10g)/100g; tuba sa aplikatorom, 1x30 g 8606103110152	1087/2009/12	31.03.2009
-----	--	--------------	------------

MACMIROR® COMPLEX - DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. - Italija**nistatin, nifuratel**

(R)	vaginalna kapsula, meka; 200000i.j.+500mg; blister, 1x12 kaps. 8606103110145	1086/2009/12	31.03.2009
-----	---	--------------	------------

MAPROTILIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**maprotilin**

(R)	film tableta; 25mg; blister, 3x10 tabl. 8600064117625	511/2009/12	17.02.2009
(R)	film tableta; 50mg; blister, 3x10 tabl. 8600064117632	512/2009/12	17.02.2009

MYFORTIC® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**mikofenolna kiselina**

(SZR)	gastrorezistentna tableta; 180mg; blister, 12x10 tabl. 8606103543486	799/2009/12	09.03.2009
(SZR)	gastrorezistentna tableta; 360mg; blister, 12x10 tabl. 8606103543493	798/2009/12	09.03.2009

NORVIR® - AESICA QUEENBOROUGH LTD - Velika Britanija**ritonavir**

(R)	kapsula, meka; 100mg; bočica, 4x84 kaps. 5013158765139	4330/2008/12	05.12.2008
-----	---	--------------	------------

NUTRINEAL® PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska**tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid**

(SZ)	rastvor za peritonealnu dijalizu; 0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l+0.646g/l+0.51g/l+0.595g/l+0.51g/l+0.951g/l+1.393g/l+0.85g/l+0.85g/l+1.02g/l+0.955g/l+0.714g/l+1.071g/l+0.184g/l+0.0508g/l+4.48g/l+5.38g/l; plastična kesica, 1x2000 mL 5413760016252	62/2009/12	19.01.2009
------	--	------------	------------

OMNISCAN™ - GE HEALTHCARE AS - Norveška**gadodiamid**

(Z)	rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x20 mL 8606104307087	751/2009/12	04.03.2009
(Z)	rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x15 mL 8606104307070	750/2009/12	04.03.2009
(Z)	rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 10x10 mL 8606104307063	749/2009/12	04.03.2009

PANADOL® - GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska**paracetamol**

(BR)	film tableta; 500mg; blister, 1x12 tabl. 8606103683731	515/2009/12	17.02.2009
(BR)	film tableta; 500mg; blister, 2x12 tabl. 8606103683748	516/2009/12	17.02.2009

PANADOL® EXTRA - GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska**paracetamol, kofein**

(BR)	film tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 tabl. 8606103683755	518/2009/12	17.02.2009
(BR)	film tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 tabl. 8606103683762	517/2009/12	17.02.2009

PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija**paracetamol**

(Z)	tableta; 500mg; blister, 50x10 tabl. 8608808105921	717/2009/12	24.02.2009
-----	---	-------------	------------

PHENOBARBITON - HEMOFARM AD - Srbija**fenobarbital**

(R)	tableta; 100mg; blister, 3x10 tabl. 8600097400206	70/2009/12	19.01.2009
(R)	tableta; 15mg; blister, 3x10 tabl. 8600097400213	71/2009/12	19.01.2009

PIPEM - HEMOFARM KONCERN „ZORKA PHARMA“ A.D. - Srbija**pipemidinska kiselina**

(R)	kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kaps. 8608807100620	25/2009/12	16.01.2009
-----	---	------------	------------

POSTINOR®-2 - GEDEON RICHTER PLC - Mađarska**levonorgestrel**

(BR)	tableta; 0.75mg; blister, 1x2 tabl. 5997001313022	757/2009/12	04.03.2009
------	--	-------------	------------

PREDNIZON - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina**prednizon**

(R)	tableta; 5mg; blister, 1x10 tabl. 3870010004605	4329/2008/12	05.12.2008
-----	--	--------------	------------

PRIORIX® - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija**vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški
(živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)**

(Z)	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; (10 ³ CCID50+10 ³ .7 CCID50+10 ³ CCID50)/0.5mL; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x0.5 mL 8606103683656	422/2009/12	09.02.2009
-----	--	-------------	------------

(Z)	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; (10 ³ CCID50+10 ³ .7 CCID50+10 ³ CCID50)/0.5mL; libočica sa rastvaračem u ampuli, 100x0.5 mL		
	8606103683670	308/2009/12	06.02.2009

PRITORPLUS® - BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka**telmisartan, hidrohloriazid**

(R)	tableta; 80mg+12.5mg; blister, 4x7 tabl.		
	8606007910346	520/2009/12	17.02.2009
(R)	tableta; 40mg+12.5mg; blister, 4x7 tabl.		
	8606007910339	519/2009/12	17.02.2009

PROSTAMOL® UNO - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka**Serenoa repens, etanolni ekstrakt 9-11:1**

(BR)	kapsula, meka; 320mg; blister, 1x15 kaps.		
	4013054002520	300/2009/12	06.02.2009
(BR)	kapsula, meka; 320mg; blister, 4x15 kaps.		
	4013054002346	302/2009/12	06.02.2009
(BR)	kapsula, meka; 320mg; blister, 2x15 kaps.		
	4013054002537	301/2009/12	06.02.2009

RANITIDIN - HEMOFARM AD - Srbija**ranitidin**

(R)	šumeća tableta; 150mg; strip, 10x2 tabl.		
	8600097401319	26/2009/12	16.01.2009
(R)	šumeća tableta; 300mg; strip, 15x2 tabl.		
	8600097401234	27/2009/12	16.01.2009

REGLAN® - ALKALOID AD - Makedonija**metoklopramid**

(R)	tableta; 10mg; blister, 4x10 tabl.		
	5310001203375	11/2009/12	13.01.2009

SERMION® - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija**nicergolin**

(R)	film tableta; 30mg; blister, 2x15 tabl.		
	4034541008184	197/2009/12	27.01.2009

SINEDOL - HEMOFARM AD - Srbija**heparin-natrijum, dimetilsulfoksid, dekspantenol**

(BR)	gel; 500i.j./g+150mg/g+25mg/g; tuba, 1x40 g		
	8600097011334	4432/2008/12	11.12.2008

STOCRIN® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija**efavirenz**

(SZR)	film tableta; 600mg; bočica plastična, 1x30 tabl.		
	8600103453370	677/2009/12	23.02.2009

TANAKAN® - BEAUFOR IPSEN INDUSTRIE - Francuska**ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista**

(BR)	obložena tableta; 40mg; blister, 6x15 tabl.		
	3582182990630	1084/2009/12	31.03.2009
(BR)	obložena tableta; 40mg; blister, 2x15 tabl.		
	3582182990401	1085/2009/12	31.03.2009

TETAVAKSAL-T® - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - Srbija***vakcina protiv tetanusa, adsorbovana***

(Z)	suspencija za injekciju; 40i.j. (najmanje)/0.5mL; bočica staklena, 10x5 mL 8605001700151	824/2009/12	18.03.2009
(Z)	suspencija za injekciju; 40i.j. (najmanje)/0.5mL; ampula, 10x0.5 mL 8605001700137	823/2009/12	18.03.2009
(Z)	suspencija za injekciju; 40i.j. (najmanje)/0.5mL; ampula, 1x0.5 mL 8605001700120	822/2009/12	18.03.2009

VISIPAQUE™ - GE HEALTHCARE AS - Norveška***jodiksanol***

(SZ)	rastvor za injekciju; 270mg l/mL; boca staklena, 10x50 mL 8606104307025	752/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; boca staklena, 10x50 mL 8606104307049	756/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 270mg l/mL; bočica staklena, 10x20 mL 8606104307018	754/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; bočica staklena, 10x20 mL 8606104307032	755/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; boca staklena, 10x100 mL 8606104307056	753/2009/12	04.03.2009

VISIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska***jodiksanol***

(SZ)	rastvor za injekciju; 270mg l/mL; bočica staklena, 10x20 mL 8606104307094	792/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 270mg l/mL; boca staklena, 10x50 mL 8606104307100	793/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; boca staklena, 10x100 mL 8606104307131	796/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; bočica staklena, 10x20 mL 8606104307117	794/2009/12	04.03.2009
(SZ)	rastvor za injekciju; 320mg l/mL; boca staklena, 10x50 mL 8606104307124	795/2009/12	04.03.2009

NOVA PAKOVANJA I IZMENE PAKOVANJA

CEFAN - CEFAK KG - Nemačka

valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korena - HN05CM..

HN05CM ostali hipnotici i sedativi

(BR) 1074001 obložena tableta; 441.35mg; blister, 2x25 tabl.

4260031680411

3 godine, na temperaturi do 25 °C

PSIHOLEPTICI

Cena: -
3596/2008/12 10.10.2008
02.10.2011

DULCOLAX® - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - Francuska

bisakodil - A06AB02

LAKSATIVI

A06AB kontaktni laksativi

(R) 1125073 gastorozistentna tableta; 5mg; blister, 2x10 tabl.

8606103075437

3 godine, bez posebnih naznaka

Cena: -
1/2009/12 13.01.2009
02.08.2011

HIDROKORTIZON - HEMOFARM AD - Srbija

hidrokortizon - H02AB09

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02AB glukokortikoidi

(Z) 0047122 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu;

100mg/2mL; dvodelna bočica, 1x2 mL

8600097002387

2 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti

Cena: 57.4din
3911/2008/12 23.10.2008
23.10.2013

PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija

paracetamol - N02BE01

ANALGETICI

N02BE anilidi

(BR) 1086697 tableta; 500mg; blister, 2x10 tabl.

8608808107284

3 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage

Cena: -
611/2009/12 24.02.2009
24.02.2014

ULTRAVIST® 370 - BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

jopromid - V08AB05

KONTRASTNA SREDSTVA

V08AB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi

(SZ) 0194259 rastvor za infuziju; 768.86mg/mL; boca staklena, 8x500 mL

8606007910490

3 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti i sekundarnih X zraka

Cena: -
457/2009/12 12.02.2009
21.08.2011

PROMENE NAZIVA PROIZVOĐAČA

<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> AMOKSICILIN	JUGOREMEDIJA SRBIJA NYCOMED GMBH - Nemačka kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kaps. kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kaps.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> GONAL - F® 1050 GONAL - F® 300 GONAL - F® 450 GONAL - F® 900	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. - Italija prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1050i.j./1.75mL; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x1.75 mL rastvor za injekciju; 300i.j./0.5mL; pen sa uloškom, 1x0.5 mL prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 450i.j./0.75mL; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x0.75 mL rastvor za injekciju; 450i.j./0.75mL; pen sa uloškom, 1x0.75 mL rastvor za injekciju; 900i.j./1.5mL; pen sa uloškom, 1x1.5 mL
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> CEROXIM	RANBAXY LABORATORIES LTD. - Indija MEDICO UNO D.O.O. - Srbija tableta; 250mg; blister, 1x10 tabl. tableta; 500mg; blister, 1x10 tabl.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> CIFRAN	RANBAXY LABORATORIES LTD. - Irska MEDICO UNO D.O.O. - Srbija film tableta; 250mg; blister, 1x10 tabl. film tableta; 500mg; blister, 1x10 tabl.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> DIANE®-35	SCHERING GMBH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 tabl.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> FLUOMIZIN®	CEMELOG - BRS Kft - Mađarska MEDICO UNO D.O.O. - Srbija vaginalna tableta; 10mg; blister, 1x6 tabl.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> GLIPREX®	CEMELOG - BRS Kft - Mađarska MEDICO UNO D.O.O. - Srbija tableta; 4mg; blister, 3x10 tabl. tableta; 3mg; blister, 3x10 tabl. tableta; 2mg; blister, 3x10 tabl. tableta; 1mg; blister, 3x10 tabl.
<i>dosadašnji naziv:</i> <i>novi naziv:</i> PREDUCTAL MR	LES LABORATORIES SERVIER - Francuska ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 35mg; blister, 2x30 tabl. 5906740201507

PROMENE PO OSNOVU VARIJACIJA

(izmene proizvođača i naziva leka, nove doze, oblici, pakovanja, nove indikacije, uslovi čuvanja, EAN)

SEBIVO® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska

telbivudin - J05AF11

ANTIVIRUSNI LEKOVI

ZA SISTEMSKU PRIMENU

J05AF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze

(R) 1328377 film tableta; 600mg; blister, 2x14 tabl.
7612797089620

Rok trajanja i način čuvanja:

2 godine, na temperaturi do 30°C

XOLAIR® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska

omalizumab - R03DX05

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU

U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

R03DX ostali lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima

(SZ) 0119200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150mg/1.2mL; bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1.2 mL
8606103543479

Rok trajanja i način čuvanja:

4 godine, na temperaturi od 2 - 8°C, ne zamrzavati

BONVIVA - F. Hoffmann-La Roche LTD, Švajcarska

film tabl. 1 po 150mg

varijacija tipa IB:S: izmena roka upotrebe.

umesto: 2 godine

prihvata se: 3 godine, bez posebnih uslova o čuvanju.

varijacija važi od: 20.02.2009.

DEFRINOL - Galenika AD, Srbija

sirup, 100mL (100+30mg/mL)

varijacija tipa IB:S: izmena uslova čuvanja.

treba: čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25° C, u dobro zatvorenoj boci, najduže 30 dana.

varijacija važi od: 12.02.2009.

FLUOROGAL - Galenika AD, Srbija

tabl. 100 po 1mg

tabl. 250 po 0.25mg

varijacija tipa IB:S: izmena uslova čuvanja

umesto: 15-30° C zaštićeno od svetlosti i vlage

uvodi se: bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja, u originalnom pakovanju

varijacija važi od: 03.02.2009.

ImmunoHBs - Kedrion S.P.A., Italija

rastv. za inj. 1 po 540i.j./3mL

varijacija tipa IB:S: izmena roka upotrebe leka

prihvata se produženje roka upotrebe leka sa 2 godine na 3 godine, pri uslovima čuvanja: na temperaturi od 2-8° C.

varijacija važi od: 11.02.2009.

PARACETAMOL – Galenika AD, Srbija

tabl. 500 po 500mg

varijacija tipa IB:S: izmena uslova čuvanja leka

umesto: na temperaturi 15-30 C, zaštićeno od svetlosti i vlage

prihvata se: u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

varijacija važi od: 18.02.2009.

SINODERM – Galenika AD, Srbija

gel, 30g

mast, 15g

krem, 15g

varijacija tipa II:S: promene usled hitnih bezbednosnih mera.

Lek se koristi kod odraslih i dece starije od godinu dana. Ne sme se koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara. Pri primeni kod dece mladje od 2 godine potreban je poseban oprez. Primena leka za lečenje promena na licu se ne preporučuje, a ukoliko se primeni, ne koristiti duže od 5 dana, bez lekarskog nadzora. Kontraindikovan je kod akni, rozacea, perioralne dermatoze, perianalnog/genitalnog pruritusa, proširene psorijaze tipa plaqua, tuberkuloze kože, primarne bakterijske, virusne ili gljivične infekcije kože, kod preosetljivosti.

varijacija važi od: 12.02.2009.

SINODERM N – Galenika AD, Srbija

mast, 15g

krem, 15g

varijacija tipa II:S: promene usled hitnih bezbednosnih mera.

Lek se koristi kod odraslih i dece starije od godinu dana. Ne sme se koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara. Pri primeni kod dece mladje od 2 godine potreban je poseban oprez. Primena leka za lečenje promena na licu se ne preporučuje, a ukoliko se primeni, ne koristiti duže od 5 dana, bez lekarskog nadzora. Kontraindikovan je kod akni, rozacea, perioralne dermatoze, perianalnog/genitalnog pruritusa, proširene psorijaze tipa plaqua, tuberkuloze kože, primarne bakterijske, virusne ili gljivične infekcije kože, preosetljivosti.

varijacija važi od: 12.02.2009.

VINORELSIN – S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija

konc. za rastv. za inf. 1 po 10mg/1mL

varijacija tipa IB:S: izmena roka upotrebe gotovog proizvoda

umesto: 18 meseci

prihvata se: 2 godine pri uslovima čuvanja na temperaturi od 2-8° C, u originalom pakovanju.

varijacija važi od: 09.02.2009.

ZENAPAX – F. Hoffmann-La Roche LTD, Švajcarska

koncentrat za rastvor za infuziju, 3 po 25mg/5mL

varijacija tipa II:S-CTD-MODUL 3: izmena roka upotrebe gotovog proizvoda

umesto: 24 meseca

prihvata se: 3 godine

varijacija važi od: 13.02.2009.

PROMENA NAZIVA LEKA:

umesto: FEIBA TIM 4 – Baxter AG, Austrija

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 1 po 1000i.j.+1 po 20mL

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 1 po 500i.j.+1 po 20mL

uvodi se: FEIBA NF

varijacija važi od: 13.02.2009.

PROMENA MESTA PROIZVODNJE

umesto: RAMIPRIL – Zdravlje A.D., Srbija

tabl. 28 po 1.25mg

tabl. 28 po 5mg

tabl. 28 po 2.5mg

tabl. 28 po 10mg

uvodi se: novo mesto proizvodnje: Actavis Ltd., Malta

varijacija važi od: 04.02.2009.

PROMENA ADRESE PROIZVODJAČA

Boehringer Ingelheim Ellas AE:

umesto: 5th km Peanias-Markopoulou, Attica, Grčka

uvodi se: 5th km Peanias-Markopoulou, Koropi, Grčka

PROMENA ADRESE NOSIOCA DOZVOLE

umesto: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG - PREDSTAVNIŠTVO,
Srbija, Beograd, Beogradska 39/V

treba: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG - PREDSTAVNIŠTVO,
Srbija, Beograd, Omladinskih brigada 90b

umesto: KRKA FARMA D.O.O., Srbija, Beograd, Kralja Petra I 32

treba: KRKA FARMA D.O.O., Srbija, Beograd, Jurija Gagarina 26/V/II

PROMENE NAZIVA PROIZVODA

- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE
novi naziv: AMOKSIKLAV®
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 film tableta; 250mg+125mg; bočica od tamnog stakla, 1x15 tabl.
 228/2005/12 od 26.08.2005
 684/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE
novi naziv: AMOKSIKLAV®
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 film tableta; 500mg+125mg; bočica od tamnog stakla, 1x15 tabl.
 229/2005/12 od 26.08.2005
 685/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® 156.25MG/5ML
 PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU
novi naziv: AMOKSIKLAV®
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 prašak za oralnu suspenziju; 125mg/5ml+31.25mg/5ml; bočica od tamnog stakla, 1x100 ml
 230/2005/12 od 26.08.2005
 682/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® 1.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU
novi naziv: AMOKSIKLAV®
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 prašak za rastvor za injekciju; 1000mg+200mg; bočica staklena, 5x1 kom
 233/2005/12 od 26.08.2005
 687/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU
novi naziv: AMOKSIKLAV®
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 prašak za rastvor za injekciju; 500mg+100mg; bočica staklena, 5x1 kom
 232/2005/12 od 26.08.2005
 686/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312.5MG/5ML
 PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU
novi naziv: AMOKSIKLAV® FORTE
SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina
 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5ml+62.5mg/5ml; bočica od tamnog stakla, 1x100 ml
 231/2005/12 od 26.08.2005
 683/2009/12 od 23.02.2009
- dosadašnji naziv:** BERIPLAST® P COMBI-SET
novi naziv: BERIPLAST® P COMBI-SET 1ML
JUGOHEMIJA - FARMACIJA D.O.O. - Srbija
fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum-hlorid
 prašak i rastvarač za lepak za tkivo; (90mg+60U+1000KIU+500i.j.+5.9mg)/ml;
 bočica, 4x1 kom (set 1 ml)
 813/2008/12 od 28.02.2008
 4384/2008/12 od 08.12.2008

dosadašnji naziv: BERIPLAST® P COMBI-SET

novi naziv: BERIPLAST® P COMBI-SET 3ML

JUGOHEMIJA - FARMACIJA D.O.O. - Srbija

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum-hlorid

prašak i rastvarač za lepak za tkivo; (270mg+180U+3000KIU+1500i.j.+17.7mg)/3ml;

bočica, 4x1 kom (set 3 ml)

814/2008/12 od 28.02.2008

4383/2008/12 od 08.12.2008

IZMENA EAN KODA

februar i mart 2009.

Naziv leka	INN	Pakovanje	Broj i datum rešenja o stavljanju leka u promet	Broj i datum izmene rešenja o stavljanju leka u promet	Novi EAN kod	Naziv nosioca dozvole
Aggrenox®	acetilsalicilna kiselina, dipiridamol	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 25 mg + 200 mg; bočica, 1x60 kaps.	1178/2006/12 od 13.07.2006	447/2009/12 od 11.02.2009	8606103075277	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Berodual®	fenoterol, ipratropijum-bromid	rastvor za raspršivanje; 0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml; bočica od tamnog stakla, 1x20 ml	532/2005/12 od 08.11.2005	94/2009/12 od 20.01.2009	8606103075307	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Buscopan®	hioscin-butilbromid	supozitorija; 10 mg; strip, 1x6 kom	929/2008/12 od 05.03.2008	91/2009/12 od 20.01.2009	8606103075154	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Buscopan®	hioscin-butilbromid	rastvor za injekciju; 20 mg/ml; ampula, 6x1 ml	928/2008/12 od 05.03.2008	92/2009/12 od 20.01.2009	8606103075147	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Buscopan®	hioscin-butilbromid	obložena tableta; 10 mg; blister, 2x10 tabl.	927/2008/12 od 05.03.2008	93/2009/12 od 20.01.2009	8606103075161	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Cetrotide®	cetoreliks	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 3 mg/3 ml; libočica i rastvor u špricu, 1x3 ml	721/2006/12 od 25.05.2006	191/2009/12 od 27.01.2009	8606105311298	MERCK D.O.O., Srbija
Cetrotide®	cetoreliks	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 0,25 mg/ml; libočica i rastvor u špricu, 1x1 ml	722/2006/12 od 25.05.2006	190/2009/12 od 27.01.2009	8606105311304	MERCK D.O.O., Srbija

Naziv leka	INN	Pakovanje	Broj i datum rešenja o stavljanju leka u promet	Broj i datum izmene rešenja o stavljanju leka u promet	Novi EAN kod	Naziv nosioca dozvole
Crinone®	progesteron	vaginalni gel; 8%; aplikator; 15x1.125 g	1512/2007/12 od 12.07.2007	186/2009/12 od 27.01.2009	8606105311281	MERCK D.O.O., Srbija
Gonal - f®	folitropin alfa	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x1 ml	515-04-1560/04 od 10.06.2004	193/2009/12 od 03.03.2009	86061053111410	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Gonal - f® 1050	folitropin alfa	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1050i.j./1.75ml; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x1.75 ml	1314/2007/12 od 12.06.2007	192/2009/12 od 24.02.2009	8606105311342	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Gonal - f® 300	folitropin alfa	rastvor za injekciju; 300i.j./0.5ml; pen sa uloškom, 1x0.5 ml	720/2006/12 od 25.05.2006	180/2009/12 od 24.02.2009	8606105311373	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Gonal - f® 450	folitropin alfa	rastvor za injekciju; 450i.j./0.75ml; pen sa uloškom, 1x0.75 ml	718/2006/12 od 25.05.2006	179/2009/12 od 23.02.2009	8606105311366	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Gonal - f® 450	folitropin alfa	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 450i.j./0.75ml; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x0.75 ml	1315/2007/12 od 12.06.2007	185/2009/12 od 24.02.2009	8606105311359	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Gonal - f® 900	folitropin alfa	rastvor za injekciju; 900i.j./1.5ml; pen sa uloškom, 1x1.5 ml	719/2006/12 od 25.05.2006	178/2009/12 od 24.02.2009	8606105311380	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Humira®	adalimumab	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40 mg/0.8 ml; napunjen injekcioni špric, 2x0.8 ml	2701/2008/12 od 21.08.2008	445/2009/12 od 17.02.2009	4032046002294	ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija

Naziv leka	INN	Pakovanje	Broj i datum rešenja o stavljanju leka u promet	Broj i datum izmene rešenja o stavljanju leka u promet	Novi EAN kod	Naziv nosioca dozvole
Luveris® 75 IU	lutropin alfa	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75 i.j.; libočica sa rastvaračem, 1x1 ml	497/2005/12 od 26.10.2005	189/2009/12 od 27.01.2009	8606105311311	MERCK D.O.O., Srbija, Beograd, Đorđa Stanojevića 12
Metalyse®	tenekteplaza	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 50 mg/10 ml; libočica sa rastvaračem u špricu, 1x10 ml	130/2007/12 od 11.01.2007	449/2009/12 od 11.02.2009	8606103075420	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Micardis®	telmisartan	tableta; 80 mg; blister, 4x7 tabl.	1220/2006/12 od 21.07.2006	450/2009/12 od 11.02.2009	8606103075321	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Micardis®	telmisartan	tableta; 40 mg; blister, 4x7 tabl.	1219/2006/12 od 21.07.2006	448/2009/12 od 11.02.2009	8606103075314	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Micardis® Plus	telmisartan hidrohlortiazid	tableta; 80 mg + 12.5 mg; blister, 4x7 tabl.	1222/2006/12 od 21.07.2006	452/2009/12 od 11.02.2009	8606103075345	BOEHRINGER INGELHEIM, PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Micardis® Plus	telmisartan, hidrohlortiazid	tableta; 40 mg + 12.5 mg; blister, 4x7 tabl.	1221/2006/12 od 21.07.2006	451/2009/12 od 11.02.2009	8606103075338	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Ovitrelle®	horigonadotropin alfa	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250 mcg/ml; libočica sa rastvaračem, 1x1 ml	1305/2006/12 od 04.08.2006	188/2009/12 od 27.01.2009	8606105311328	MERCK D.O.O., Srbija, Beograd, Đorđa Stanojevića 12
Ovitrelle®	horigonadotropin alfa	rastvor za injekciju; 250mcg/0.5ml; napunjen injekcionim špric, 1x0.5 ml	1290/2006/12 od 03.08.2006	187/2009/12 od 20.02.2009	8606105311335	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Partusisten®	fenoterol	koncentrat za rastvor za infuziju; 0.5 mg/10 ml; ampula, 5x10 ml	961/2007/12 od 10.05.2007	90/2009/12 od 20.01.2009	8606103075383	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija

Naziv leka	INN	Pakovanje	Broj i datum rešenja o stavljanju leka u promet	Broj i datum izmene rešenja o stavljanju leka u promet	Novi EAN kod	Naziv nosioca dozvole
Partusisten®	fenoterol	tableta; 5 mg; blister, 5x10 tabl.	2261/2006/12 od 06.12.2006	89/2009/12 od 20.01.2009	8606103075390	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Prospan®	bršljan (Hedere helix), standardizovani suvi ekstrakt lista	šumeća tableta; 65mg; strip, 5x2 tabl.	1355/2006/12 od 08.08.2006	828/2009/12 od 04.03.2009	4104480703447	LIBRA BGD D.O.O., Beograd, Srbija
Raptiva®	efalizumab	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100 mg/ml; i bočica i rastvor u špricu, 4x1.3 ml	100/2006/12 od 31.01.2006	183/2009/12 od 27.01.2009	86061053111403	MERCK D.O.O., Srbija, Beograd, Đorđa Stanojevića 12
Raptiva®	efalizumab	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100 mg/ml; i bočica i rastvor u špricu, 1x1.3 ml	99/2006/12 od 31.01.2006	184/2009/12 od 27.01.2009	86061053111397	MERCK D.O.O., Srbija
Rebif®	interferon beta 1 a	rastvor za injekciju; 6Mij; napunjen injekcioni špric sa iglom, 12x0.5 ml	515-04-4820/03 od 06.04.2009	181/2009/12 od 03.03.2009	86061053111427	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Rebif®	interferon beta 1 a	rastvor za injekciju; 12Mij; napunjen injekcioni špric sa iglom, 12x0.5 ml	515-04-4821/03 od 06.04.2009	182/2009/12 od 03.03.2009	86061053111434	MERCK D.O.O., Beograd, Srbija
Reductil®	sibutramin	kapsula, tvrda; 10 mg; blister, 2x14 kaps.	1830/2007/12 od 03.09.2007	446/2009/12 od 11.02.2009	4032046001167	ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija
Viramune®	nevirapin	tableta; 200 mg; blister, 6x10 tabl.	134/2006/12 od 06.02.2006	95/2009/12 od 20.01.2009	8606103075406	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH - PREDSTAVNIŠTVO, Srbija

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE SU IZDATA REŠENJA O PRESTANKU VAŽNOSTI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET

naziv leka, nosilac dozvole inn, oblik i doza	broj i datum rešenja koje prestaje da važi	broj i datum rešenja o prestanaku važenja
APAURIN® KRKA D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija <i>(diazepam)</i> (Z) rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2 ml	515-04-269/03/1 od 05.03.2004	1402/2009/12 od 25.03.2009
CAELYX - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG - Švajcarska <i>(doksorubicin)</i> (SZ) koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg; bočica, 1x10 ml	515-04-3653/03 od 31.12.2003	97/2009/12 od 26.01.2009
DALERON® COLD3 - KRKA D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija <i>(pseudofedrin, paracetamol, deksmetorfan)</i> (R) film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 tabl. (R) film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 tabl.	409/2006/12 od 05.04.2006 410/2006/12 od 05.04.2006	996/2009/12 od 16.03.2009 995/2009/12 od 16.03.2009
HIBIDEKS DAP - GALENIKA AD - Srbija <i>(hlorheksidin)</i> (I) rastvor za ispiranje usta; 0.12%; bočica, 1x200 ml (BR) aerosol; 0.12g/100 ml; bočica sa raspršivačem, 1x80 ml	3/2-10-7691 od 25.10.2002 3/2-10-7682 od 25.10.2002	280/2009/12 od 24.02.2009 281/2009/12 od 20.02.2009
KOMBIKAF - B.G-PHARM D.O.O. - Srbija <i>(acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein)</i> (BR) prašak; 200mg+300mg+50mg; kesica, 10x1 kom	515-04-2657/03 od 08.03.2004	816/2009/12 od 16.03.2009
PEGINTRON - SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija <i>(peginterferon alfa-2b)</i> (SZR) liofilizat za rastvor za injekciju; 50mcg; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5 ml (SZR) liofilizat za rastvor za injekciju; 80mcg; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5 ml	515-04-1631/03 od 15.08.2003 515-04-1631-1 od 15.08.2003	1009/2009/12 od 19.03.2009 1010/2009/12 od 19.03.2009

ABECEDNI SPISAK PROIZVOĐAČA SA ASORTIMANOM NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

ACTAVIS HF. - Island

ACTAFENAK® (diklofenak)

AMGEN EUROPE B.V. - Holandija

MIMPARA® (sinakalcet)

ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska

TERTENSIF® SR (indapamid)

ASTRAZENECA AB - Švedska

OXIS® TURBUHALER® (formoterol)

ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija

CASODEX® (bikalutamid)

BANO GMBH & CO. KG - Austrija

THIOGAMMA® 600 ORAL (tioktinska kiselina)

BAYER HEALTHCARE AG - Nemačka

XARELTO® (rivaroksaban)

BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka

PRIMOVIST® (gadoksetinska kiselina)

BELUPO, LJJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

BISOBEL® (bisoprolol)

TAMOSIN® (tamsulosin)

BIEFFE MEDITAL SPA - Italija

PERFALGAN® (paracetamol)

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka

PRADAXA® (dabigatraneteksilat)

BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

VENOSAN® (heparin-natrijum, esencijalni fosfolipidi, escin)

BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska

PERFALGAN® (paracetamol)

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - Italija

PERFALGAN® (paracetamol)

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska

AVODART® (dutasterid)

CENEXI SAS - Francuska

NEOTIGASON® (acitretin)

CHINNOI PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska

ESPERAL® (disulfiram)
 TRIAPIN® (felodipin, ramipril)
 TRIAPIN® MITE (felodipin, ramipril)

EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija

VINORELBIN „EBEWE“ (vinorelbin)

EXTRACTUMPHARMA CO. LTD. - Mađarska

MELOXEP (meloksikam)

FERRING - LEČIVA, A.S. - Češka

PENTASA® (mesalazin)

FERRING AB - Švedska

MINIRIN MELT (dezmopresin)

FERRING GMBH - Nemačka

MINIRIN MELT (dezmopresin)

GE HEALTHCARE IRELAND - Irska

OMNISCAN™ (gadodiamid)

GEDEON RICHTER PLC - Mađarska

ESCAPELLE® (levonorgestrel)
 GORDIUS® (gabapentin)
 LINDYNETTE® (20 gestoden, etinilestradiol)
 LINDYNETTE® 30 (gestoden, etinilestradiol)
 REGULON® (dezogestrel, etinilestradiol)
 REXETIN® (paroksetin)
 TRI-REGOL (levonorgestrel, etinilestradiol)

GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija

AVAMYS® (flutikazonfuroat)

GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska

PANADOL® BABY (paracetamol)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija

INFANRIX® -IPV+HIB

(vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana)

ROTARIX® (živa vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom)

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO., KG - Nemačka

COLDREX® CAPLETS (paracetamol, kofein, fenilefrin)

GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska

COLDREX® CAPLETS (paracetamol, kofein, fenilefrin)

HABIT PHARM A.D. - Srbija

HABITAX (paklitaksel)

HEMOFARM AD - Srbija

BONAP (alendronska kiselina)
 SILDENA (sildenafil)

HEXAL AG - Nemačka

FENTANYL SANDOZ® MAT (fentanil)

FENTANYL SANDOZ® TTS (fentanil)

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

HEPAN® (heparin-natrijum, dekspantenol)

ROZAMET® (metronidazol)

KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka

NASIC (ksilometazolin, dekspantenol)

NASIC ZA DECU (ksilometazolin, dekspantenol)

KRKA POLSKA SPOLKA Z.O.O. - Poljska

ZALASTA® Q-TAB® (olanzapin)

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

CO-PRENESSA® (perindopril, indapamid)

ZALASTA® Q-TAB® (olanzapin)

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

FOROSA® (alendronska kiselina)

IMMUNAL® (osušeni sok herbe purpurne ehinacee)

PRALIP® (pravastatin)

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska

TENAXUM® (rilmenidin)

M.D. NINI D.O.O. - Srbija

KLOPIDOGREL (klopidogrel)

MEDICO UNO D.O.O. - Srbija

OMICRAL (itrakonazol)

MERCK SANTE S.A.S. - Francuska

CAMPRAL® (akamprosat)

MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija

ISENTRESS® (raltegravir)

NI MEDIC D.O.O. - Srbija

KLACID® IV (klaritromicin)

KLACID® MR (klaritromicin)

NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska

IRDA® (irbesartan)

LIPIDRA® (atorvastatin)

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska

XOLAIR® (omalizumab)

ORGANON S.A. - Francuska

PAVULON® (pankuronijum-bromid)

PHARMACHEMIE B.V. - Holandija

FLUDARABINE-TEVA (fludarabin)
LEUCOVORIN-TEVA (kalcijum-folinat)

PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

TIMOPRAM® (citalopram)

PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska

LUXETA® (sertralin)

REMEDICA LTD - Kipar

AMITRIPTYLINE (amitriptilin)

RENAUDIN LABORATORIES - Francuska

PERFALGAN® (paracetamol)

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

SINPLATIN® (cisplatin)
SINTOPOZID® (etopozid)

SCHERING PLOUGH - Francuska

DIPROSALIC® (betametazon, salicilna kiselina)

SCHERING PLOUGH SPA - Italija

ELOCOM® (mometazon)

SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija

COLOSPA RETARD (mebeverin)
DUPHALAC® (laktuloza)
DUPHASTON® (didrogesteron)
FEVARIN® (fluvoksamin)

SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska

COLOSPA RETARD (mebeverin)
FEVARIN® (fluvoksamin)
PHYSIOTENS® (moksonidin)

SOPHARMA PLC - Bugarska

PARACETAMOL SOPHARMA (paracetamol)
PRAVAPRES® (pravastatin)

SRBOLEK A.D. - Srbija

KLOPIDOGREL (klopidogrel)

SYNTHON HISPANIA, S.L. - Španija

TAMSUDIL® (tamsulosin)

WULFING PHARMA GMBH - Nemačka

DOBUTAMIN ADMEDA 250 (dobutamin)

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

Za izdavača
Prim mr ph Tomislav Solarović

Lektor
Prof Radmila Arsenijević

Dizajn i prelom teksta
HELICON PUBLISHING

Tehnička obrada i kompjuterska priprema
Vladimir Đorđević

Tiraž
3000

Štampa
Grafolik, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

615

NACIONALNI registar lekova / glavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić. - 2006 - Beograd (Vojvode Stepe 458) : Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije : Helicon Publishing, 2006 (Beograd : Grafolik). - 22 cm

Godišnje
ISSN 1452-3337 = Nacionalni registar lekova
COBISS.SR-ID 127781900