



Agencija za lekove
i medicinska sredstva Srbije

NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

NRL
DODATAK
3

Beograd
oktobar 2009.

IZDAVAČ**Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima**

Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd

www.alims.sr.gov.yue-mail: registar@alims.sr.gov.yu**Helicon Publishing**www.helicon.co.yuoffice@helicon.co.yu**ZA IZDAVAČA**

Mr ph. spec. Tatjana Šipetić

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

AUTORI I UREDNICI

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić

Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović

Prim. mr sc. ph. Milena Miljković

Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik

Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

SARADNICI

Mr sci. ph Danka Stefanović

Mr ph. Danka Tešić

Mr ph. Katarina Popović

Mr ph. Katarina Kovačević

Mr ph. Marija Mašković

Mr ph. Ivana Mihajlović

Dr vet. med Jelena Borlja

Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović

Ing. Julija Grujić

Veselina Rakanović, farm. tehn.

Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SARADNICI NA PRIPREMI ID PODATAKA

Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević

Mr ph. Vladan Savić

Mr ph. Dejan Stevanović

Nataša Đukić

ŠTAMPA

GRAFOLIK, Beograd

TIRAŽ:

3000

ISSN 1452-3337

PREDGOVOR

Dodatak 3 Nacionalnog registra lekova, 2009 godine sadrži pregledno klasifikovane stručne informacije o promenama vezanim za stavljanje lekova u promet u periodu *maj, juni, juli 2009. godine*, a koje su date prema principima i sadržaju koji se nalazi u NRL, 2009.

U Dodatku 3 su obradjeni podaci o novoregistrovanim lekovima, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih podataka koji su bitni za praksu. To su podaci o: lekovima za koje je izvršena obnova registracije, izdata rešenja o prestanku dozvole za stavljanje u promet, novim dozama, pakovanjima, farmaceutskim oblicima registrovanih lekova, izmenama EAN koda za pojedine lekove, kao i podaci o izmenama drugih identifikacionih i važnih stručnih podataka o lekovima.

Napominjemo, da kod lekova za koje je izvršena obnova registracije, sada nisu menjani podaci o indikacijama i doziranju, a isti će biti obradjeni prema novim sažecima karakteristika lekova i navedeni u sledećem izdanju NRL.

Uz želju i obavezu da vas i dalje ažurno informišemo o promenama u oblasti registracije lekova, očekujemo vaše sugestije.

Autori i urednici

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno.

© Sva prava zadržana.

SADRŽAJ

Predgovor	3
Abecedni spisak novoregistrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama	7
Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama	31
Tradicionalni lekovi	31
Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima	33
Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova	35
Abecedni spisak novoregistrovanih lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR)	37
Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (S ▲)	37
Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom (▲)	37
Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija novoregistrovanih lekova	39
Abecedni spisak lekova za koje je izvršena obnova registracije sa pripadajućim EAN kôdom	45
Abecedni spisak lekova za koje su izdata rešenja o prestanku važnosti dozvole za stavljanje u promet .57	
Promene naziva proizvođača	59
Promene adrese i drugih podataka nosioca dozvole	59
Korekcije u nacionalnom registru lekove 2009	59
Promene po osnovu varijacija	61
Promene naziva proizvoda (varijacija)	69
Promene pakovanja registrovanih lekova	71
Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom novoregistrovanih lekova	75

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA, CENAMA I PARALELAMA

ACTEMRA® - ROCHE PHARMA AG - Nemačka

tocilizumab - L04AC07

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

L04AC inhibitori interleukina

(SZ)	0014400 koncentrat za rastvor za infuziju; 80mg/4mL; bočica staklena, 1x4 mL 8606103889317	Cena: 17722,60 1531/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
	30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati		11.05.2014
(SZ)	0014401 koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL; bočica staklena, 1x10 mL 8606103889324	Cena: 44306,50 1530/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
	30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati		11.05.2014
(SZ)	0014402 koncentrat za rastvor za infuziju; 400mg/20mL; bočica staklena, 1x20 mL 8606103889331	Cena: 88612,90 1532/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
	30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati		11.05.2014

Doziranje: *umereni do teški aktivni reumatoidni artritis (RA) odraslih (kod kojih prethodna terapija nije dala zadovoljavajući rezultat), kao monoterapija ili u kombinaciji sa metotreksatom: preporučena doza je 8mg/kg telesne težine, ali ne manje od 480 mg, jednom u četiri nedelje. Terapiju treba da započnu zdravstveni radnici koji su iskusni u dijagnostikovanju i terapiji RA.*

AMLONORM® - ADAMED SP.Z.O.O. - Poljska

amlodipin - C08CA01

BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA

C08CA derivati dihidropiridina

(R)	1402144 tableta; 10mg; blister, 1x30 kom 5900411122009	Cena: - 1495/2009/12	- 11.05.2009 11.05.2014
	4 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage		11.05.2014
(R)	1402145 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom 5900411121002	Cena: - 1494/2009/12	- 11.05.2009 11.05.2014
	4 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage		11.05.2014

Doziranje: *hipertenzija, profilaksa hronične stabilne angine pektoris, vazospastična angina pektoris (Prinzmetal-ova angina): uobičajena početna doza je 5mg jednom dnevno, maks.10mg. Može se koristiti u kombinaciji sa tiazidnim diureticima, alfa-blokatorima, blokatorima beta-adrenergičkih receptora, ili sa ACE inhibitorima.*

ARANESP® - AMGEN EUROPE B.V. - Holandija

darbepoetin alfa - B03XA02

ANTI ANEMICI

B03XA ostali antianemijski preparati

(SZR)	0069920 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 100mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL 8606007081084	Cena: 17417,30 1544/2009/12	23.04.2009 23.04.2014
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati.		23.04.2014
	Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		
(R)	0069921 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100mcg/0.5mL; pen sa uloškom, 1x0.5 mL 8606007081169	Cena: 17417,30 1538/2009/12	23.04.2009 23.04.2014
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati.		23.04.2014
	Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		

(SZR)	0069922 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 150mcg/0.3mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.3 mL 8606007081091	Cena: 1534/2009/12	26057,20 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(R)	0069923 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 150mcg/0.3mg; pen sa uloškom, 1x0.3 mL 8606007081176	Cena: 1541/2009/12	26057,20 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(SZR)	0069924 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL 8606007081022	Cena: 1540/2009/12	3506,90 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(R)	0069925 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 20mcg/0.5mL; pen sa uloškom, 1x0.5 mL 8606007081121	Cena: 1535/2009/12	3506,90 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(SZR)	0069926 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 300mcg/0.6mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.6 mL 8606007081107	Cena: 1550/2009/12	45563,40 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(R)	0069927 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 300mcg/0.6mL; pen sa uloškom, 1x0.6 mL 8606007081183	Cena: 1539/2009/12	45563,40 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(SZR)	0069928 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 30mcg/0.3mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.3 mL 8606007081039	Cena: 1546/2009/12	5245,90 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(SZR)	0069929 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40mcg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.4 mL 8606007081046	Cena: 1542/2009/12	6984,90 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(R)	0069930 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 40mcg/0.4mL; pen sa uloškom, 1x0.4 mL 8606007081138	Cena: 1545/2009/12	6984,90 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(SZR)	0069931 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 500mcg/mL; napunjen injekcioni špric, 1x1 mL 8606007081114	Cena: 1547/2009/12	75676,00 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014
(R)	0069932 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 500mcg/mL; pen sa uloškom, 1x1 mL 8606007081190	Cena: 1536/2009/12	75676,00 23.04.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.		23.04.2014

(SZR)	0069933 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 50mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL 8606007081053 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1552/2009/12	8724,30 23.04.2009 23.04.2014
(SZR)	0069934 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 60mcg/0.3mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.3 mL 8606007081060 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1537/2009/12	10462,80 23.04.2009 23.04.2014
(R)	0069935 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 60mcg/0.3mL; pen sa uloškom, 1x0.3 mL 8606007081145 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1543/2009/12	10462,80 23.04.2009 23.04.2014
(SZR)	0069936 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 80mcg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.4 mL 8606007081077 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1549/2009/12	13940,60 23.04.2009 23.04.2014
(R)	0069937 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 80mcg/0.4mL; pen sa uloškom, 1x0.4 mL 8606007081152 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1548/2009/12	13940,60 23.04.2009 23.04.2014
(SZR)	0069938 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 15mcg/0.375mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.375 mL 8606007081015 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1533/2009/12	2634,30 23.04.2009 23.04.2014
(SZR)	0069939 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10mcg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.4 mL 8606007081008 2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana.	Cena: 1551/2009/12	1758,90 23.04.2009 23.04.2014

Doziranje: *anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi:* odrasli i deca starija od 11 godina - terapiju započeti sa s.c. ili i.v. primenom 450nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL, doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL; *anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji:* odrasli - terapiju započeti sa s.c. primenom 675nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor, dalju terapiju prekinuti; ili primeniti s.c. 225nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor - dalju terapiju prekinuti, a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) - dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.

ARILIN® RAPID - DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka
metronidazol - G01AF01

GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola

(R)	6137063 vagitorija; 1000mg; strip, 1x2 kom 8600103690133 5 godina, na temperaturi do 25°C	Cena: 1507/2009/12	- 11.05.2009 11.05.2014
-----	---	------------------------------	-------------------------------

Doziranje: *trihomonijaza, bakterijske vaginoze:* jednu vagitoriju, uveče, staviti duboko u vaginu. Lečenje traje 1-2 dana, ne duže od 10 dana.

BISOPROLOL SANDOZ® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija**bisoprolol** - C07AB07**BLOKATORI****BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA****C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni**

(R)	1107025 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8606010891441	Cena:	378,20
	5 godina, bez posebnih naznaka	2426/2009/12	28.04.2009
(R)	1107026 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8606010891427	Cena:	277,00
	5 godina, bez posebnih naznaka	2425/2009/12	28.04.2009
(R)	1107027 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8606010891434	Cena:	287,90
	5 godina, bez posebnih naznaka	2424/2009/12	28.04.2009
			28.04.2014

Doziranje: hipertenzija, angina pectoris: individualno. Početna doza je 5mg dnevno; uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, ujutru ili uz doručak, maks. 20mg dnevno. Kod bolesnika sa insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 20mL/min) ili insuficijencijom jetre, doza ne sme biti veća od 10mg dnevno, može biti podeljena u dva dela. Tabl. treba progutati celu sa tečnosti, u ne treba je žvakati. Ukoliko terapiju treba ukinuti, dozu treba postepeno smanjivati za polovinu, u nedeljnim razmacima. Primena kod dece se ne preporučuje.

BIVALOS® - LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska**ranelinska kiselina (stroncijum ranelat)** - M05BX03**LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU****M05BX ostali lekovi koji utiču na mineralizaciju kostiju**

(R)	3059017 granule za oralnu suspenziju; 2g; kesica, 28x2 g 3594456500711	Cena:	-
	3 godine, bez posebnih naznaka	3586/2009/12	29.06.2009
			29.06.2014

Doziranje: postmenopauzalna osteoporoz (u cilju smanjenja rizika od preloma pršljenova i kuka): preporučena doza je jedna kesica (2gr), jednom dnevno. Suspenziju treba popiti odmah nakon pripreme u čaši vode. Obzirom da se sporo resorbuje, treba uzeti pred spavanje, najmanje dva sata nakon obroka. Uz terapiju treba uzimati vitamin D i suplemente sa kalcijumom ukoliko je njihov unos hranom nedovoljan. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.

CAFFETIN MENSTRUAL® - ALKALOID AD - Makedonija**ibuprofen** - M01AE01**ANTIINFLAMATORNI****I ANTIREUMATSKI PROIZVODI****M01AE derivati propionske kiseline**

(BR)	1162584 film tableta; 200mg; blister, 1x10 kom 5310001202583	Cena:	-
	3 godine, u originalnom pakovanju, bez posebnih naznaka	3879/2009/12	15.07.2009
			15.07.2014

Doziranje: simptomatska terapija blagih do umerenih bolova kod dismenoreje: odrasli i adolescenti preko 12 godina 1-2 tabl. na 4-6 sati, ne duže od tri dana; maks. dnevna doza ne sme biti veća od 6 tabl. (1200mg ibuprofena)

CARBAMAZEPINE-RETARD - REMEDICA LTD - Kipar**karbamazepin** - N03AF01**ANTIPILEPTICI****N03AF derivati karboksamida**

(R)	1084351 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400mg; blister, 3x10 kom 5290665002715	Cena:	-
	5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	1272/2009/12	11.05.2009
			11.05.2014

Doziranje: epilepsija (generalizovani toničko-klonički i parcijalni napadi): odrasli monoterapija, po protokolu, uz prilagodjavanje potrebama svakog pacijenta, obično 1-2 puta po 100-200mg dnevno, maks. 2000mg dnevno. Deca, po protokolu, obično 10-20 mg/kg telesne težine dnevno, podeljeno u nekoliko doza; deca starosti od 5-10 godina 400-600mg dnevno; deca od 10-15 godina 600-1000mg. Deci do 5 godina starosti se ne preporučuje. *Trigeminalna neuralgija:*

početi sa dozom od 200-400mg dnevno (kod starijih pacijenata 1-2 puta dnevno po 100mg) i postepeno povećavati do potpunog prestanka bolova; uobičajena doza je 3-4 puta dnevno po 200mg, maks. 1600mg dnevno. Terapija se ne sme prekidati naglo. *Profilaksa manično-depresivne psihoze kod pacijenata koji ne reaguju na terapiju litijumom:* Uobičajen dozni režim je 400-600mg dnevno, podeljeno u više doza. Početnu dozu od 400 mg dnevno podeljenu u više doza, treba postepeno povećavati sve do postizanja adekvatne kontrole simptoma bolesti ili dok se ne postigne ukupna doza od 1600 mg podeljena u više doza.

CLAREXID® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska**klaritromicin** - J01FA09**ANTIBAKTERIJSKI LEKOV
ZA SISTEMSKU PRIMENU****J01FA makrolidi**

(R)	1325528 film tableta; 250mg; blister, 1x14 kom 3850114222136 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		1509/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(R)	1325529 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3850114222143 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		1508/2009/12	11.05.2009 11.05.2014

Doziranje: *infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta, kože i mekih tkiva odrasli i deca starija od 12 godina:* uobičajena doza je 250mg na 12 sati, bez obzira na obroke, tokom 7 dana; teške infekcije 500mg na 12 sati, i do 14 dana. *Eradikacija H. pylori kod bolesnika sa duodenusnim ulkusom* (u kombinaciji sa omeprazolom ili lansoprazolom, amoksicilinom, metronidazolom); po protokolu. Kod bolesnika sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min) neophodno je prilagođavanje doze. Tabletu progutati celu sa malo vode. Ne savetuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina.

CO-IRDA® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**irbesartan, hidrohloriazid** - C09DA04**LEKOV KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici**

(R)	1401920 film tableta; 150mg+12.5mg; blister, 2x14 kom 8699540098718 2 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		3582/2009/12	29.06.2009 29.06.2014
(R)	1401921 film tableta; 300mg+12.5mg; blister, 2x14 kom 8699540098619 2 godine, u originalnom pakovanju	Cena:	-
		3581/2009/12	29.06.2009 29.06.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* (kod bolesnika čiji se krvni pritisak ne može adekvatno kontrolisati primenom samo irbesartana ili hidrohloriazida): 1 tabl. dnevno, sa ili bez hrane. Ne preporučuje se za bolesnike sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min).

CRESTOR® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija**rosuvastatin** - C10AA07**SREDSTVA KOJA SAMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104716 film tableta; 10mg; blister, 2x14 kom 5000455017771 3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage	Cena:	1716,80
		1525/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(R)	1104717 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom 5000455017795 3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage	Cena:	2595,20
		1527/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(R)	1104718 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom 5000455018532 3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage	Cena:	2513,70
		1528/2009/12	11.05.2009 11.05.2014

(R)	1104719 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom 5000455017818	Cena: 1526/2009/12	308,90 11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage		11.05.2014

Doziranje: *primarna hiperholesterolemija* (tip IIa uključujući i heterozigotnu porodičnu hiperholesterolemiju), *mešovita dislipidemija* (tip IIb), *homozigotna porodična hiperholesterolemija kada su nedovoljni efekti nefarmakoloških mera* (fizička aktivnost, smanjenje telesne težine): preporučena doza je 1 tabl. od 5mg ili 10mg jednom dnevno, u bilo koje doba dana, uz hranu ili bez nje. Ako je neophodno podešavanje doze, može se izvršiti posle 4 nedelje od početka terapije, maks. dnevna doza je 40mg. Kod starijih od 70 godina, preporučuje se doza od 5mg. Pedijatrijsko iskustvo je ograničeno na mali broj dece (uzrasta 8 i više godina) sa homozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom. Kontraindikovana je primena od bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom i onih sa aktivnim oboljenjem jetre.

EFEXIVA® - SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija

venlafaksin - N06AX16

PSIHOANALEPTICI

N06AX ostali antidepressivi

(R)	1072837 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg; blister, 4x7 kom 8606010891403	Cena: 867/2009/12	- 20.03.2009
	30 meseci, na temperaturi do 30°C		20.03.2014
(R)	1072838 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg; blister, 4x7 kom 8606010891366	Cena: 869/2009/12	- 20.03.2009
	30 meseci, na temperaturi do 30°		20.03.2014
(R)	1072839 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 4x7 kom 8606010891380	Cena: 868/2009/12	- 20.03.2009
	30 meseci, na temperaturi do 30°C		20.03.2014

Doziranje: *depresija* (velike depresivne epizode), *prevencija recidiva*: početna doza je 75 mg, jednom dnevno, može se povećati u intervalima od 2 nedelje ili više do maks. 375 mg/dan; *generalizovani anksiozni poremećaji* (GAD), *socijalni anksiozni poremećaj* (SAP): početna doza je 75 mg, jednom dnevno, može se povećati u intervalima od 2 nedelje ili više do maks. 225 mg/dan. Ukoliko je potrebno prekinuti terapiju, preporučuje se postepeno smanjivanje doze tokom perioda od najmanje 1-2 nedelje u cilju smanjivanja rizika od pojave apstinencijalnih reakcija. Kaps se uzimaju sa hranom, u isto vreme svakog dana. Kapsule treba progutati cele sa tečnošću, ne deliti ih, ne lomiti, ne žvakati, niti rastvarati. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.

EMINENS® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

ropinirol - N04BC04

ANTIPARKINSONICI

N04BC agonisti dopamina

(R)	1085345 film tableta; 0.25mg; bočica plastična, 1x210 kom 3850343044707	Cena: 2941/2009/12	- 01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014
(R)	1085346 film tableta; 1mg; bočica plastična, 1x21 kom 3850343044691	Cena: 2942/2009/12	- 01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014
(R)	1085347 film tableta; 2mg; bočica plastična, 1x21 kom 3850343044684	Cena: 2943/2009/12	- 01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *Parkinsonova bolest*: monoterapija 3 puta na po 0,25mg dnevno, tokom 1. nedelje, najbolje uz obrok; 2. nedelje 3 puta po 0,5mg dnevno; 3. nedelje 3 puta po 0,75mg dnevno; 4. nedelje 3 puta po 1mg dnevno, maks. 24mg dnevno; u kombinaciji sa levodopom: individualno, doza levodope se može postepeno smanjiti za približno 20%. Ne preporučuje se primena kod bolesnika sa teškim poremećajem funkcije bubrega (klirens kreatinina <30 mL/min) ili sa teškim poremećajem funkcije jetre.

ERBITUX® - MERCK KGaA - Nemačka**cetuximab** - L01XC06**ANTINEOPLASTICI****L01XC monoklonska antitela**

(SZ)	0039152 rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x100 mL 4027269078959	Cena: 100966,60 870/2009/12	20.03.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, ne zamrzavati		20.03.2014
(SZ)	0039153 rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x20 mL 4027269078942	Cena: 20608,10 871/2009/12	20.03.2009
	2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, ne zamrzavati		20.03.2014

Doziranje: *metastatski kolorektalni karcinom* (KRAS wild-type): u kombinaciji sa hemioterapijom ili kao monoterapija; *karcinom skvamoznih ćelija glave i vrata u kombinaciji sa radijacionom terapijom lokalno uznapredovale bolesti*; za rekurentna i/ili metastatska stanja primenjuje se u kombinaciji sa preparatima platine u hemioterapiji. Primenjuje se po protokolu, pod nadzorom lekara koji ima iskustva sa primenom antineoplastičnih lekova, jednom nedeljno, a početna doza je 400mg/m² telesne površine kao i.v. inf. Svaka sledeća nedeljna doza je 250mg/m² telesne površine. Maks. brzina infuzije ne sme biti veća od 10mg/min.

FASLODEX® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija**fulvestrant** - L02BA03**ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA****L02BA antiestrogeni**

(Z)	0039714 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 250mg/5mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x5 mL 5000455018372	Cena: 39400,10 1529/2009/12	11.05.2009
	4 godine, na temperaturi od 2° do 8° C (u frižideru), u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti		11.05.2014

Doziranje: *estrogen-zavisni karcinom dojke* (kod žena u menopauzi): svakog meseca jedna inj. od 250mg ubrizga se lagano u glutealni mišić.

GASTROPERIDON® - PHARMACIN B.V. - Holandija**domperidon** - A03FA03**LEKOVI ZA FUNKCIONALNE****GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE****A03FA propulzivi**

(R)	1124511 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8600101515315	Cena: - 1503/2009/12	11.05.2009
	3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage		11.05.2014

Doziranje: *ublažavanje simptoma mučnine i povraćanja, osećaja punoće u epigastrijumu, nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije želudačnog sadržaja odrasli i adolescenti* (stariji od 12 godina i telesne mase 35kg ili više): 3-4 puta dnevno po 1-2 tabl., maks. 80mg dnevno; *deca* 3-4 puta dnevno po 0.25-0.5mg/kg, maks. 2.4mg/kg. (ne više od 80mg dnevno).

GLICLADA® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija**gluklazid** - A10BB09**LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU****U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)****A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje**

(R)	1042066 tableta sa produženim oslobađanjem; 30mg; blister, 2x15 kom 3838989548650	Cena: - 2938/2009/12	01.06.2009
	2 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014
(R)	1042067 tableta sa produženim oslobađanjem; 30mg; blister, 4x15 kom 3838989548803	Cena: - 2937/2009/12	01.06.2009
	2 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014
(R)	1042068 tableta sa produženim oslobađanjem; 30mg; blister, 6x15 kom 3838989548810	Cena: - 2936/2009/12	01.06.2009
	2 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *diabetes mellitus* (tip 2): 30-120mg, ujutro uz doručak. Preporučuje se početna doza od 30mg dnevno; ukoliko je potrebno povećanje doze, interval između svakog povećanja doze mora biti najmanje 1 mesec, maks. doza je 120mg dnevno. Tableta (ili tablete) se proguta cela.

HALEA® - BELUPO, LJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska**sertralín** - N06AB06**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R) 1072639 film tableta; 50mg; blister, 2x15 kom

Cena: -

3850343028028

1491/2009/12 11.05.2009

3 godine, bez posebnih naznaka

11.05.2014

Doziranje: *depresija i opsesivno kompulzivni poremećaji:* odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno, uz obrok ili nezavisno od obroka, ujutro ili uveče; doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana, maks. 200mg dnevno; doza održavanja je 50-100mg. *Opsesivno kompulzivni poremećaji:* deca od 6-12 godina početna doza je 25mg dnevno; deca od 13-17 godina početna doza iznosi 50mg/dan; doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana, maks. 200mg dnevno. *Panični poremećaji, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i socijalna fobija:* započeti sa dozom 25mg na dan; ako je potrebno, dozu povećati posle nedelju dana na 50mg dnevno. Terapiju treba započeti pod nadzorom lekara specijaliste. Oprez pri primeni je potreban kod starijih osoba, kod pacijenata sa insuficijencijom jetre i bubrega i treba izbegavati nagli prekid primene.

HAVRIX® - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija**vakcina protiv žutice A****(inaktivisani celi virusi hepatitisa A) - J07BC02** **VAKCINE****J07BC vakcine protiv žutica (hepatitisa)**

(Z) 0011870 suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL;

bočica staklena, 1x0.5 mL

Cena: 1830,10

8606103683380

2672/2008/12 20.08.2008

3 godine, na temperaturi od +2 do +8°C

20.08.2013

(Z) 0011871 suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL;

napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL

Cena: 1830,10

8606103683397

2673/2008/12 20.08.2008

3 godine, na temperaturi od +2 do +8°C

20.08.2013

(Z) 0011872 suspenzija za injekciju; 1440El.j./mL;

napunjen injekcioni špric, 1x1 mL

Cena: 2449,20

8606103683410

2674/2008/12 20.08.2008

3 godine, na temperaturi od +2 do +8°C

20.08.2013

(Z) 0011873 suspenzija za injekciju; 1440El.j./mL;

bočica staklena, 1x1 mL

Cena: 2449,20

8606103683403

2675/2008/12 20.08.2008

3 godine, na temperaturi od +2 do +8°C

20.08.2013

Doziranje: *imunizaciju protiv infekcije izazvane Hepatitis A virusom* osoba koje se nalaze pod rizikom od izlaganja virusu hepatitisa A. Pojedinačna doza vakcine (1440 ELISA j/mL) namenjena je za vakcinaciju odraslih i starijih od 16. godine života. Pojedinačna doza vakcine (720 ELISA j/mL) namenjena je za vakcinaciju dece i adolescenata (od 1. do 15. godine), nakon koje sledi buster doza vakcine unutar perioda od 6-12 meseci nakon primene prve doze, a u cilju postizanja dugoročne zaštite. Primenjuje se isključivo i.m. putem, u deltoidni region, a kod veoma male dece, savetuje se primena vakcine u anterolateralni predeo butine. Mesto primene vakcine treba držati snažno pritisnuto, tokom najmanje 2 minuta, ne trljati.

INFANRIX® HEXA - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), hepatitisa B (rekombinantna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana - J07CA09 **VAKCINE**

J07CA bakterijske i virusne vakcine

(Z) 0011926 prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju;

(30i.j.+25mcg+40D.j.+8D.j.+32D.j.+25mcg+8mcg+10mcg+40i.j.+10mcg PRP/0.5mL i

Cena: -

20-40mcg T)/0.5mL; napunjen injekcioni špric i bočica, 1x0.5 mL

8606103683434

837/2009/12 20.03.2009

3 godine, na temperaturi 2°C do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati

20.03.2014

Doziranje: primarna i buster imunizacija dece protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, hepatitisa B, poliomijelitisa i oboljenja izazvanog *Haemophilus influenzae* tip b: primarna imunizacija sprovodi se po šemi od tri doze vakcine od 0,5 mL (prema šemi 2., 3., 4. mesec; 3., 4., 5. mesec; 2., 4., 6. mesec) ili dve doze (prema šemi 3., 5. mesec), putem duboke i.m. inj., uz preporuku da se svaka naredna doza vakcine primenjuje na različitom injekcionom mestu, u skladu sa nacionalnim preporukama. Neophodno je da doze vakcine budu primenjene u razmaku ne kraćem od mesec dana. Buster vakcinacija se sprovodi prema protokolu, zavisno od toga koja je šema primenjena, u skladu sa nacionalnim preporukama. Vakcina nije namenjena za primenu kod dece starije od 36. meseca života.

INTRATECT® - BIOTEST PHARMA GMBH - Nemačka

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu - J06BA02

IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI

J06BA imunoglobulini, nespecifični

(SZ)	0013600 rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x100 mL	Cena:	-
	4036124001094	2946/2009/12	01.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati, zaštićeno od svetlosti		
			01.06.2014
(SZ)	0013601 rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x200 mL	Cena:	-
	4036124001209	2947/2009/12	01.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati, zaštićeno od svetlosti		
			01.06.2014
(SZ)	0013602 rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x50 mL	Cena:	-
	4036124001001	2945/2009/12	01.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati, zaštićeno od svetlosti		
			01.06.2014

Doziranje: supstitucionna terapija (kongenitalna agamaglobulinemija i hipogamaglobulinemija, uobičajene i teške kombinovane imunodeficijencije, Wiskott Aldrich-ov sindrom), mijelomi i hronična limfocitna leukemija sa ozbiljnom sekundarnom hipogamaglobulinemijom i infekcijama koje se ponavljaju, kod dece sa kongenitalnim AIDS-om i rekurentnim infekcijama, imunomodulacija (idiopatska trombocitopenična purpura-ITP, kod dece ili odraslih sa visokim rizikom od krvarenja ili pre operacije za korekciju broja trombocita), alogene transplantacije kostne srži: doza i režim lečenja zavise od indikacije; primenjuje se samo i.v. inf. U supstitucionoj terapiji postoji potreba da se doziranje prilagodi individualno, svakom pacijentu zavisno od farmakokinetike i kliničkog odgovora na terapiju.

KABIVEN - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje - B05BA10

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI**

B05BA rastvori za parenteralnu ishranu

(SZ)	0171300 emulzija za infuziju;		
	190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L		
	+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L		
	+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 4x1026 mL (900 kcal)	Cena:	9449,90
	8606010925733	1293/2009/12	11.05.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati		
			11.05.2014
(SZ)	0171301 emulzija za infuziju;		
	190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L		
	+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L		
	+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 4x1540 mL (1400 kcal)	Cena:	11521,60
	8606010925740	1294/2009/12	11.05.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati		
			11.05.2014

- (SZ) 0171302 emulzija za infuziju;
 190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L
 +7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L
 +5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesica, 2x2566 mL (2300 kcal) **Cena:** 9078,20
 8606010925757 1295/2009/12 11.05.2009
 2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 11.05.2014

Doziranje: *totalna parenteralna ishrana:* individualno.

KABIVEN PERIPHERAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje - B05BA10

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRVII
I PERFUZIONI RASTVORI**

B05BA rastvori za parenteralnu ishranu

- (SZ) 0171303 emulzija za infuziju;
 110g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L
 +7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L
 +5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesica, 4x1440 mL (1000 kcal) **Cena:** 10813,70
 8606010925764 1297/2009/12 11.05.2009
 2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 11.05.2014
- (SZ) 0171304 emulzija za infuziju;
 110g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L
 +7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L
 +5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesica, 2x2400 mL (1700 kcal) **Cena:** 8384,60
 8606010925771 1296/2009/12 11.05.2009
 2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 11.05.2014

Doziranje: *totalna parenteralna ishrana:* individualno.

KEPPRA® - NEXTPHARMA SAS - Francuska

levetiracetam - N03AX14

ANTIEPILEPTICI

N03AX ostali antiepileptici

- (R) 3084823 oralni rastvor; 100mg/mL; bočica staklena, 1x300 mL **Cena:** -
 3837000096408 833/2009/12 01.04.2009
 2 godine, bez posebnih naznaka 01.04.2014

Doziranje: monoterapija kod *parcijalnih iznenadnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije* kod pacijenata iznad 16 godina starosti sa novo dijagnostifikovanim epilepsijom: početno 2 puta po 250mg dnevno uz povećanje na 2 puta po 500mg dnevno posle dve nedelje. Doza može biti dalje povećana za 250mg dva puta dnevno svake dve nedelje u zavisnosti od kliničkog odgovora, maks. 1500mg dva puta dnevno. Kao dodatna terapija: u *lečenju parcijalnih iznenadnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije* kod odraslih i dece iznad 4 godine, *miokloničkih napada* kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničkom epilepsijom, i *primarno generalizovanih toničko-kloničkih napada* kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom: odrasli (≥18 godina) i adolescenti (12-17 godina) težine 50kg ili više početno 2 puta po 500mg dnevno, doza se može povećavati do 2 puta po 1500mg dnevno, svake 2-4 nedelje. Deca starosti od 4-11 godina i adolescenti (12-17 godina) sa težinom manjom od 50 kg: početna terapijska doza je 2 puta po 10mg/kg dnevno. U zavisnosti od kliničkog odgovora i podnošljivosti, doza može biti povećana do 30mg/kg dva puta dnevno. Podešavanje doze se preporučuje kod starijih od 65 godina i onih sa oštećenom renalnom funkcijom.

KEPPRA® - UCB PHARMA SA - Belgija

levetiracetam - N03AX14

ANTIEPILEPTICI

N03AX ostali antiepileptici

- (R) 1084820 film tableta; 500mg; blister, 6x10 kom **Cena:** -
 3837000026474 836/2009/12 01.04.2009
 3 godine, bez posebnih naznaka 01.04.2014

(R)	1084821 film tableta; 250mg; blister, 6x10 kom 3837000026443 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena: 834/2009/12	- 01.04.2009 01.04.2014
(R)	1084822 film tableta; 1000mg; blister, 6x10 kom 3837000026504 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena: 835/2009/12	- 01.04.2009 01.04.2014

Doziranje: monoterapija kod parcijalnih iznenadnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije kod pacijenata iznad 16 godina starosti sa novo dijagnostifikovanom epilepsijom: početno 2 puta po 250mg dnevno uz povećanje na 2 puta po 500mg dnevno posle dve nedelje. Doza može biti dalje povećana za 250mg dva puta dnevno svake dve nedelje u zavisnosti od kliničkog odgovora, maks.1500mg dva puta dnevno. Kao dodatna terapija: u lečenju parcijalnih iznenadnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih i dece iznad 4 godine, miokloničkih napada kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničkom epilepsijom, i primarno generalizovanih toničko-kloničkih napada kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom: odrasli (≥18 godina) i adolescenti (12-17 godina) težine 50kg ili više početno 2 puta po 500mg dnevno, doza se može povećavati do 2 puta po 1500mg dnevno, svake 2-4 nedelje. Deca starosti od 4-11 godina i adolescenti (12-17 godina) sa težinom manjom od 50 kg: početna terapijska doza je 2 puta po 10mg/kg dnevno. U zavisnosti od kliničkog odgovora i podnošljivosti, doza može biti povećana do 30mg/kg dva puta dnevno. Podešavanje doze se preporučuje kod starijih od 65 godina i onih sa oštećenom renalnom funkcijom.

KIOVIG - BAXTER S.A. - Belgija

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu - J06BA02

IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI

J06BA imunoglobulini, nespecifični

(Z)	0013505 rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x100 mL 5413760287492 2 godine, na temperaturi od 2° do 8° C u frižideru	Cena: 1524/2009/12	64253,00 11.05.2009 11.05.2014
(Z)	0013506 rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x25 mL 8470006537060 2 godine, na temperaturi od 2° do 8° C u frižideru	Cena: 1522/2009/12	16063,20 11.05.2009 11.05.2014
(Z)	0013507 rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x50 mL 5413760287485 2 godine, na temperaturi od 2° do 8° C u frižideru	Cena: 1523/2009/12	32126,40 11.05.2009 11.05.2014

Doziranje: supstituciono terapija (kongenitalna agamaglobulinemija i hipogamaglobulinemija, uobičajene i teške kombinovane imunodeficijencije, Wiskott Aldrich-ov sindrom), mijelomi i hronična limfocitna leukemija sa ozbiljnom sekundarnom hipogamaglobulinemijom i infekcijama koje se ponavljaju, kod dece sa kongenitalnim AIDS-om i rekurentnim infekcijama, imunomodulacija (idiopatska trombocitopenična purpura-ITP kod dece ili odraslih sa visokim rizikom od krvarenja ili pre operacije za korekciju broja trombocita, Guillain Barré-ov sindrom, Kawasaki sindrom), alogene transplantacije kostne srži: doza i režim lečenja zavise od indikacije; primenjuje se samo kao i.v. inf. U supstitucionoj terapiji postoji potreba da se doziranje prilagodi individualno, svakom pacijentu zavisno od farmakokinetike i kliničkog odgovora na terapiju.

KLACID® - NI MEDIC D.O.O. - Srbija

klaritromicin - J01FA09

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVII ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01FA makrolidi

(R)	1325525 film tableta; 500mg; blister, 1x14 kom 8606010301414 3 godine, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti	Cena: 780/2009/12	874,80 04.03.2009 04.03.2014
-----	--	-----------------------------	------------------------------------

Doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa i lakša do umereno teška kontagiozna pneumonija), infekcije gornjeg respiratornog trakta (faringitis i akutni bakterijski sinuzitis), lakše do umereno teške infekcije kože i mekih tkiva (folikulitis, celulitis, erizipelas); odrasli i deca starija od 12 godina: uobičajeno, jedna tableta

dnevno, bez obzira na obroke. Kod jačih infekcija, doza se može povećati do dve tablete dnevno, 7-14 dana. Eradikacija H. pylori u kombinaciji sa drugim lekovima: prema protokolu.

LAMOTRAL® - GALENIKA AD - Srbija

lamotrigin - N03AX09

ANTIPILEPTICI

N03AX ostali antiepileptici

▲ (R)	1084825 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom 8608808107239 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		849/2009/12	20.03.2009
			20.03.2014
▲ (R)	1084826 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom 8608808107222 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		851/2009/12	20.03.2009
			20.03.2014
▲ (R)	1084827 tableta; 25mg; blister, 3x10 kom 8608808107215 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		850/2009/12	20.03.2009
			20.03.2014

Doziranje: *epilepsija* (dodatna ili monoterapija u lečenju parcijalnih napada, generalizovanih napada uključujući toničko-kloničke napade i napada udruženih sa Lennox-Gastaut-ovim sindromom): odrasli i deca uzrasta iznad 13 godina početno 25mg jednom dnevno, uz postepeno povećanje doze od 100-200mg/dan do maks. 500mg/dan; deca i adolescenti (2-12 godina) kao dodatna terapija u lečenju parcijalnih napada i generalizovanih napada uključujući toničko-kloničke napade i napade udružene sa Lennox-Gastaut-ovim sindromom: 0.15mg/kg dnevno uz postepeno povećanje doze od 1-5mg/kg dnevno, maks. 200mg dnevno. *Bipolarni poremećaji: odrasli stariji od 18 godina* (prevencija depresivnih epizoda kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem kod kojih predominiraju depresivne epizode) obično 12.5mg dnevno, uz postepeno povećanje doze do maks. 400mg dnevno, u zavisnosti od dodatne terapije.

LISINOPRIL H SANDOZ® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija

lizinopril, hidrohloriazid - C09BA03

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09BA inhibitori ACE i diuretici

(R)	1401910 tableta; 10mg+12.5mg; blister, 10x10 kom 8606010890925 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2926/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1401911 tableta; 10mg+12.5mg; blister, 3x10 kom 8606010890918 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2923/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1401912 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 10x10 kom 8606010890949 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2925/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1401913 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 3x10 kom 8606010890932 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2924/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija odrasli* 1 tabl. jednom dnevno, otprilike u isto vreme svakog dana; ako se željeni efekat ne postigne u periodu od 2-4 nedelje, doza se može povećati na 2 tabl. jednom dnevno. Lek se obično uvodi u terapiju posle pojedinačne i odvojene primene svake od aktivnih supstanci.

LOSAR PLUS® - GALENIKA AD - Srbija

losartan, hidrohloriazid - C09DA01

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici

(R)	1401914 film tableta; 50mg+12.5mg; blister, 3x10 kom 8608808107093 3 godine, na temperaturi do 30°C	Cena:	-
		2922/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* (kada se monoterapijom ne može postići zadovoljavajuća kontrola krvnog pritiska): odrasli, početna doza i doza održavanja za većinu bolesnika je 1 tabl.

dnevno, maks. 2 tabl., jednom dnevno; tabl. popiti sa čašom vode. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba; ne davati deci i trudnicama, bolesnicima sa težim stepenom oštećenja jetre i onima na dijalizi.

LOSARTIC® PLUS - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska**losartan, hidrohloriazid** - C09DA01**LEKOWI KOJI DELUJU****NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici**

(R)	1401915 film tableta; 50mg+12.5mg; blister, 2x14 kom	Cena:	-
	3850114216319	3583/2009/12	29.06.2009
	30 meseci, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage		29.06.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* (kada se monoterapijom ne može postići zadovoljavajuća kontrola krvnog pritiska): odrasli, početna doza i doza održavanja za većinu bolesnika je 1 tabl. dnevno, maks. 2 tabl., jednom dnevno; tabl. popiti sa čašom vode. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba; ne davati deci i trudnicama, bolesnicima sa težim stepenom oštećenja jetre i onima na dijalizi.

LOSAR® - GALENIKA AD - Srbija**losartan** - C09CA01**LEKOWI KOJI DELUJU****NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni**

(R)	1103594 film tableta; 50mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8608808107086	2921/2009/12	01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *esencijalna hipertenzija odrasli* početna doza i doza održavanja je 50mg jednom dnevno, ujutro; maks. 100mg jednom dnevno; *srčana slabost:* uobičajeno 12.5mg jednom dnevno, doza održavanja je 50mg jednom dnevno; *smanjenje rizika od moždanog udara kod pacijenata sa hipertenzijom uz hipertrofiju leve komore:* uobičajeno 50mg jednom dnevno. Efekat se može pojačati dodavanjem male doze hidrohloriazida i/li povećanjem doze leka na 100mg jednom dnevno. Kao antihipertenzivna terapija kod diabetes mellitusa-tip 2 udruženog sa bubrežnom bolesti (proteinurija $\geq 0.5g/dan$) inicijalna doza je 50mg jednom dnevno. Nakon mesec dana od početka terapije doza se može povećati na 100mg jednom dnevno, ako je potrebno.

MELOXAN - PHARMANOVA D.O.O. - Srbija**meloksikam** - M01AC06**ANTIINFLAMATORNI****I ANTIREUMATSKI PROIZVODI****M01AC oksikami**

(R)	1161108 tableta; 15mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606105713016	3636/2009/12	01.07.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.07.2014

Doziranje: *osteoartritis* (kratkotrajna simptomatska terapija): 7.5mg dnevno (pola tablete od 15mg); ukoliko ne dođe do poboljšanja, doza se može povećati na 15mg dnevno. *Reumatoidni artritis* (dugotrajna simptomatska terapija): 15mg dnevno. Preporučena doza za dugotrajnu primenu kod starijih osoba je 7.5mg dnevno. *Ankilozirajući spondilitis* (dugotrajna terapija): 15mg dnevno, maks. 15mg dnevno. Adolescenti i odrasli, maksimalna dnevna doza je 15 mg. Tabl. uzeti jednom dnevno sa vodom ili nekom drugom tečnošću, uz obrok. Kod bolesnika sa ozbiljnim renalnim oštećenjem koji su na dijalizi ili sa hepatičkim poremećajima, doza ne sme prelaziti 7.5mg na dan. Ne treba primenjivati kod dece mlađe od 15 godina.

METEOSPASYL - LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER - Francuska**alverin, simetikon** - A03AX58**LEKOWI ZA FUNKCIONALNE****GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE****A03AX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva**

(R)	1129931 kapsula, meka; 60mg+300mg; blister, 2x10 kom	Cena:	-
	3325406000361	2935/2009/12	01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *simptomatski tretman sindroma iritabilnog kolona*, posebno kada se karakteriše nadutošću od prisutnih gasova: 2-3 puta po 1 kaps. dnevno na početku obroka, ne duže od 4 nedelje kontinuirane primene.

MIPECID® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

imipenem, cilastatin - J01DH51

**ANTIBAKTERIJSKI LEKOWI
ZA SISTEMSKU PRIMENU**

J01DH karbapenemi

(SZ)	0029507 prašak za rastvor za infuziju; 500mg+500mg;	Cena:	-
	bočica staklena, 10x1000 mg	2944/2009/12	01.06.2009
	8606007082517		01.06.2014
	2 godine, bez posebnih naznaka		

Doziranje: *blage i srednje teške infekcije* (donjeg respiratornog trakta, kostiju i zglobova, kože i mekih tkiva, intraabdominalne, urogenitalne i ginekološke infekcije, septikemija), *mešovite infekcije izazvane osetljivim aerobnim i anaerobnim bakterijama*: odrasli uobičajena dnevna doza je 1-2g i.v. (računato na imipenem) podeljenih u 3-4 jednake doze, maks. 4g dnevno. Svaku dozu od 250-500mg treba primeniti putem i.v. inf. tokom 20-30 minuta, a dozu od 1000mg primeniti putem i.v. inf. tokom 40-60 minuta. Ukupna dnevna doza zavisi od tipa i ozbiljnosti infekcije, stepena osetljivosti patogena, funkcije bubrega i telesne težine; preporučene doze su zasnovane na telesnoj težini ≥ 70 kg. *Profilaktička primena* (postoperativne infekcije) kod odraslih: 1g i.v. po uvođenju u anesteziju i 1g tri sata nakon toga. Kod visoko rizičnih operacija (kolorektalnih), dve dodatne doze od 0.5g se mogu primeniti 8-16 sati nakon uvođenja u anesteziju; maks. doza ne treba da bude veća od 2g. Deca preko 40kg telesne težine treba da primaju doze za odrasle.

MIRTAZAPIN ODT SANDOZ® - SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija

mirtazapin - N06AX11

PSIHOANALEPTICI

N06AX ostali antidepressivi

(R)	1072742 oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606010891298	866/2009/12	20.03.2009
	21 mesec, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		20.03.2014
(R)	1072743 oralna disperzibilna tableta; 30mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606010891304	865/2009/12	20.03.2009
	21 mesec, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		20.03.2014
(R)	1072744 oralna disperzibilna tableta; 45mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606010891311	864/2009/12	20.03.2009
	21 mesec, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		20.03.2014

Doziranje: *depresija*: odrasli kao početnu dozu uzimaju uveče 1 tabl. pre odlaska na spavanje, najmanje 6 meseci . U zavisnosti od terapijskog efekta doza se može povećati do maks. 45mg dnevno u jednoj dozi pred spavanje ili podeljeno u dve pojedinačne doze.Tabl. se brzo rastvara pa se može progutati i bez vode. Ukoliko je potrebno, preporučuje se postepeno obustavljanje terapije sa mirtazapinom da bi se izbegla pojava apstinencijalnih simptoma. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

NEO-PENOTRAN® FORTE - EMBIL PHARMACEUTICAL CO. LTD - Turska

metronidazol, mikonazol - G01AF20

GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI

G01AF derivati imidazola

(R)	6137062 vagitorija; 750mg+200mg; blister, 1x7 kom	Cena:	-
	8600103492492	647/2009/12	23.02.2009
	2 godine, na temperaturi do 25° C		23.02.2014

Doziranje: *vaginalna kandidijaza* (bakterijskog i trihomonasom izazvanog vaginitisa), *mešovite vaginalne infekcije*: 1 vagitoriju uveče, staviti duboko u vaginu, tokom 7 dana; kod ponovljenih infekcija: 1 vagitoriju uveče i ujutro, staviti duboko u vaginu, tokom 14 dana.

NICORETTE® FRESHFRUIT - MCNEIL AB - Švedska

nikotin - N07BA01

**OSTALI LEKOVICI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM**

N07BA lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti

(BR)	9089100 lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 kom 8606102804908	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C	1514/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089101 lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 kom 8606102804823	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C	1515/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089102 lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 kom 8606102804830	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C	1513/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089103 lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom 8606102804915	Cena:	-
	2 godine, na temperaturi do 25°C	1511/2009/12	11.05.2009 11.05.2014

Doziranje: lečenje zavisnosti od nikotina i simptoma krize zbog prekida pušenja. *Prekid pušenja:* dužina lečenja je individualna, preporuka je da se lekovita guma koristi bar 3 meseca. Posle toga treba započeti postepeno odvikavanje; lečenje treba prekinuti kada se doza smanji na 1-2 lekovite gume na dan, ne kasnije od 6 meseci od početka lečenja. Odrasli i starije osobe: početno doziranje treba prilagoditi svakom posebno u odnosu na njegovu zavisnost od nikotina. Pušači male zavisnosti (≤ 20 cigareta/dan) treba da započnu lečenje sa 2mg. Pušači velike zavisnosti (> 20 cigareta/dan), ili oni koji nisu uspeali da prestanu sa pušenjem na dozi od 2mg, treba da započnu lečenje sa 4mg. Na početku lečenja jedna lekovita guma za žvakanje treba da se uzima svakih 2 sata, najčešće je dovoljno 8-12 lekovitih guma odgovarajuće jačine na dan. Ne treba uzimati više od 24 lekovite gume na dan. Mora se žvakati polako sa prekidima u trajanju od oko 30 minuta. Treba žvakati sve do pojave gorkog ukusa ili blagog pečenja jezika. Tada žvakanje treba prekinuti, a lekovitu gumu za žvakanje staviti u prostor između obraza i desni. Kada nestane gorak ukus, ili osećaj pečenja žvakanje se može nastaviti. Povremeno uzdržavanje od pušenja: tokom boravka u prostorijama u kojima se ne puši ili u situacijama kada se želi izbeći pušenje, a postoji potreba za njim (za produženje intervala bez cigareta), uzeti 1 lekovitu gumu za žvakanje. Upotreba lekovite gume za žvakanje duže od godinu dana se generalno ne preporučuje.

Uzimanje hrane i pića treba izbegavati za vreme žvakanja. Ne treba davati osobama mlađim od 18 godina bez preporuke lekara.

NICORETTE® FRESHMINT - MCNEIL AB - Švedska

nikotin - N07BA01

**OSTALI LEKOVICI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM**

N07BA lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti

(BR)	9089104 lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 kom 8606102804786	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi do 25°C	1512/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089105 lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 kom 8606102804861	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi do 25°C	1517/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089106 lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 kom 8606102804793	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi do 25°C	1516/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(BR)	9089107 lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom 8606102804878	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi do 25°C	1510/2009/12	11.05.2009 11.05.2014

Doziranje: Doziranje: lečenje zavisnosti od nikotina i simptoma krize zbog prekida pušenja. *Prekid pušenja:* dužina lečenja je individualna, preporuka je da se lekovita guma koristi bar 3 meseca. Posle toga treba započeti postepeno odvikavanje; lečenje treba prekinuti kada se doza smanji na 1-2 lekovite gume na dan, ne kasnije od 6 meseci od početka lečenja. Odrasli i starije

osobe: početno doziranje treba prilagoditi svakom posebno u odnosu na njegovu zavisnost od nikotina. Pušači male zavisnosti (≤ 20 cigareta/dan) treba da započnu lečenje sa 2mg. Pušači velike zavisnosti (> 20 cigareta/dan), ili oni koji nisu uspeali da prestanu sa pušenjem na dozi od 2mg, treba da započnu lečenje sa 4mg. Na početku lečenja jedna lekovita guma za žvakanje treba da se uzima svakih 2 sata, najčešće je dovoljno 8-12 lekovitih guma odgovarajuće jačine na dan. Ne treba uzimati više od 24 lekovite gume na dan. Mora se žvakati polako sa prekidima u trajanju od oko 30 minuta. Treba žvakati sve do pojave gorkog ukusa ili blagog pečenja jezika. Tada žvakanje treba prekinuti, a lekovitu gumu za žvakanje staviti u prostor između obraza i desni. Kada nestane gorak ukus, ili osećaj pečenja žvakanje se može nastaviti. Povremeno uzdržavanje od pušenja: tokom boravka u prostorijama u kojima se ne puši ili u situacijama kada se želi izbeći pušenje, a postoji potreba za njim (za produženje intervala bez cigareta), uzeti 1 lekovitu gumu za žvakanje. Upotreba lekovite gume za žvakanje duže od godinu dana se generalno ne preporučuje.

Uzimanje hrane i pića treba izbegavati za vreme žvakanja. Ne treba davati osobama mlađim od 18 godina bez preporuke lekara.

NICORETTE® MICROTAB LEMON - MCNEIL AB - Švedska

nikotin - N07BA01

**OSTALI LEKOVCI KOJI DELUJU
NA NERVNI SISTEM**

N07BA lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti

(BR)	9089108 sublingvalna tableta; 2mg; blister, 10x10 kom	Cena:	-
	8606102804816	1521/2009/12	11.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		11.05.2014
(BR)	9089109 sublingvalna tableta; 4mg; blister, 10x10 kom	Cena:	-
	8606102804854	1520/2009/12	11.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		11.05.2014
(BR)	9089110 sublingvalna tableta; 2mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606102804809	1518/2009/12	11.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		11.05.2014
(BR)	9089111 sublingvalna tableta; 4mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	8606102804847	1519/2009/12	11.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		11.05.2014

Doziranje: lečenje zavisnosti od nikotina i simptoma krize zbog prekida pušenja. Prekid pušenja: dužina lečenja je individualna, preporuka je da se sublingvalna tabl. koristi 2-3 meseca. Posle toga treba započeti postepeno odvikavanje; lečenje treba prekinuti kada se doza smanji na 1-2 tabl. na dan, ne kasnije od 6 meseci od početka lečenja. Odrasli i starije osobe: početno doziranje treba prilagoditi svakom posebno u odnosu na njegovu zavisnost od nikotina. Pušači male zavisnosti (≤ 20 cigareta/dan) treba da započnu lečenje sa 2mg. Pušači velike zavisnosti (> 20 cigareta/dan), ili oni koji nisu uspeali da prestanu sa pušenjem na dozi od 2mg, treba da započnu lečenje sa 4mg. Na početku lečenja jedna sublingvalna tabl. treba da se uzima svakih 1-2 sata, najčešće je dovoljno 8-12 dnevno. Sublingvalna tableta se stavlja ispod jezika kako bi se polako rastvorila (oko 30 minuta). Ne treba uzimati više od 30 tabl. od 2mg ili 15 tabl. od 4mg na dan. Povremeno uzdržavanje od pušenja: tokom boravka u prostorijama u kojima se ne puši ili u situacijama kada se želi izbeći pušenje, a postoji potreba za njim (za produženje intervala bez cigareta), koristiti subling. tabl. tokom perioda kada se ne puši. Koristi se i za *smanjenje potrebe za pušenjem* između dve cigarete, za produženje intervala bez cigareta, sa namerom da se smanji pušenje na najmanju moguću meru. Upotreba duže od godinu dana se ne preporučuje. Ne treba davati osobama mlađim od 18 godina bez preporuke lekara.

NORCURON® - ORGANON S.A. - Francuska

vekuronijum-bromid - M03AC03

MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03AC ostala kvaternerna amonijum jedinjenja

(SZ)	0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 4mg/mL;	Cena:	8840,30
	ampula sa rastvaračem u ampuli, 50x1 mL	2559/2009/12	06.05.2009
	8600103419239		
	3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno do svelosti		18.12.2012

Doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: individualno, prilagođeno svakom pacijentu. Standardna doza za izvođenje intubacije tokom rutinske anestezije kod odraslih i dece iznad 5 meseci je i.v. u obliku bolus inj. ili kao kontinuirana inf. od 0.08-0.1mg/kg telesne mase, zatim 0.02-0.03mg/kg telesne mase (održavanje efekta); kod novorođenčadi (do 4 nedelje), a verovatno i kod odojčadi do 4 meseca starosti, preporučuje se inicijalna doza od 0.01-0.02mg/kg telesne mase, uz povećanje po potrebi, dok se ne postigne depresija 90-95% odgovora kontrakcije mišića. U neonatalnoj hirurgiji ne treba da bude veća od 0.1mg/kg. Pri određivanju doze, u obzir treba uzeti metod anestezije, očekivano trajanje hirurške intervencije, moguću interakciju sa drugim lekovima, koji se primenjuju pre ili tokom anestezije, kao i opšte stanje pacijenta, a pod nadzorom iskusnog anesteziologa ili kliničara.

NORMOGIN - LABORATORI BALDACC S.P.A. - Italija

Liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus

(Lactobacillus rhamnosus) - G01AX..

GINEKOLOŠKI ANTIINFektivni I ANTISEPTICI

G01AX ostali antiinfektivni i antiseptici

(BR)	6137026 vaginalna tableta; 40mg; bočica staklena, 1x6 kom	Cena:	546,30
	8024785004017	1492/2009/12	11.05.2009
	3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C		11.05.2014

Doziranje: regeneracija fiziološke vaginalne flore, prevencija povratne bakterijske vaginoze (posle specifične antimikrobne terapije): 1-2 vagin. tabl. na dan, zavisno od težine kliničke slike; u težim slučajevima 2 vagin. tabl. na dan, 7 dana, nastavlja se sa 1 vagin. tabl. dnevno još najmanje 7 dana. Ne preporučuje se osobama ispod 18 godina.

OMEPRAZOL - REMEDICA LTD - Kipar

omeprazol - A02BC01

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

(R)	1122857 gastorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom	Cena:	-
	5290665002951	1271/2009/12	11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage		11.05.2014

Doziranje: ulkus duodenuma i želuca: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje, ili 8 nedelja (ulkus želuca); **refluksni ezofagitis:** 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; **prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja sluznice GIT:** 10mg dnevno; **Zollinger-Ellison-ov sindrom:** 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja); **dispepsija izazvana viškom želudačne kiseline:** uobičajeno doziranje je 10-20mg jednom dnevno, tokom 2-4 nedelje; **gastroduodenusni poremećaji uzrokovani NSAIL:** 20mg jednom dnevno, tokom 4 nedelje; **eradikacija Helicobacter pilory:** po protokolu zajedno sa antimikrobnim lekovima.

Deca preko jedne godine starosti i preko 10 kg telesne mase: refluksni ezofagitis, simptomatska terapija gorušice i regurgitacija kod gastroezofagusne refluksne bolesti prema protokolu.

Terapija i dozni režim kod dece starije od 4 godine zavise od indikacije, starosnog doba i telesne mase, a treba da se sprovedi pod nadzorom lekara specijaliste.

OMEX® - FARMAL D.D. - Hrvatska

omeprazol - A02BC01

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

(R)	1122933 gastorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 4x7 kom	Cena:	-
	3858881705647	3306/2009/12	12.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti		12.06.2014
(R)	1122934 gastorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom	Cena:	-
	3858881705630	3307/2009/12	12.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti		12.06.2014

Doziranje: ulkus duodenuma i želuca: 20mg (izuzetno 40mg) na prazan stomak, 1 sat pre obroka ili 2 sata posle obroka, tokom 4 nedelje, ili 8 nedelja (ulkus želuca); **refluksni ezofagitis:** 20mg dnevno tokom 4-8 nedelja, ukoliko je potrebno, dozu povećati na 40mg; **prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja sluznice GIT:** 10mg dnevno; **Zollinger-Ellison-ov sindrom:** 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza

održavanja); *dispepsija izazvana viškom želudačne kiseline*: uobičajeno doziranje je 10-20mg jednom dnevno, tokom 2-4 nedelje; *gastroduodenusni poremećaji uzrokovani NSAID*: 20mg jednom dnevno, tokom 4 nedelje; *eradikacija Helicobacter pilory*: po protokolu zajedno sa antimikrobnim lekovima.

Deca preko jedne godine starosti i preko 10 kg telesne mase; *refluksni ezofagitis, simptomatska terapija gorušice i regurgitacija kod gastroezofagusne refluksne bolesti* prema protokolu. Terapija i dozni režim kod dece starije od 4 godine zavise od indikacije, starosnog doba i telesne mase, a treba da se sprovodi pod nadzorom lekara specijaliste.

OSVAREN® - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka

kalcijum-acetat, magnezijum-karbonat - V03AE04

SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI

V03AE lekovi u terapiji hiperkalemije i hiperfosfatemije

(R) 1059231 film tableta; 435mg+235mg; kontejner za tablete, 1x180 kom **Cena:** -
4046241072716 2940/2009/12 01.06.2009
3 godine, u dobro zatvorenom kontejneru, u cilju zaštite od vlage 01.06.2014

Doziranje: *hiperfosfatemija u hroničnoj renalnoj insuficijenciji* (pacijenti na hemodijalizi i peritoneumskoj dijalizi) preporučena početna doza je 3 tabl. dnevno; ukoliko je potrebno, doza se može povećati na maks. 12 tabl. dnevno, u zavisnosti od nivoa fosfata u serumu. Tabl. uzimati samo uz obrok, sa tečnošću, ne treba lomiti ili žvakati. Ne preporučuje kod dece i adolescenata ispod 18 godina.

OXALIPLATIN PHARMASWISS - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

oksaliplatin - L01XA03

ANTINEOPLASTICI

L01XA jedinjenja platine

(SZ) 0031505 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica staklena, 1x100mg **Cena:** -
8606007082562 2948/2009/12 01.06.2009
30 meseci, bez posebnih naznaka 01.06.2014
(SZ) 0031506 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica staklena, 1x50mg **Cena:** -
8606007082555 2949/2009/12 01.06.2009
30 meseci, bez posebnih naznaka 01.06.2014

Doziranje: *adjuvantni tretman stadijuma III (Dukes-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora*, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to i.v. 85mg/m² telesne površine, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); *metastatski karcinom kolona*: 85mg/m² telesne površine i.v., ponovljeno svake 2 nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje.

PLANICID® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

teikoplanin - J01XA02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOWI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01XA glikopeptidni antibakterijski lekovi

(SZ) 0029051 prašak za rastvor za injekciju/infuziju;
200mg; bočica staklena, 10x200 mg **Cena:** -
8606007082616 3609/2009/12 29.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 29.06.2014
(SZ) 0029052 prašak za rastvor za injekciju/infuziju;
400mg; bočica staklena, 10x400 mg **Cena:** -
8606007082623 3608/2009/12 29.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 29.06.2014

Doziranje: *umerene infekcije kože i mekih tkiva, urinarnog trakta, infekcije donjeg respiratornog trakta* odrasli i stariji pacijenti sa normalnom funkcijom bubrega: početna doza je 400mg prvog dana i.v. ili i.m. inj.; doza održavanja je 200mg i.v. ili i.m. inj. dnevno; *teške infekcije zglobova i kostiju, septikemija, endokarditis* 400mg kao i.v. inj. na 12 sati (ukupno 3 inj.), doza održavanja je 400mg i.v. ili i.m. inj. dnevno; u *profilaksi* pojedinačna doza je 400mg

i.v. prilikom uvođenja u anesteziju. *Teške infekcije sa neutropenijom kod dece* preko 2 meseca starosti: preporučena doza je 10 mg/kg na 12 sati (prve 3 doze), nakon toga jednom dnevno pojedinačna doza 10mg/kg kao i.v. ili i.m. inj. Kod *umerenih infekcija* početna doza je 10mg/kg na 12 sati (prve 3 doze), nakon toga jednom dnevno pojedinačna doza od 6mg/kg kao i.v. ili i.m. inj. jednom dnevno. Kod novorođenčadi preporučena doza je 16mg/kg u jednoj dozi, a dalje dnevne doze su 8mg/kg. Kod odraslih sa insuficijencijom bubrega može biti potrebno korigovati doze.

PLASBUMIN®-20 - TALECRIS BIOTHERAPEUTICS GMBH - Nemačka
albumin, humani - B05AA01

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRV
I PERFUZIONI RASTVORI**
B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme

(Z)	0179185 rastvor za infuziju; 20%; bočica staklena, 1x100 mL	Cena:	-
	8606104090026	2917/2009/12	01.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, ne zamrzavati		01.06.2014
(Z)	0179186 rastvor za infuziju; 20%; bočica staklena, 1x50 mL	Cena:	-
	8606104090019	2916/2009/12	01.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, ne zamrzavati		01.06.2014

Doziranje: *hipoalbuminemija* (nefrotski sindrom, akutni edem, ciroza jetre, preeklampsija), *hipovolemija različitog porekla* (hemoragijski šok, za vreme operacija, posle porođaja), *gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području*, *teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom*: doziranje zavisi od indikacija i stanja bolesnika. Lek treba uvek davati i.v. inf. (nerazblažen, ili razblažen sa 0.9% rastvorom natrijum hlorida ili 5% rastvorom glukoze).

PROSTIN® E2 - SANICO N.V. - Belgija
dinoproston - G02AD02

OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOWI
G02AD prostaglandini

(SZ)	6143120 vaginalna tableta; 3mg; blister, 1x4 kom	Cena:	6027,30
	8606007411218	3367/2009/12	17.06.2009
	2 godine, na temperaturi od 2° C do 8 °C		11.01.2012

Doziranje: *indukcija porođaja i za završetak trudnoće*: obično 1 vagitorija, a po potrebi još 1 posle 6 sati; maks. 2 vaginalete.

PULMICORT® - ASTRAZENACA AB - Švedska
budesonid - R03BA02

**LEKOWI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUČNOJ BOLESTI**
R03BA glukokortikoidi

(R)	7114576 suspenzija za raspršivanje; 0.25mg/mL; ampula, 20x2 mL	Cena:	-
	7321839710872	2979/2009/12	03.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti		03.06.2014
(R)	7114577 suspenzija za raspršivanje; 0.5mg/mL; ampula, 20x2 mL	Cena:	-
	7321839710889	2980/2009/12	03.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti		03.06.2014
(R)	7114578 suspenzija za raspršivanje; 0.125mg/mL; ampula, 20x2 mL	Cena:	-
	7046263724331	2978/2009/12	03.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti		03.06.2014

Doziranje: *profilaksa bronhijalne astme*: doziranje je individualno. Kada je propisana dnevna doza od 1mg primenjuje se jednom dnevno, a može se primeniti 2 puta dnevno. Deca od 6 meseci i starija: početno 0,25-0,5mg dnevno, doza se može povećati do 1mg dnevno, doza održavanja 0,25-2,0mg dnevno; odrasli 1-2mg dnevno, doza održavanja 0,5-4,0mg dnevno. Lek se inhalira pomoću aparata - mlaznog raspršivača (nebulizator); može se primenjivati ujutru ili uveče.

SETALOFT® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**sertralin** - N06AB06**PSIHOANALEPTICI****N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina**

(R)	1072850 film tableta; 100mg; blister, 2x14 kom 8600064200334	Cena: 2435/2009/12	852,10 28.04.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		09.07.2012
(R)	1072851 film tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 8600064200327	Cena: 2434/2009/12	489,30 28.04.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		09.07.2012

Doziranje: *depresija*: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka, sa dosta tečnosti; doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana, do maks. od 200mg dnevno; doza održavanja je od 50 do 100mg; *opsesivno-kompulzivni simptomi*: odrasli i adolescenti (starosti 13-17 godina) 50mg dnevno ujutro ili uveče sa dosta tečnosti, doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje 7 dana do maks. 200mg dnevno.

SIMVABEL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**simvastatin** - C10AA01**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104710 film tableta; 10mg; blister, 1x28 kom 8600064201348	Cena: 1478/2009/12	343,80 11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		11.05.2014
(R)	1104711 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom 8600064201355	Cena: 1479/2009/12	531,00 11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		11.05.2014
(R)	1104712 film tableta; 40mg; blister, 2x14 kom 8600064201362	Cena: 1480/2009/12	854,20 11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju		11.05.2014

Doziranje: *hiperholesterolemija, porodična homozigotna hiperholesterolemija, kardiovaskularna prevencija (koronarna bolest), konkomitantna terapija*: raspon doziranja je 5-80mg dnevno, u jednoj dozi datoj uveče. Prilagodjavanje doziranja, ukoliko je neophodno, ide u intervalima ne manjim od 4 nedelje, do maks. 80mg dnevno. Doza od 80mg se preporučuje isključivo kod bolesnika sa teškom hiperholesterolemijom i ozbiljnim faktorima rizika za kardiovaskularne komplikacije.

SINDARABIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija**fludarabin** - L01BB05**ANTINEOPLASTICI****L01BB analozi purina**

(SZ)	0034801 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; bočica, 1x50 mg 5944720360035	Cena: 2939/2009/12	- 01.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 30°C		01.06.2014

Doziranje: *hronična limfocitna leukemija B ćelija*: odrasli: preporučena doza je 25mg/m² telesne površine i.v. dnevno, rastvaranjem u 2mL vode (1 mL rekonstituisanog rastvora sadrži 25mg fludarabin-fosfata), tokom 5 uzastopnih dana, svakih 28 dana, tokom 6 ciklusa. Za i.v. bolus inj. može se izvršiti razblaženje sa 10mL 0,9% rastvora natrijum-hlorida ili sa 100mL 0,9% rastvora natrijum-hlorida kao i.v. inf. tokom 30 minuta; primenjivati pod nadzorom specijaliste sa iskustvom u lečenju kancera. Trajanje terapije zavisi od uspešnosti terapije i tolerancije prema leku. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa oštećenjem jetre i/ili bubrega i kod starijih od 70 godina.

SKOPRYL PLUS® - ALKALOID AD - Makedonija**lizinopril, hidrohloriazid** - C09BA03**LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09BA inhibitori ACE i diuretici**

(R)	1401182 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 3x10 kom 5310001203887	Cena: 1493/2009/12	- 11.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		11.05.2014

Doziranje: *blaga do umerena hipertenzija*, kod bolesnika kod kojih je prikladna kombinovana terapija: Jednom dnevno po 1 tabl.; ako je potrebno, doza se može povećati na 2 tabl. jednom dnevno.

SPEDIFEN® 200 - ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska
ibuprofen - M01AE01

ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline

(BR)	3162145 granule za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x1 kom	Cena:	214,40
	8606103110060	2919/2009/12	01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *simptomatska terapija bola* (glavobolja, zubobolja, povišena telesna temperatura, primarna dismenoreja): odrasli i deca starija od 12 godina uzimaju 1 kesicu, ako je potrebno svakih 4-6h, maks.1200mg u toku 24h. Sadržaj kesice rastvoriti u čaši vode (200 mL) i odmah popiti, ne koristiti duže od 7 dana u kontinuitetu. Nije namenjen za upotrebu kod dece ispod 12 godina starosti.

SPEDIFEN® 400 - ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska
ibuprofen - M01AE01

ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline

(R)	3162146 granule za oralni rastvor; 400mg; kesica, 12x1 kom	Cena:	-
	8606103110046	2918/2009/12	01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014
(R)	3162147 granule za oralni rastvor; 400mg; kesica, 30x1 kom	Cena:	-
	8606103110039	2920/2009/12	01.06.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		01.06.2014

Doziranje: *simptomatska terapija bola* (glavobolja, zubobolja, povišena telesna temperatura, primarna dismenoreja): odrasli i deca starija od 12 godina uzimaju 1 kesicu, ako je potrebno svakih 4-6h, maks.1200mg u toku 24h. Sadržaj kesice rastvoriti u čaši vode (200 mL) i odmah popiti, ne koristiti duže od 7 dana u kontinuitetu. Nije namenjen za upotrebu kod dece ispod 12 godina starosti.

SPIRIVA® RESPIMAT® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
tiotropijum - R03BB04

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BB antiholinergici

(R)	7114732 rastvor za inhalaciju; 2.5mcg/potisak;		
	uložak i inhaler, 1x60 potisaka (30 doza)	Cena:	-
	8606103075093	854/2009/12	20.03.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati		20.03.2014

Doziranje: *hronična opstruktivna bolest pluća*: preporučena doza za odrasle je 5mcg putem inhalacije jednom dnevno, uvek u isto doba dana preko Respimat inhalera (2 potiska, odnosno udisaja inhalerom=1 doza). Bolesnika treba obučiti kako da koristi inhaler. Lek se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

STARCITIN® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
citalopram - N06AB04

PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

(R)	1072707 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom	Cena:	-
	3850114217217	2930/2009/12	01.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C		01.06.2014
(R)	1072708 film tableta; 40mg; blister, 2x14 kom	Cena:	-
	3850114217224	2931/2009/12	01.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C		01.06.2014

Doziranje: *depresija:* 20mg dnevno kao pojedinačna doza ujutro ili uveče, nezavisno od obroka; ako je potrebno, povećavati dozu do maks. 60mg dnevno; stariji bolesnici, maks. do 40mg dnevno. *Panični poremećaji* (sa ili bez agorafobije): početna doza 10mg dnevno, posle 7 dana povećati na 20mg dnevno, po potrebi povećati do maks. 60mg dnevno. Optimalna doza je 20-30mg dnevno; stariji bolesnici maks. 40mg dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.

SYNAGIS - ABBOTT S.R.L. - Italija

palivizumab - J06BB16

IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI

J06BB imunoglobulini, specifični

(SZ)	0013285 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL 8023813083253	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C. Ne zamrzavati.	3602/2009/12	29.06.2009
			29.06.2014
(SZ)	0013286 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 50mg; bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL 8023813083246	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C. Ne zamrzavati.	3603/2009/12	29.06.2009
			29.06.2014

Doziranje: *prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV)* kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja, a koja zahtevaju hospitalizaciju (deca rođena u 35 nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone, mlađa od 2 godine ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije, deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem): preporučena doza je 15mg/kg telesne težine i.m., najbolje u anterolateralni deo butine, jednom mesečno tokom perioda povećanog rizika od pojave RSV. Ukoliko je moguće, prvu dozu treba primeniti pre početka RSV sezone; naredne doze treba primenjivati jednom mesečno, tokom trajanja RSV sezone (obično 5 inj. tokom jedne sezone); davati uz primenu standardnih aseptičnih tehnika. Injekcije zapremine veće od 1mL treba davati u podeljenim dozama.

TAMIFLU® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska

oseltamivir - J05AH02

ANTIVIRUSNI LEKOWI

ZA SISTEMSKU PRIMENU

J05AH inhibitori neuraminidaze

(R)	1328121 kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x10 kom 8606103889348	Cena:	1030,40
	5 godina, bez posebnih naznaka	2967/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1328122 kapsula, tvrda; 45mg; blister, 1x10 kom 8606103889355	Cena:	2042,20
	5 godina, bez posebnih naznaka	2968/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014

Doziranje: *lečenje gripa:* kod starijih od godinu dana (infekcija influenza A virusom); terapiju započeti što je moguće pre, u roku od dva dana po pojavi simptoma gripa. Za adolescente (uzrasta 13-17 godina) i odrasle: preporučena doza je 75mg, dva puta dnevno, 5 dana. Za decu stariju od godinu dana i decu od 2-12 godina (do 40kg) preporučuje se korišćenje suspenzije. *Prevenција posle izlaganja:* za adolescente (uzrasta 13-17 godina) i odrasle: preporučena doza za prevenciju gripa posle bliskog kontakta sa inficiranom osobom je 75mg, jednom dnevno, 10 dana, u roku od dva dana posle kontakta sa inficiranom osobom. *Prevenција tokom epidemije gripa u zajednici:* preporučena doza je 75mg jednom dnevno, najviše 6 nedelja. Za one koji ne mogu da gutaju kapsule, sadržaj kaps. se pomeša sa malom količinom (maks. 1 k.kaš.) slatke tečnosti, soka ili mleka da bi se maskirao gorak ukus; progutati odmah nakon pripreme. Preporučuje se podešavanje doze za odrasle sa teškom bubrežnom insuficijencijom.

Lečenje i prevencija gripa treba da budu određeni na osnovu zvaničnih preporuka. Lek nije zamena za vakcinu protiv gripa.

TIRAMAT® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska**topiramet - N03AX11****ANTIPILEPTICI****N03AX ostali antiepileptici**

(R)	1084715 film tableta; 100mg; blister, 3x20 kom 3850343050227	Cena:	-
	3 godine, na temperaturi do 30°C	3600/2009/12	29.06.2009 29.06.2014
(R)	1084716 film tableta; 25mg; blister, 2x30 kom 3850343050241	Cena:	-
	3 godine, bez posebnih naznaka	3599/2009/12	29.06.2009 29.06.2014
(R)	1084717 film tableta; 50mg; blister, 2x30 kom 3850343050234	Cena:	-
	3 godine, bez posebnih naznaka	3598/2009/12	29.06.2009 29.06.2014

Doziranje: *epilepsija:* monoterapija odrasli i deca starija od 16 god. početna doza je 25mg uveče tokom prve nedelje, nezavisno od obroka, uz postepeno povećanje u intervalima od jedne do dve nedelje za po 25-50mg/dan, podeljeno u dve pojedinačne doze; maks. preporučena dnevna doza 400mg; deca od 6-16 god. početna doza je 0.5-1mg/kg uveče, tokom prve nedelje, uz postepeno povećanje u intervalima od 1-2 nedelje za po 0.5-1mg/kg/dan, podeljeno u dve pojedinačne doze; tabl. ne treba lomiti. Kombinovana terapija se sprovodi prema individualnom, kliničkom odgovoru i uz titiranje doze. *Migrena:* odrasli i deca starija od 16 god. započeti sa 25mg uveče tokom prve nedelje, nezavisno od obroka, uz postepeno povećanje u intervalima od 1-2 nedelje za po 25mg/dan; *profilaksa migrene:* odrasli i deca starija od 16 god. 50-100mg dnevno, podeljeno u dve pojedinačne doze.

VICTANYL® - ACINO AG - Nemačka**fentanil - N02AB03****ANALGETICI****N02AB derivati fenilpiperidina**

♣ (R)	9087200 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom 5690528173048	Cena:	-
	18 meseci, na temperaturi do 30°C	838/2009/12	20.03.2009 20.03.2014
♣ (R)	9087201 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom 5690528173017	Cena:	-
	18 meseci, na temperaturi do 30°C	840/2009/12	20.03.2009 20.03.2014
♣ (R)	9087202 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom 5690528173024	Cena:	-
	18 meseci, na temperaturi do 30°C	841/2009/12	20.03.2009 20.03.2014
♣ (R)	9087203 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom 5690528173031	Cena:	-
	18 meseci, na temperaturi do 30°C	839/2009/12	20.03.2009 20.03.2014

Doziranje: *jaki hronični bolovi:* kod bolesnika koji nisu primali snažne opijate, terapija se započinje najnižom dozom (25mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/parenteralno korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovnu potrebu za opijatom koji je do tada dat (TD flaster sa sadržajem fentanila i brzinom oslobađanja od 100mcg/h ima istu efikasnost kao 60mg morfina datog i.m. u dozi od 10mg u intervalima od 4h tokom perioda od 24h). Potrebnu dozu treba prilagoditi pacijentu i preispitivati u redovnim intervalima.

Način primene: Neposredno po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površinu na gornjem delu tela (grudi, leđa, nadlaktica). Na mesto na koje se flaster lepi ne smeju se nanositi kreme, ulja, losioni i puderi. Flaster treba menjati na svakih 72h, za svaku upotrebu mora se odabirati novo mesto na koži, a ista površina kože se može koristiti 7 dana nakon uklanjanja prethodnog flastera. Flaster se ne sme oštetiti, deliti ili rezati.

ZEMPLAR® - AESICA QUEENBOROUGH LTD - Velika Britanija**paricalcitol** - A11CC07**VITAMINI****A11CC vitamin D i analozi**

(R)	1050010 kapsula, meka; 2mcg; blister, 4x7 kom 5013158779518 2 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2932/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1050011 kapsula, meka; 4mcg; blister, 4x7 kom 5013158779525 2 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2934/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014
(R)	1050012 kapsula, meka; 1mcg; blister, 4x7 kom 5013158779501 2 godine, bez posebnih naznaka	Cena:	-
		2933/2009/12	01.06.2009
			01.06.2014

Doziranje: *sekundarni hiperparatireoidizam* kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom na dijalizi: individualno, po protokolu, u zavisnosti od nivoa paratireoidnog hormona.

ABECEDNI SPISAK REGISTROVANIH BILJNIH LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA I PARALELAMA

IBEROGAST® - STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH - Nemačka

cela sveža biljka divljeg renca, etanolni ekstrakt, koren anđelike, etanolni ekstrakt, list matičnjaka, etanolni ekstrakt, plod kima, etanolni ekstrakt, nadzemni deo ruse, etanolni ekstrakt, koren sladića, etanolni ekstrakt, cvet kamilice, etanolni ekstrakt, list nane, etanolni ekstrakt, plod gujine trave, etanolni ekstrakt - HA03A..

ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM

HA03A lekovi za funkcionalne poremećaje creva

(BR)	oralne kapi, rastvor; (15mL+10mL+10mL+10mL+10mL+10mL+20mL+5mL+10mL)/100mL; bočica staklena, 1x100 mL	Cena:	-
	4039581001980	734/2009/12	25.02.2009
(BR)	oralne kapi, rastvor; (15mL+10mL+10mL+10mL+10mL+10mL+20mL+5mL+10mL)/100mL; bočica staklena, 1x20 mL	Cena:	-
	4039581001966	732/2009/12	25.02.2009
(BR)	oralne kapi, rastvor; (15mL+10mL+10mL+10mL+10mL+10mL+20mL+5mL+10mL)/100mL; bočica staklena, 1x50 mL	Cena:	-
	4039581001973	733/2009/12	25.02.2009

Doziranje: funkcionalna dispepsija i sindrom iritabilnog creva odrasli i adolescenti 3 puta dnevno po 20 kapi; deca od 6-12 godina 3 puta dnevno po 15 kapi, samo uz lekarski recept. Dužina trajanja terapije zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka bolesti. Pre upotrebe dobro promućkati i kapi uzeti pre ili u toku jela sa nešto tečnosti. Primena tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje. Nakon prvog otvaranja bočice, može se čuvati još najmanje 8 nedelja.

TRADICIONALNI LEKOVI

HARPADOL - LABORATOIRES ARKOPHARMA - Francuska

koren đavolje kandže, prašak

(BR)	kapsula, tvrda; 435mg; bočica plastična, 1x45 kom	Cena:	-
	8606104116054	731/2009/12	25.02.2009
	5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		25.02.2014

ABECEDNI SPISAK INTERNACIONALNIH NEZAŠTIĆENIH NAZIVA FARMACEUTSKIH SUPSTANCI SA PRIPADAJUĆIM LEKOVIMA

Liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus)

vaginalno

NORMOGIN LABORATORI BALDACCI S.P.A. - Italija
vaginalna tableta; 40mg; bočica staklena, 1x6 kom

alverin, simetikon

oralno

METEOSPASMYL LABORATOIRES
MAYOLY SPINDLER - Francuska
kapsula, meka; 60mg+300mg; blister, 2x10 kom

domperidon

oralno

GASTROPERIDON® PHARMACIN B.V. - Holandija
tableta; 10mg; blister, 3x10 kom

fulvestrant

FASLODEX® ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
250mg/5mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x5 mL

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

parenteralno

INTRATECT®
BIOTEST PHARMA GMBH - Nemačka
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x50 mL
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x200 mL
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x100 mL

KIOVIG BAXTER S.A. - Belgija

rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x25 mL
rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x50 mL
rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x100 mL

irbesartan, hidrohloriazid

oralno

CO-IRDA® NOBELFARMA
ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
film tableta; 150mg+12.5mg; blister, 2x14 kom
film tableta; 300mg+12.5mg; blister, 2x14 kom

kalcijum-acetat, magnezijum-karbonat

oralno

OSVAREN® FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
film tableta; 435mg+235mg; kontejner za tablete, 1x180 kom

levetiracetam

oralno

KEPPRA® NEXTPHARMA SAS - Francuska
oralni rastvor; 100mg/mL; bočica staklena, 1x300 mL
KEPPRA® UCB PHARMA SA - Belgija
film tableta; 250mg; blister, 6x10 kom
film tableta; 500mg; blister, 6x10 kom
film tableta; 1000mg; blister, 6x10 kom

nikotin

sublingvalno/bukalno

NICORETTE® FRESHFRUIT MCNEIL AB - Švedska
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 kom
NICORETTE® FRESHMINT MCNEIL AB - Švedska
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 kom

NICORETTE®
MICROTAB LEMON MCNEIL AB - Švedska
sublingvalna tableta; 2mg; blister, 3x10 kom
sublingvalna tableta; 2mg; blister, 10x10 kom
sublingvalna tableta; 4mg; blister, 3x10 kom
sublingvalna tableta; 4mg; blister, 10x10 kom,

palivizumab

parenteralno

SYNAGIS ABBOTT S.R.L. - Italija
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 50mg;
bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg;
bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL

ranelinska kiselina (stroncijum ranelat)

oralno

BIVALOS® LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE - Francuska
granule za oralnu suspenziju; 2g; kesica, 28x2 g,

rosuvastatin

oralno

CRESTOR® ASTRAZENECA
UK LIMITED - Velika Britanija
film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom
film tableta; 10mg; blister, 2x14 kom
film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom
film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom

tocilizumab**parenteralno****ACTEMRA® ROCHE PHARMA AG - Nemačka**

koncentrat za rastvor za infuziju; 80mg/4mL;

bočica staklena, 1x4 mL

koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL;

bočica staklena, 1x10 mL

koncentrat za rastvor za infuziju; 400mg/20mL;

bočica staklena, 1x20 mL

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), hepatitis B (rekombinantna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana

INFANRIX® HEXA GLAXOSMITHKLINE**BIOLOGICALS S.A. - Belgija**

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju; (30i.j.+25mcg +40D.j.+8D.j.+32D.j.+25mcg+8mcg+10mcg+40i.j.+10mcg PRP/0.5mL i 20-40mcg T)/0.5mL; napunjen injekcioni špric i bočica, 1x0.5 mL

vakcina protiv žutice A, inaktivisani celi virusa hepatitis A

parenteralno**HAVRIX® GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija**

suspenzija za injekciju; 1440El.j./mL; napunjen injekcioni špric, 1x1 mL

suspenzija za injekciju; 1440El.j./mL; bočica staklena, 1x1 mL

suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL

suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL; bočica staklena, 1x0.5 mL

ABECEDNI SPISAK NEZAŠTIĆENIH NAZIVA BILJNIH LEKOVA

cela sveža biljka divljeg renca, etanolni ekstrakt, koren anđelike, etanolni ekstrakt, list matičnjaka, etanolni ekstrakt, plod kima, etanolni ekstrakt, nadzemni deo ruse, etanolni ekstrakt, koren sladića, etanolni ekstrakt, cvet kamilice, etanolni ekstrakt, list nane, etanolni ekstrakt, plod gujine trave, etanolni ekstrakt
oralno

IBEROGAST® STEIGERWALD

ARZNEIMITTELWERK GMBH - Nemačka

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+

10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml; bočica staklena, 1x20 ml

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+

10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml; bočica staklena, 1x50 ml

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+

10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml; bočica staklena, 1x100 ml

ABECEDNI SPISAK NOVOREGISTROVANIH LEKOVA KOJI SE MOGU IZDAVATI BEZ LEKARSKOG RECEPTA (BR)

CAFFETIN MENSTRUAL®

ALKALOID AD - Makedonija

film tableta; 200mg;

blister, 1x10 kom

HARPADOL LABORATOIRES

ARKOPHARMA - Francuska

kapsula, tvrda; 435mg;

bočica plastična, 1x45 kom

IBEROGAST® STEIGERWALD

ARZNEIMITTELWERK GMBH - Nemačka

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml;

bočica staklena, 1x20 ml

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml;

bočica staklena, 1x50 ml

oralne kapi, rastvor; (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml)/100ml;

bočica staklena, 1x100 ml

NICORETTE® FRESHFRUIT MCNEIL AB - Švedska

lekovita guma za žvakanje; 2mg;

blister, 7x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 2mg;

blister, 2x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 4mg;

blister, 7x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 4mg;

blister, 2x15 kom

NICORETTE® FRESHMINT MCNEIL AB - Švedska

lekovita guma za žvakanje; 2mg;

blister, 2x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 2mg;

blister, 7x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 4mg;

blister, 7x15 kom

lekovita guma za žvakanje; 4mg;

blister, 2x15 kom

NICORETTE® MICROTAB LEMON

MCNEIL AB - Švedska

sublingvalna tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

sublingvalna tableta; 2mg; blister, 10x10 kom

sublingvalna tableta; 4mg; blister, 3x10 kom

sublingvalna tableta; 4mg; blister, 10x10 kom

NORMOGIN LABORATORI

BALDACCI S.P.A. - Italija

vaginalna tableta; 40mg;

bočica staklena, 1x6 kom

SPEDIFEN® 200 ZAMBON

SWITZERLAND LTD - Švajcarska

granule za oralni rastvor; 200mg;

kesica, 20x1 kom

ABECEDNI SPISAK REGISTROVANIH LEKOVA SVRSTANIH U GRUPU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ČIJI SE PROMET KONTROLIŠE I KOJI IMAJU JAK UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI (§▲)

§▲ VICTANYL® (fentanil); ACINO AG - Nemačka

LEKOVI KOJI IMAJU JAK UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI, ZA VREME TERAPIJE NIJE DOZVOLJENO UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM, NITI RAD SA MAŠINOM (▲)

▲ LAMOTRAL® (lamotrigin); GALENIKA AD - Srbija

ANATOMSKO TERAPIJSKO HEMIJSKA KLASIFIKACIJA NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

A

ALIMENTARNI TRAKT I
METABOLIZAM (LEKOVI KOJI
DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG
SISTEMA I METABOLIZMA)

A03

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE
POREMEĆAJE

- A03A** lekovi za funkcionalne
poremećaje creva
- A03AX** drugi lekovi za funkcionalne
poremećaje creva

A03AX58 alverin, simetikon

oralno

METEOSPASMYL; LABORATOIRES MAYOLY
SPINDLER - Francuska

kapsula, meka; 60mg+300mg; blister, 2x10 kom

A03F propulzivi

A03FA propulzivi

A03FA03 domperidon

oralno

GASTROPERIDON®; PHARMACIN B.V. - Holandija

tableta; 10mg; blister, 3x10 kom

C

KARDIOVASKULARNI SISTEM
(LEKOVI KOJI DELUJU NA
KARDIOVASKULARNI SISTEM)

C10

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

C10A lekovi koji smanjuju nivo holesterola
i triglicerida

C10AA07 rosuvastatin

oralno

CRESTOR®;
ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija

film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom

film tableta; 10mg; blister, 2x14 kom

film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom

film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom,

G

GENITOURINARNI SISTEM I POLNI
HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE
GENITOURINARNOG SISTEMA
I POLNI HORMONI)

G01

GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI
I ANTISEPTICI

G01A antiinfektivi i antiseptici, isključujući
kombinacije sa kortikosteroidima

G01AF derivati imidazola

G01AF01 metronidazol

vaginalno

ARILIN® RAPID; DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO.
ARZNEIMITTEL - Nemačka

vagitorija; 1000mg; strip, 1x2 kom

G01AF20 metronidazol, mikonazol

vaginalno

NEO-PENOTRAN® FORTE;
EMBIL PHARMACEUTICAL CO. LTD - Turska

vagitorija; 750mg+200mg; blister, 1x7 kom

G01AX ostali antiinfektivi i antiseptici

G01AX.. Liofilizirana kultura izolovanog soja
Doederlein bacillus (Lactobacillus
rhamnosus)

vaginalno

NORMOGIN; LABORATORI BALDACCI S.P.A. - Italija
vaginalna tableta; 40mg; bočica staklena, 1x6 kom

G02

OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI

G02A preparati za kontrakciju uterusa

G02AD prostaglandini

G02AD02 dinoproston

vaginalno

PROSTIN® E2; SANICO N.V. - Belgija

vaginalna tableta; 3mg; blister, 1x4 kom

J

ANTIINFJEKTVNI LEKOVII ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVII ZA SISTEMSKU PRIMENU

**J01D ostali beta laktam
antibakterijski lekovi**

J01DH karbapenemi

J01DH51 imipenem, cilastatin
parenteralno

MIPECID®; PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
prašak za rastvor za infuziju; 500mg+500mg;
bočica staklena, 10x1000 mg

**J01F makrolidi, linkozamidi
i streptogramini**

J01FA makrolidi

J01FA09 klaritromicin
oralno

CLAREXID®; PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
film tableta; 250mg; blister, 1x14 kom
film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom

KLACID®; NI MEDIC D.O.O. - Srbija
film tableta; 500mg; blister, 1x14 kom

J01X ostali antibakterijski lekovi

**J01XA glikopeptidni antibakterijski
lekovi**

J01XA02 teikoplanin
parenteralno

PLANICID®; PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 200mg;
bočica staklena, 10x200 mg
prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 400mg;
bočica staklena, 10x400 mg

J05

ANTIVIRUSNI LEKOVII ZA SISTEMSKU PRIMENU

**J05A lekovi sa direktnim delovanjem
na viruse**

J05AH inhibitori neuraminidaze

J05AH02 oseltamivir
oralno

TAMIFLU®;
F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
kapsula, tvrda; 30mg; blister, 1x10 kom
kapsula, tvrda; 45mg; blister, 1x10 kom

J06

IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI

J06B imunoglobulini

J06BA imunoglobulini, nespecifični

**J06BA02 humani normalni imunoglobulin za
intravensku upotrebu**
parenteralno

INTRATECT®; BIOTEST PHARMA GMBH - Nemačka
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x50 mL
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x200 mL
rastvor za infuziju; 50mg/mL; bočica staklena, 1x100 mL

KIOVIG; BAXTER S.A. - Belgija
rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x25 mL
rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x50 mL
rastvor za infuziju; 10%; bočica staklena, 1x100 mL

J06BB imunoglobulini, specifični

J06BB16 palivizumab
parenteralno

SYNAGIS; ABBOTT S.R.L. - Italija
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 50mg;
bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg;
bočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1 mL

J07

VAKCINE

**J07C bakterijske i virusne vakcine,
kombinacije**

**J07CA bakterijske i virusne vakcine,
kombinacije**

**J07CA09 vakcina protiv difterije, tetanusa,
pertusisa (acelularna), hepatitisa
B (rekombinantna), poliomijelitisa
(inaktivisana) i Haemophilus
influenzae tip b (konjugovana,
adsorbovana), kombinovana**
parenteralno

INFANRIX® HEXA;
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju; (30i.j.+25mcg+
40D.j.+8D.j.+32D.j.+25mcg+8mcg+10mcg+40i.j.+
10mcg PRP/0.5mL i 20-40mcg T)/0.5mL; napunjen injekcioni
špric i bočica, 1x0.5 mL

J07B virusne vakcine

J07BC vakcine protiv žutice (hepatitisa)

**J07BC02 vakcina protiv žutice A
(inaktivisani celi virusi hepatitisa A)**
parenteralno

HAVRIX®;
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
suspenzija za injekciju; 1440EI.j./mL;
napunjen injekcioni špric, 1x1 mL
suspenzija za injekciju; 1440EI.j./mL; bočica staklena, 1x1 mL

suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL
suspenzija za injekciju; 720El.j./0.5mL;
bočica staklena, 1x0.5 mL,

L

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

L01

ANTINEOPLASTICI

L01B antimetaboliti

L01BB analogi purina

L01BB05 fludarabin

parenteralno

SINDARABIN*;

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; bočica, 1x50 mg

L01X ostali antineoplastici

L01XA jedinjenja platine

L01XA03 oksaliplatin

parenteralno

OXALIPLATIN PHARMASWISS;

PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica staklena, 1x50 mg

prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica staklena, 1x100 mg

L01XC monoklonska antitela

L01XC06 cetuksimab

parenteralno

ERBITUX*;

MERCK KGaA - Nemačka

rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x100 mL

rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x20 mL

L01XX ostali antineoplastici

L01XX32 bortezomib

parenteralno

VELCADE*;

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija

prašak za rastvor za injekciju; 1mg; bočica staklena, 1x1 mg

L02

ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA

L02B hormonski antagonisti i srodni lekovi

L02BA antiestrogeni

L02BA03 fulvestrant

parenteralno

FASLODEX*;

ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
250mg/5mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x5 mL

L04

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

L04A imunosupresivi

L04AC inhibitori interleukina

L04AC07 tocilizumab

parenteralno

ACTEMRA*;

ROCHE PHARMA AG - Nemačka

koncentrat za rastvor za infuziju; 80mg/4mL;

bočica staklena, 1x4 mL

koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL;

bočica staklena, 1x10 mL

koncentrat za rastvor za infuziju; 400mg/20mL;

bočica staklena, 1x20 mL,

M

MIŠIČNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIČNO- KOSTNOG SISTEMA)

M01

ANTIINFLAMATORNI I ANTIUREMATSKI PROIZVODI

M01A nesteroidni antiinflamatorni i
antireumatski proizvodi

M01AC oksikami

M01AC06 meloksikam

oralno

MELOXAN; PHARMANOVA D.O.O. - Srbija

tableta; 15mg; blister, 3x10 kom

M01AE derivati propionske kiseline

M01AE01 ibuprofen

oralno

CAFFETIN MENSTRUAL*;

ALKALOID AD - Makedonija

film tableta; 200mg; blister, 1x10 kom

SPEDIFEN* 200;

ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska

granule za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x1 kom

SPEDIFEN* 400;

ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska

granule za oralni rastvor; 400mg; kesica, 12x1 kom

granule za oralni rastvor; 400mg; kesica, 30x1 kom

M03

MIŠIČNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A miorelaksansi sa perifernim
delovanjem

M03AC ostala kvaternerna amonijum
jedinjenja

M03AC03 vekuronijum-bromid

parenteralno

NORCURON*;

ORGANON S.A. - Francuska
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula sa
rastvaračem u ampuli, 50x1 mL

M05 LEKOVU U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTJU

M05B lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju

M05BX ostali lekovi koji utiču na mineralizaciju kostiju

M05BX03 ranelinska kiselina (stroncijum ranelat)

oralno

BIVALOS[®]; LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska

granule za oralnu suspenziju; 2g; kesica, 28x2 g,

N

NERVNI SISTEM (LEKOVU KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)

N02 ANALGETICI

N02A opioidi

N02AB derivati fenilpiperidina

N02AB03 fentanil

lokalno

VICTANYL[®]; ACINO AG - Nemačka

transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom

transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom

N03 ANTIEPILEPTICI

N03A antiepileptici

N03AF derivati karboksamida

N03AF01 karbamazepin

oralno

CARBAMAZEPINE-RETARD; REMEDICA LTD - Kipar

tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400mg;

blister, 3x10 kom

N03AX ostali antiepileptici

N03AX09 lamotrigin

oralno

LAMOTRAL[®]; GALENIKA AD - Srbija

tableta; 25mg; blister, 3x10 kom

tableta; 50mg; blister, 3x10 kom

tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

N03AX11 topiramat

oralno

TIRAMAT[®];

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

film tableta; 25mg; blister, 2x30 kom

film tableta; 50mg; blister, 2x30 kom

film tableta; 100mg; blister, 3x20 kom

N03AX14 levetiracetam

oralno

KEPPRA[®]; NEXTPHARMA SAS - Francuska

oralni rastvor; 100mg/mL; bočica staklena, 1x300 mL

KEPPRA[®]; UCB PHARMA SA - Belgija

film tableta; 250mg; blister, 6x10 kom

film tableta; 500mg; blister, 6x10 kom

film tableta; 1000mg; blister, 6x10 kom

N04 ANTIPARKINSONICI

N04B dopaminergički lekovi

N04BC agonisti dopamina

N04BC04 ropinirol

oralno

EMINENS[®];

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

film tableta; 0.25mg; bočica plastična, 1x210 kom

film tableta; 1mg; bočica plastična, 1x21 kom

film tableta; 2mg; bočica plastična, 1x21 kom

N06 PSIHOANALEPTICI

N06A antidepresivi

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

N06AB04 citalopram

oralno

STARCITIN[®]; PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska

film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom

film tableta; 40mg; blister, 2x14 kom

N06AB06 sertralin

oralno

ASENTRA[®]; SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

film tableta; 50mg; blister, 4x7 kom

film tableta; 100mg; blister, 4x7 kom

HALEA[®];

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

film tableta; 50mg; blister, 2x15 kom

SETALOFF[®]; ZDRAVLJE A.D. - Srbija

film tableta; 50mg; blister, 2x14 kom

film tableta; 100mg; blister, 2x14 kom

N06AX ostali antidepresivi

N06AX11 mirtazapin

oralno

MIRTAZAPIN ODT SANDOZ[®];

SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija

oralna disperzibilna tableta; 15mg; blister, 3x10 kom

oralna disperzibilna tableta; 30mg; blister, 3x10 kom

oralna disperzibilna tableta; 45mg; blister, 3x10 kom

N06AX16 venlafaksin**oralno**

EFEXIVA®; SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg;
blister, 4x7 komkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg;
blister, 4x7 komkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg;
blister, 4x7 kom**N07****OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM****N07B lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti****N07BA lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti****N07BA01 nikotin****sublingvalno/bukalno**

NICORETTE® FRESHFRUIT; MCNEIL AB - Švedska

lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 komlekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 kom

NICORETTE® FRESHMINT; MCNEIL AB - Švedska

lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 2x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 2mg; blister, 7x15 komlekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 7x15 kom
lekovita guma za žvakanje; 4mg; blister, 2x15 komNICORETTE® MICROTAB LEMON;
MCNEIL AB - Švedska

sublingvalna tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

sublingvalna tableta; 2mg; blister, 10x10 kom

sublingvalna tableta; 4mg; blister, 3x10 kom

sublingvalna tableta; 4mg; blister, 10x10 kom,

R**RESPIRATORNI SISTEM
(LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI
RESPIRATORNOG SISTEMA)****R03****LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI****R03B ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni****R03BA glukokortikoidi****R03BA02 budesonid****inhalaciono**

PULMICORT®; ASTRAZENACA AB - Švedska

suspenzija za raspršivanje; 0.5mg/mL; ampula, 20x2 mL

suspenzija za raspršivanje; 0.25mg/mL; ampula, 20x2 mL

suspenzija za raspršivanje; 0.125mg/mL; ampula, 20x2 mL

R03BB antiholinergici**R03BB04 tiotropijum-bromid****inhalaciono**SPIRIVA® RESPIMAT®; BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačkarastvor za inhalaciju; 2.5mcg/potisak; uložak i inhaler,
1x60 potisaka (30 doza),**V****OSTALO****V03****SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI****V03A svi ostali terapijski proizvodi****V03AE lekovi u terapiji hiperkalijemije i hiperfosfatemije****V03AE04 kalcijum-acetat,
magnezijum-karbonat****oralno**OSVAREN®; FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka

film tableta; 435mg+235mg; kontejner za tablete, 1x180 kom

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZVRŠENA OBNOVA REGISTRACIJE SA PRIPADAJUĆIM EAN KÔDOM

ACETISAL PH 8® - GALENIKA AD - Srbija

acetilsalicilna kiselina

(Z)	film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom 8608808103019	2987/2009/12	04.06.2009
-----	--	--------------	------------

AMINOSTERIL N-HEPA 8% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija

izoleucin, leucin, lizin, metionin, acetilcistein, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, glicin, alanin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina

(SZ)	rastvor za infuziju; 10.4g/L+13.09g/L+6.88g/L+1.1g/L+0.7g/L+0.88g/L+4.4g/L+0.7g/L+10.08g/L+10.72g/L+2.8g/L+5.82g/L+4.64g/L+5.73g/L+2.24g/L+4.42g/L; boca staklena, 10x500 mL 8606010925351	3261/2009/12	09.06.2009
------	--	--------------	------------

AMIODARON - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

amjodaron

(R)	tableta; 200mg; blister, 6x10 kom 8600064100115	2636/2009/12	13.05.2009
-----	--	--------------	------------

APAUURIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

diazepam

(R)	tableta; 10mg; blister, 2x15 kom 3838989567132	2627/2009/12	13.05.2009
(R)	obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom 8600097200141	2626/2009/12	13.05.2009
(R)	obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom 3838989567125	2629/2009/12	13.05.2009

AQUA PRO INJECTIONE - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija

voda za injekcije

(BR)	rastvarač za parenteralnu upotrebu; 10mL; ampula, 50x10 mL 8608811000343	2452/2009/12	30.04.2009
------	---	--------------	------------

ATENOLOL - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija

atenolol

(R)	tableta; 100mg; blister, 1x14 kom 8608811006123	3756/2009/12	08.07.2009
-----	--	--------------	------------

AVAXIM® 160 U - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska

vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, adsorbovana)

(Z)	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 160Antigen j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL 3660053139040	2986/2009/12	04.06.2009
-----	---	--------------	------------

AZOT SUBOKSID - MESSER TEHNOGAS A.D. - Srbija

azot-suboksid

▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x5 kg 8606103795489	3355/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x30 kg 8606103795564	3354/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x8 kg 8606103795519	3350/2009/12	17.06.2009

▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x2 kg 8606103795472	3351/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x185 kg 8606103795588	3352/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x25 kg 8606103795540	3353/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x17 kg 8606103795533	3348/2009/12	17.06.2009
▲ (SZ)	medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x6 kg 8606103795496	3349/2009/12	17.06.2009

**BALANCE 1.5% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA - FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

(SZ)	rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000 mL 4046241073829	726/2009/12	25.02.2009
------	---	-------------	------------

**BALANCE 2.3% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA - FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

(SZ)	rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2000 mL 4046241073843	727/2009/12	25.02.2009
------	--	-------------	------------

**BALANCE 4.25% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA - FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

(SZ)	rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2000 mL 4046241073867	728/2009/12	25.02.2009
------	---	-------------	------------

BARALGETAS® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija

pitofenon, fempiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

△ (R)	tableta; 5mg+0.1mg+500mg; blister, 1x10 kom 8608811004525	2990/2009/12	04.06.2009
-------	--	--------------	------------

BARALGIN M® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija

metamizol-natrijum

△ (Z)	tableta; 500mg; blister, 50x10 kom 8608811003542	2639/2009/12	13.05.2009
△ (R)	tableta; 500mg; blister, 1x10 kom 8608811003559	2638/2009/12	13.05.2009

BROMOKRIPTIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

bromokriptin

(R)	tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8600064111517	67/2009/12	11.05.2009
(R)	tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8600064111500	66/2009/12	11.05.2009

CALGEL® - GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska

lidokain, cetilpiridinijum-hlorid

(BR)	gel za desni; 0.33%+0.1%; tuba, 1x10 g 8606103683687	3757/2009/12	08.07.2009
------	---	--------------	------------

CAPD 17 STAY SAFE® - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza**

- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L;
kesa, 4x2000 mL
4046241002355 671/2009/12 23.02.2009
- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L;
kesa, 4x2500 mL
4046241073522 672/2009/12 23.02.2009

CAPD 18 STAY SAFE® - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza**

- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+42.5g/L;
kesa, 4x2000 mL
4046241002430 673/2009/12 23.02.2009
- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+42.5g/L;
kesa, 4x2500 mL
4046241074130 674/2009/12 23.02.2009

CAPD 19 STAY SAFE® - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka**natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza**

- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L;
kesa, 4x2500 mL
4046241073546 676/2009/12 23.02.2009
- (SZ) rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L;
kesa, 4x2000 mL
4046241002515 675/2009/12 23.02.2009

CARBOPLATIN „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**karboplatin**

- (SZ) koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/15mL; bočica staklena, 1x15 mL
9088881314271 2706/2009/12 19.05.2009
- (SZ) koncentrat za rastvor za infuziju; 450mg/45mL; bočica staklena, 1x45 mL
9088881314288 2707/2009/12 19.05.2009

CEDAX - S.I.F.I. S.P.A. - Italija**cefibuten**

- (R) kapsula, tvrda; 400mg; strip, 2x2 kom + 1x1 kom
8606103170057 1407/2009/12 14.04.2009
- (R) prašak za oralnu suspenziju; 36mg/mL; bočica staklena, 1x30 mL
8606103170064 1408/2009/12 14.04.2009
- (R) prašak za oralnu suspenziju; 36mg/mL; bočica staklena, 1x60 mL
8606103170071 1406/2009/12 14.04.2009

CIPRALEX® - H. LUNDBECK A/S - Danska**escitalopram**

- (R) film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom
8606103574190 875/2009/12 19.03.2009
- (R) film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom
8606103574213 874/2009/12 19.03.2009
- (R) film tableta; 10mg; blister, 2x14 kom
8606403574206 873/2009/12 19.03.2009
- (R) film tableta; 10mg; blister, 1x14 kom
8606103574183 872/2009/12 19.03.2009

CISPLATIN „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**cisplatin**

(SZ)	koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/20mL; bočica staklena, 1x20 mL	9088881046431	3763/2009/12	08.07.2009
(SZ)	koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/100mL; bočica staklena, 1x100 mL	9088881046455	3764/2009/12	08.07.2009

DEFRINOL® FORTE - GALENIKA AD - Srbija**pseudoefedrin, ibuprofen**

(R)	film tableta; 60mg+400mg; kontejner za tablete, 1x20 kom	8608808105952	2637/2009/12	13.05.2009
-----	--	---------------	--------------	------------

DIAZEPAM - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija**diazepam**

△ (R)	tableta; 2mg; blister, 3x10 kom	8608811006291	2513/2009/12	04.05.2009
△ (R)	tableta; 5mg; blister, 3x10 kom	8608811006307	2453/2009/12	30.04.2009

DOVICIN® - GALENIKA AD - Srbija**doksiciklin**

(R)	kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x5 kom	8608808104443	2989/2009/12	04.06.2009
-----	---	---------------	--------------	------------

DOXI-HEM - HEMOFARM AD - Srbija**kalcijum-dobesilat**

(R)	kapsula, tvrda; 500mg; blister, 3x10 kom	8600097002783	10/2009/12	13.01.2009
-----	--	---------------	------------	------------

DUROGESIC® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija**fentanil**

♣ (R)	transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1 kom	8606102804038	1467/2009/12	22.04.2009
♣ (R)	transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1 kom	8606102804021	1466/2009/12	22.04.2009
♣ (R)	transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1 kom	8606102804052	1465/2009/12	22.04.2009

FEBRICET - HEMOFARM AD - Srbija**paracetamol**

(Z)	tableta; 500mg; strip, 50x10 kom	8600097400220	2991/2009/12	04.06.2009
-----	----------------------------------	---------------	--------------	------------

FENTANYL - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija**fentanil**

♣ (Z)	rastvor za injekciju; 0.1mg/2mL; ampula, 50x2 mL	8606102804328	797/2009/12	09.03.2009
-------	--	---------------	-------------	------------

FORCAS® - HEMOFARM AD - Srbija**ceftazidim**

(Z)	prašak za rastvor za injekciju; 1000mg; bočica staklena, 1x1000 mg	8600097301442	58/2009/12	19.05.2009
(Z)	prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica staklena, 1x500 mg	8600097011532	57/2009/12	19.05.2009

GEOKORTON® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska**hidrokortizon, oksitetraciklin**

(R) mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20 g
3850114223003 2703/2009/12 19.05.2009

GINKOR FORT® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska**trokserutin, list ginka, suvi standardizovani ekstrakt, heptaminol**

(BR) kapsula, tvrda; 300mg+14mg+300mg; blister, 3x10 kom
3582183043212 2867/2009/12 27.05.2009

HEMOMYCIN - HEMOFARM AD - Srbija**azitromicin**

(R) prašak za oralnu suspenziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x20 mL
8600097011945 3754/2009/12 08.07.2009

HUMULIN® M3 - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska**insulin humani**

(R) suspenzija za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3 mL
8606007080902 668/2009/12 23.02.2009

HUMULIN® NPH - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska**insulin humani**

(R) suspenzija za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3 mL
8606007080896 669/2009/12 23.02.2009

HUMULIN® R - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska**insulin humani**

(R) rastvor za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3 mL
8606007080889 670/2009/12 23.02.2009

INTRALIPID - FRESENIUS KABI AB - Švedska**ulje soje**

(SZ) emulzija za infuziju; 20%; plastična kesa, 10x100 mL
8606010925832 2866/2009/12 27.05.2009

INTRALIPID - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija**ulje soje**

(SZ) emulzija za infuziju; 20%; boca staklena, 10x100 mL
8606010925825 2865/2009/12 27.05.2009

KABIVEN - FRESENIUS KABI AB - Švedska

glukoza, alanin, arginin, aspartanski kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

(SZ) emulzija za infuziju; 190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 4x1540 mL (1400 kcal)
8606010925399 1462/2009/12 11.05.2009

(SZ) emulzija za infuziju; 190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 2x2566 mL (2300 kcal)
8606010925412 1460/2009/12 11.05.2009

(SZ) emulzija za infuziju; 190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 4x1026 mL (900 kcal)
8606010925375 1461/2009/12 11.05.2009

KABIVEN PERIPHERAL - FRESENIUS KABI AB - Švedska

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

- (SZ) emulzija za infuziju; 110g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesha, 2x2400 mL (1700 kcal)
8606010925450 1463/2009/12 11.05.2009
- (SZ) emulzija za infuziju; 110g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesha, 4x1440 mL (1000 kcal)
8606010925436 1464/2009/12 11.05.2009

LENDORMIN® - BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE - Francuska**brotizolam**

- ▲ (R) tableta; 0.25mg; blister, 1x10 kom
8606103075130 2700/2009/12 19.05.2009

LEXAURIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija**bromazepam**

- ▲ (R) tableta; 6mg; blister, 2x15 kom
3838989617677 3761/2009/12 08.07.2009
- ▲ (R) tableta; 1.5mg; blister, 2x15 kom
3838989617653 3760/2009/12 08.07.2009
- ▲ (R) tableta; 3mg; blister, 2x15 kom
3838989617660 3762/2009/12 08.07.2009

LIDOKAIN-HLORID - GALENIKA AD - Srbija**lidokain**

- (R) gel; 2%; tuba, 1x30 g
8608808105686 2701/2009/12 19.05.2009

LIDOKAIN-HLORID 2% - GALENIKA AD - Srbija**lidokain**

- (Z) rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 50x2 mL
8608808104184 2702/2009/12 19.05.2009

MEGACE® - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska**megestrol**

- (R) oralna suspenzija; 40mg/mL; boca plastična, 1x240 mL
8606007081619 2871/2009/12 27.05.2009

METHOTREXAT „EBEWE“ - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**metotreksat**

- (SZ) koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x5 mL
9088882427833 2864/2009/12 27.05.2009
- (SZR) tableta; 2.5mg; kontejner za tablete, 1x50 kom
9088881314783 1468/2009/12 22.04.2009
- (SZ) rastvor za injekciju/infuziju; 10mg/mL; bočica staklena, 1x1 mL
9088881287414 1489/2009/12 11.05.2009
- (SZ) rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/5mL; bočica staklena, 1x5 mL
9088881286196 1490/2009/12 11.05.2009
- (SZ) koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 100mg/mL; bočica staklena, 1x10 mL
9088880727553 2863/2009/12 27.05.2009

MONOPRIL® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija**fosinopril**

(R)	tableta; 20mg; blister, 2x14 kom 8606007080704	2977/2009/12	03.06.2009
(R)	tableta; 10mg; blister, 2x14 kom 8606007080698	2976/2009/12	03.06.2009

NATRIJUM PIKOSULFAT - ZDRAVLJE A.D. - Srbija**natrijum-pikosulfat**

(R)	obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8600064101891	2705/2009/12	19.05.2009
-----	---	--------------	------------

NATRIUMBICARBONAT „FRESENIUS“ 8.4% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija**natrijum-hidrogenkarbonat**

(SZ)	koncentrat za rastvor za infuziju; 8.4%; bočica, 10x100 mL 8606010925627	3259/2009/12	09.06.2009
------	---	--------------	------------

OCTENISEPT® - SCHULKE & MAYER GMBH - Nemačka**oktenidin, fenoksietanol**

(BR)	rastvor za kožu; 1mg/g+20mg/g; boca plastična, 1x1000 mL 4032651214587	3629/2009/12	30.06.2009
(BR)	rastvor za kožu; 1mg/g+20mg/g; boca plastična, 1x50 mL 4032651214358	3631/2009/12	30.06.2009
(BR)	rastvor za kožu; 1mg/g+20mg/g; boca plastična, 1x250 mL 4032651214570	3630/2009/12	30.06.2009

OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija**butamirat**

(R)	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 20mg; blister, 1x10 kom 8600097011761	2624/2009/12	13.05.2009
(R)	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778	24/2009/12	16.01.2009

ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**ondansetron**

(SZ)	rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 5x2 mL 8605000800166	3459/2009/12	26.06.2009
------	--	--------------	------------

PTU® - ALKALOID AD - Makedonija**propiltiouracil**

(R)	tableta; 100mg; blister, 3x15 kom 5310001205102	2631/2009/12	13.05.2009
-----	--	--------------	------------

RANITIDIN - GALENIKA AD - Srbija**ranitidin**

(R)	film tableta; 150mg; blister, 2x10 kom 8608808106065	2988/2009/12	04.06.2009
-----	---	--------------	------------

RAPAMUNE® - WYETH MEDICA IRELAND - Irska**sirolimus**

(SZR)	obložena tableta; 1mg; blister, 3x10 kom 8606007080391	3732/2009/12	07.07.2009
-------	---	--------------	------------

RAPAMUNE® - WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija**sirolimus**

(SZR) obložena tableta; 1mg; blister, 3x10 kom 8606007080490 3731/2009/12 07.07.2009

RISPOLEPT® CONSTA® - CILAG LTD - Švajcarska**risperidon**

- ▲ (SZR) prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 50mg/2mL; bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1x2 mL
8606102804410 1159/2009/12 01.04.2009
- ▲ (SZR) prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 25mg/2mL; bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1x2 mL
8606102804397 1157/2009/12 01.04.2009
- ▲ (SZR) prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 37.5mg/2mL; bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1x2 mL
8606102804403 1158/2009/12 01.04.2009

RISSAR® - ALKALOID AD - Makedonija**risperidon**

- ▲ (R) film tableta; 3mg; blister, 2x10 kom
5310001205096 1327/2009/12 09.04.2009
- ▲ (R) film tableta; 2mg; blister, 2x10 kom
5310001205089 1326/2009/12 09.04.2009

SEDACORON® - EBWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija**amjodaron**

(R) tableta; 200mg; blister, 5x10 kom 9088880750780 3344/2009/12 15.06.2009

SEROXAT® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska**paroksetin**

(R) film tableta; 20mg; blister, 3x10 kom 8606103683151 3382/2009/12 22.06.2009

SEROXAT® - SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS - Velika Britanija**paroksetin**

(R) film tableta; 20mg; blister, 3x10 kom 8606103683854 3380/2009/12 22.06.2009

SMECTA® - BEAUFOR IPSEN INDUSTRIE - Francuska**diosmektit**

(BR) prašak za oralnu suspenziju; 3g; kesica, 10x1 kom 3582181923004 513/2009/12 17.02.2009

SODIUM CHLORIDE - FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. - Italija**natrijum-hlorid**

(Z) rastvor za infuziju; 9g/L; boca staklena, 49x100 mL 8606010925504 3614/2009/12 30.06.2009

STAMARIL® - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska**vakcina protiv žute groznice (živa, atenuirana)**

(Z) prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1000LD 50/0.5mL; bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1x0.5 mL 3660053105267 1399/2009/12 13.04.2009

TAMIFLU® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska**oseltamivir**

- (R) prašak za oralnu suspenziju; 12mg/mL; boca staklena, 1x30 g
8606102767753 2704/2009/12 19.05.2009

TARGOCID® - GRUPPO LEPETIT S.P.A. - Italija**teikoplanin**

- (SZ) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 200mg/3mL;
libočica sa rastvaračem u ampuli, 1x3 mL
3582910015482 1328/2009/12 09.04.2009
- (SZ) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 400mg/3mL;
libočica sa rastvaračem u ampuli, 1x3 mL
3582910015499 1329/2009/12 09.04.2009

TAXOTERE® - AVENTIS PHARMA LTD - Velika Britanija**docetaksel**

- (SZ) koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju; 20mg/0.5mL;
bočica sa rastvaračem u bočici, 1x1.5 mL
8600097400251 1422/2009/12 16.04.2009
- (SZ) koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju; 80mg/2mL;
bočica sa rastvaračem u bočici, 1x6 mL
8600097400275 1421/2009/12 16.04.2009

TEFOR® - GALENIKA AD - Srbija**metformin**

- (R) film tableta; 500mg; blister, 3x10 kom
8608808105617 3770/2009/12 08.07.2009

TETRAZEPAM-MIP - CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH - Nemačka**tetrazepam**

- ▲ (R) tableta; 50mg; blister, 2x10 kom
9120018570041 2625/2009/12 13.05.2009

TOLYCAR® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija**cefotaksim**

- (SZ) prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1g; bočica staklena, 1x1 g
8608811002620 3784/2009/12 09.07.2009
- (SZ) prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 0.5g; bočica staklena, 1x0.5 g
8608811002613 3786/2009/12 09.07.2009
- (SZ) prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 2g; bočica staklena, 1x2 g
8608811002637 3785/2009/12 09.07.2009

TRENTAL® 400 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija**pentoksifilin**

- (R) tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom
8608811002736 1088/2009/12 11.05.2009

TRILEPTAL® - NOVARTIS FARMA S.P.A. - Italija**okskarbazepin**

- ▲ (R) film tableta; 600mg; blister, 5x10 kom
8606103543653 2870/2009/12 27.05.2009
- ▲ (R) film tableta; 300mg; blister, 5x10 kom
8606103543646 2869/2009/12 27.05.2009

TRILEPTAL® - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska**okskarbazepin**

- | | | | |
|-------|---|--------------|------------|
| ▲ (R) | film tableta; 300mg; blister, 5x10 kom
8606103543783 | 2876/2009/12 | 27.05.2009 |
| ▲ (R) | film tableta; 600mg; blister, 5x10 kom
8606103543790 | 2877/2009/12 | 27.05.2009 |

TRIPACEL™ - SANOFI PASTEUR LIMITED - Kanada**vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularna), adsorbovana**

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (Z) | suspencija za injekciju; (10mcg+5mcg+5mcg+3mcg+30i.j.+40i.j.)/0.5mL;
bočica staklena, 5x0.5 mL
0697177004339 | 3861/2009/12 | 14.07.2009 |
| (Z) | suspencija za injekciju; (10mcg+5mcg+5mcg+3mcg+30i.j.+40i.j.)/0.5mL;
bočica staklena, 1x0.5 mL
0697177004322 | 3862/2009/12 | 14.07.2009 |

TURGANIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija**tiaprofenska kiselina**

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (R) | tableta; 300mg; blister, 2x10 kom
8608811002811 | 1488/2009/12 | 11.05.2009 |
|-----|--|--------------|------------|

ULTIVA® - GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija**remifentaniil**

- | | | | |
|----------|--|--------------|------------|
| § ▲ (SZ) | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg; bočica staklena, 5x1 mg
8606103683533 | 2874/2009/12 | 27.05.2009 |
| § ▲ (SZ) | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg; bočica staklena, 5x2 mg
8606103683557 | 2873/2009/12 | 27.05.2009 |

ULTIVA® - GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A. - Italija**remifentaniil**

- | | | | |
|----------|--|--------------|------------|
| § ▲ (SZ) | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg; bočica staklena, 5x2 mg
8606103683564 | 2875/2009/12 | 27.05.2009 |
| § ▲ (SZ) | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg; bočica staklena, 5x1 mg
8606103683540 | 2872/2009/12 | 27.05.2009 |

VERAPAMIL - HEMOFARM AD - Srbija**verapamil**

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (R) | film tableta; 80mg; blister, 5x10 kom
8600097401302 | 2633/2009/12 | 13.05.2009 |
| (R) | film tableta; 40mg; blister, 3x10 kom
8600097401296 | 2632/2009/12 | 13.05.2009 |

VERORAB® - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska**vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabies)**

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (Z) | prašak i rastvarač za suspenciju za injekciju; 2.5i.j./0.5mL;
bočica sa rastvaračem u ampuli, 5x0.5 mL
3660053084494 | 3275/2009/12 | 11.06.2009 |
|-----|--|--------------|------------|

VIRAMUNE® - BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E. - Grčka**nevirapin**

- | | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| (R) | tableta; 200mg; blister, 6x10 kom
8606103075444 | 3368/2009/12 | 06.02.2006 |
|-----|--|--------------|------------|

VODA ZA INJEKCIJE - GALENIKA AD - Srbija**voda za injekcije**

(BR) rastvarač za parenteralnu upotrebu; 5mL; ampula, 50x5 mL
8608808100155

2634/2009/12 13.05.2009

XELODA® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska**kapecitabin**

△ (R) film tableta; 500mg; blister, 12x10 kom
8606102767951

1400/2009/12 13.04.2009

△ (R) film tableta; 150mg; blister, 6x10 kom
8606102767944

1401/2009/12 13.04.2009

ZAVEDOS® - ACTAVIS ITALIA S.P.A - Italija**idarubicin**

(SZ) kapsula, tvrda; 5mg; bočica staklena, 1x1 kom
4034541008023

18/2009/12 16.01.2009

(SZ) liofilizat za rastvor za injekciju; 10mg; bočica staklena, 1x1 kom
4034541008016

19/2009/12 16.01.2009

ABECEDNI SPISAK LEKOVA ZA KOJE SU IZDATA REŠENJA O PRESTANKU VAŽNOSTI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET

BONVIVA® - ROCHE D.O.O. - Srbija ibandronska kiselina (R) film tableta; 2.5mg; blister, 2x14 kom	515-04-5132/03 od 01.07.2004	3276/2009/12 od 01.07.2009
CORDIPIN® XL - KRKA D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija nifedipin (R) film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom	515-04-234/03 od 05.03.2004	2912/2009/12 od 25.05.2009
EVRA - JOHNSON & JOHNSON S.E. INC. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija norelgestromin, etinilestradiol (R) transdermalni flaster; 6mg/20cm ² +600mcg/20cm ² ; kesica, 3x1 kom (R) transdermalni flaster; 6mg/20cm ² +600mcg/20cm ² ; kesica, 3x3 kom	515-04-03271/04 od 28.09.2004 515-04-03271-1 od 28.09.2004	440/2009/12 od 19.02.2009 441/2009/12 od 19.02.2009
KOGENATE® BAYER - BAYER D.O.O. - Srbija oktokog alfa (SZ) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 1000i.j./2.5mL; libočica sa rastvaračem u špricu sa adapterom za bočicu, 1x2.5 mL (SZ)prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 250i.j./2.5mL; libočica sa rastvaračem u špricu sa adapterom za bočicu, 1x2.5 mL (SZ) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500i.j./2.5mL; libočica sa rastvaračem u špricu sa adapterom za bočicu, 1x2.5 mL	2632/2008/12 od 20.08.2008 2633/2008/12 od 20.08.2008 2634/2008/12 od 20.08.2008	3366/2009/12 od 18.06.2009 3364/2009/12 od 18.06.2009 3365/2009/12 od 18.06.2009
RAPTIVA® - MERCK D.O.O. - Srbija efalizumab (R) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg/mL; libočica i rastvor u špricu, 1x1.3 mL (R) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg/mL; libočica i rastvor u špricu, 4x1.3 mL	99/2006/12 od 31.01.2006 100/2006/12 od 31.01.2006	2993/2009/12 od 04.06.2009 2992/2009/12 od 04.06.2009

PROMENE NAZIVA PROIZVODJAČA

dosadašnji naziv: LABORATORIOS BELMAC S.A., Španija
novi naziv: ZDRAVLJE A.D., Srbija
 LANSOBEL gastorozistentne kapsule, tvrde, 28 po 15mg
 gastorozistentne kapsule, tvrde, 28 po 30mg
 varijacija važi od: 22.04.2009.

dosadašnji naziv: Wulfing Pharma GmbH, Nemačka
novi naziv: Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka
 DOPAMIN ADMEDA 50 konc. za rastvor za inf. 5 po 50mg/5mL
 DOPAMIN ADMEDA 250 konc. za rastvor za inf. 1 po 250mg/50mL
 varijacija važi od: 25.05.2009.

dosadašnji naziv: Wulfing Pharma GmbH, Nemačka
novi naziv: Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka
 DOBUTAMIN ADMEDA 250 konc. za rastvor za inf. 1 po 250mg/50mL
 varijacija važi od: 25.05.2009.

PROMENE ADRESE I DRUGIH PODATAKA NOSIOCA DOZVOLE

MITER International d.o.o.
 11000 Beograd, Resavska 16
 Telefon/fax: 011 303 78 41
 Mob. tel. 063 316 428, 063 324 415
 miter@sbb.rs

WORWAG PHARMA GMBH&CO.KG – PREDSTAVNIŠTVO
umesto: Ljermontova 12, Beograd
treba: Zahumska 23 a/1, Beograd

KOREKCIJE U NACIONALNOM REGISTRU LEKOVA 2009

POLYGYNAX - INNOTHERA CHOUZY, Francuska

nistatin, neomicin, polimiksin b - G01AA51
 (R) 6137312 vaginalna kapsula, meka; 100000i.j.+35000i.j.+35000i.j.; blister, 2x6 kom

3400970000968

umesto: 2142/2008/12 27.05.2008

treba: 2142/2008/12 24.07.2008

PROMENE PO OSNOVU VARIJACIJA

(izmene proizvođača i naziva leka, nove doze, oblici, pakovanja, nove indikacije, uslovi čuvanja, EAN)

AMBROKSOL sirup 100mL, (15mg/5mL) – Hemofarm AD, Srbija

promena režima izdavanja leka, Sažetka karakteristika leka, Uputstva za pacijenta:

umesto: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

treba: Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

Lek se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporuci lekara.

Varijacija važi od 16.09.2009 godine

AMPRILO - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU

NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

C09AA inhibitori ACE, monokomponentni

(R)	1103251 tableta; 1.25mg; blister, 4x7 kom 3838989517298 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 222,20 3243/2009/12 09.06.2009 05.04.2011
(R)	1103255 tableta; 2.5mg; blister, 4x7 kom 3838989517328 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 271,60 3244/2009/12 09.06.2009 05.04.2011
(R)	1103259 tableta; 5mg; blister, 4x7 kom 3838989517380 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 388,00 3245/2009/12 09.06.2009 05.04.2011
(R)	1103263 tableta; 10mg; blister, 4x7 kom 3838989517434 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 500,60 3246/2009/12 09.06.2009 05.04.2011

ASENTRA® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

sertralin - N06AB06

PSIHOANALEPTICI

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

(R)	1072635 film tableta; 50mg; blister, 4x7 kom 3838989503017 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 489,30 3025/2009/12 08.06.2009 15.08.2010
(R)	1072636 film tableta; 100mg; blister, 4x7 kom 3838989503079 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 582,10 3026/2009/12 08.06.2009 15.08.2010 05.04.2011

ATORIS® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

atorvastatin - C10AA05

SREDSTVA KOJA SMANJUJU

LIPEDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze

(R)	1104520 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 3838989502836 2 godine, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece	Cena: 900,20 3266/2009/12 10.06.2009 15.08.2010
(R)	1104522 film tableta; 20mg; blister, 3x10 kom 3838989502850 2 godine, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece	Cena: 1462,50 3269/2009/12 10.06.2009 15.08.2010

AQUARIUS šampon 2%, 60mL-DEMO S.A., Grčka

Varijacija tipa II:S-CTD-MODUL 1:

promena režima izdavanja leka:

umesto: Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

treba: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

Varijacija važi od 10.07.2009 godine

CLOZAPIN HEXAL tablete, 50 po 100mg – Salutas Pharma GmbH, Nemačka

Varijacija tipa II: S-CTD-MODUL 3:

Prihvata se promena izgleda tablete:

umesto: okrugla tableta, svetložute boje sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom C100 na drugoj strani

uvodi se: okrugla tableta, svetložute boje sa po dve podeone crte sa obe strane tablete.

Varijacija važi od 14.05.2009 godine

CORYOL® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

karvedilol - C07AG02

**BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA**

C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora

(R)	1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 3 godine, na temperaturi do 30°C, van domašaja dece	Cena: 3346/2009/12	232,70 01.06.2009 26.10.2010
(R)	1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 3 godine, na temperaturi do 30°C, van domašaja dece	Cena: 3347/2009/12	285,60 01.06.2009 26.10.2010

DEFRINOL forte film tablete, 20 po (60mg+400mg) – Galenika AD, Srbija

Varijacija tipa IB:S: izmena uslova čuvanja leka

umesto: na temperaturi od 15-30°C, zaštićeno od vlage i svetlosti

uvodi se: na temperaturi do 30°C

varijacija važi od: 19.05.2009.

DICLAC® - SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka

diklofenak - M01AB05

**ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI**

M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance

(R)	0162900 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 5x3 mL 8606010891205 5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti	Cena: 2494/2009/12	112,20 30.04.2009 24.12.2012
(R)	0162901 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 50x3 mL 8606010891274 5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti	Cena: 2490/2009/12	840,40 30.04.2009 24.12.2012

FEMOZOL film tablete, 30 po 2.5mg – Pharmaswiss D.O.O., Srbija

Varijacija tipa IB:S: izmena roka upotrebe leka

Varijacija tipa II:S-CTD-MODUL 3: produženje roka upotrebe leka

umesto: 18 meseci

prihvata se: 3 godine

varijacija važi od: 16.04.2009.

FLAVAMED– Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Nemačka

tablete 10 po 30mg

oralni rastvor 100mL (15mg/5mL)

oralni rastvor 60mL (15mg/5mL)

Varijacija tipa II:S-CTD-MODUL 1: promena režima izdavanja leka:

umesto: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

treba: Lek se može izdavati i bez recepta

varijacija važi od: 28.08.2009.

FROMILID® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**klaritromicin** - J01FA09**ANTIBAKTERIJSKI LEKOV
ZA SISTEMSKU PRIMENU****J01FA makrolidi**

(R)	1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283	Cena:	736,70
	3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, van domašaja dece	3270/2009/12	10.06.2009 28.09.2009

FROMILID UNO – Krka, Slovenija

tabl. sa produženim oslobađanjem, 14 po 500mg
tablete sa produženim oslobađanjem, 7 po 500mg
tablete sa produženim oslobađanjem, 10 po 500mg
tablete sa produženim oslobađanjem, 14 po 250mg
tablete sa produženim oslobađanjem, 5 po 500mg
Varijacija tipa II:S-izmene u II delu dokumentacije
Prihvata se uvođenje novog idejnog rešenja spoljnog i unutrašnjeg pakovanja za lek
varijacija važi od: 05.05.2009.

3FROMILID® UNO - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**klaritromicin** - J01FA09**ANTIBAKTERIJSKI LEKOV
ZA SISTEMSKU PRIMENU****J01FA makrolidi**

(R)	1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom 3838989501365	Cena:	532,60
	2 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju	3268/2009/12	10.06.2009 17.08.2010
(R)	1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989501389	Cena:	1249,10
	2 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju	3267/2009/12	10.06.2009 22.11.2010

KLINDAMICIN (klindamicin) – Hemofarm AD, Srbija

0326041 rastvor za injekciju; 300mg/2mL; ampula, 10x2mL
8600097011242

930/2008/12 od 05.03.2008

umesto: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept**treba:** Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi**LANSOBEL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija****lansoprazol** - A02BC03**LEKOV ZA POREMEĆAJE ACIDITETA****A02BC inhibitori protonске pumpe**

(R)	1122910 gastorozistentna kapsula, tvrda; 15mg; bočica, 1x28 kom 8600064201379	Cena:	601,90
	2 godine, bez posebnih naznaka	1486/2009/12	11.05.2009 11.05.2014
(R)	1122911 gastorozistentna kapsula, tvrda; 30mg; bočica, 1x28 kom 8600064201386	Cena:	1043,70
	2 godine, bez posebnih naznaka	1487/2009/12	11.05.2009 20.08.2013

LIDOKAIN-HLORID gel, 30g 2% - Galenika AD, Beograd

varijacija tipa II:S: izmena uslova čuvanja leka

prihvata se: „čuvati u originalnom pakovanju“ za uslove čuvanja u roku upotrebe leka

„čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C, najduže 28 dana“ za uslove čuvanja
posle prvog otvaranja leka
varijacija važi od: 06.05.2009.

METOPROLOL XL SANDOZ® - SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka**metoprolol** - C07AB02**BLOKATORI****BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA****C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni**

(R)	1107810 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 47.5mg; blister, 3x10 kom 8606010890529 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2547/2009/12	210,80 05.05.2009 04.08.2013
(R)	1107811 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 47.5mg; blister, 5x10 kom 8606010890512 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2548/2009/12	- 05.05.2009 04.08.2013
(R)	1107812 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 190mg; blister, 3x10 kom 8606010890505 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2551/2009/12	366,50 05.05.2009 04.08.2013
(R)	1107813 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 190mg; blister, 5x10 kom 8606010890550 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2552/2009/12	- 05.05.2009 04.08.2013
(R)	1107814 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 95mg; blister, 3x10 kom 8606010890543 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2549/2009/12	271,90 05.05.2009 04.08.2013
(R)	1107815 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 95mg; blister, 5x10 kom 8606010890536 30 meseci, na temperaturi do 25°C	Cena: 2550/2009/12	- 05.05.2009 04.08.2013

MICARDIS® PLUS - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka**telmisartan, hidrohloriazid** - C09DA07**LEKOVI KOJI DELUJU****NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM****C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici**

(R)	1401922 tableta; 80mg+25mg; blister, 4x7 kom 8606103075260 3 godine, bez posebnih naznaka	Cena: 3601/2009/12	- 29.06.2009 29.06.2014
-----	---	------------------------------	-------------------------------

ORAMORPH® - L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO S.P.A. - Italija**morfin-sulfat** - N02AA01**ANALGETICI****N02AA prirodni alkaloidi opijuma**

(R)	3087301 oralne kapi, rastvor; 20mg/mL; bočica sa kapaljkom, 1x20 mL 8606104840010 3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti	Cena: 2709/2009/12	490,00 19.05.2009 12.06.2013
-----	---	------------------------------	------------------------------------

PENTREXYL kapsule, 16 po 500mg-Galenika AD, Beograd

Varijacija tipa II:S-Izmene u II delu dokumentacije

Prihvata se uvođenje novog idejnog rešenja ambalaže

varijacija važi od: 23.06.2009.

PRAVACOR® - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija**pravastatin** - C10AA03**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104483 tableta; 40mg; blister, 3x10 kom 8606007082432 2 godine, na temperaturi do 25°C	Cena: 3607/2009/12	- 29.06.2009 29.06.2014
-----	---	------------------------------	-------------------------------

PUREGON rastvor za injekciju, 1 po 100i.j./0.5mL – N.V. ORGANON, Holandija

Varijacija tipa II:S – CTD – MODUL 1: Procena administrativnih podataka
 Prihvata se uvođenje novog idejnog rešenja primarnog i sekundarnog pakovanja za lek
 varijacija važi od: 17.09.2009.

RELENZA prašak za inhalaciju, 20 po 5mg-GLAXOWELLCOME PROD., Francuska

Varijacija tipa II:S-CTD-MODUL 3: produženje roka upotrebe leka

umesto: 5 godina

prihvata se: 7 godina, na temperaturi do 30 C.

varijacija važi od: 14.07.2009.

RISSET – Pliva Hrvatska D.O.O., Hrvatska

tabl. 20 po 1mg

tabl. 20 po 2mg

tabl. 20 po 3mg

tabl. 20 po 4mg

Varijacija tipa II:S: promene u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za pacijenta usled hitnih bezbednosnih mera

lek nije indikovao za lečenje bihejvioralnih simptoma demencije

varijacija važi od: 22.07.2009.

SPERIDAN film tabl., 20 po 1mg – ACTAVIS HF, Island

Varijacija tipa IA:S-Izmena izgleda tablete

Prihvata se promena izgleda tablete:

umesto: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom, dimenzija 8x5mm

uvodi se: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom i oznakom „T“ sa jedne strane podeone crte i oznakom „1“ sa druge strane podeone crte, dimenzije 8x5mm

varijacija važi od: 07.05.2009.

SPERIDAN film tabl., 20 po 2mg – ACTAVIS HF, Island

Varijacija tipa IA:S-Izmena izgleda tablete

Prihvata se promena izgleda tablete:

umesto: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom, dimenzija 10x5mm

uvodi se: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom i oznakom „T“ sa jedne strane podeone crte i oznakom „2“ sa druge strane podeone crte, dimenzije 10x5mm

varijacija važi od: 07.05.2009.

SPERIDAN film tabl., 20 po 4mg – ACTAVIS HF, Island

Varijacija tipa IA:S-Izmena izgleda tablete

Prihvata se promena izgleda tablete:

umesto: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom, dimenzija 14x7,5mm

uvodi se: bela, ovalna, bikonveksna sa podeonom crtom i oznakom „T“ sa jedne strane podeone crte i oznakom „4“ sa druge strane podeone crte, dimenzije 14x7,5mm

varijacija važi od: 07.05.2009.

TORENDO® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija

risperidon - N05AX08

N05AX ostali antipsihotici

▲ (R) 1070063 film tableta; 2mg; blister, 2x10 kom
3838989520076

2 godine, bez posebnih naznaka

▲ (R) 1070066 film tableta; 3mg; blister, 2x10 kom
3838989520182

2 godine, bez posebnih naznaka

PSIHOLEPTICI

Cena: 844,80
3248/2009/12 09.06.2009

11.01.2012

Cena: 1270,30
3247/2009/12 09.06.2009

11.01.2012

TRAMA 24[®] RETARD - PHARMASWISS D.O.O. - Srbija**tramadol** - N02AX02**ANALGETICI****N02AX opioidi, ostali**

§ ▲ (R)	1087650 tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg; blister, 2x10 kom	Cena:	-
	8606007082753	2728/2009/12	20.05.2009
	3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, van domašaja dece		
§ ▲ (R)	1087651 tableta sa produženim oslobađanjem; 150mg; blister, 2x10 kom	Cena:	-
	8606007082760	2729/2009/12	20.05.2009
	3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, van domašaja dece		
§ ▲ (R)	1087652 tableta sa produženim oslobađanjem; 200mg; blister, 2x10 kom	Cena:	-
	8606007082777	2730/2009/12	20.05.2009
	3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, van domašaja dece		

VASILIP[®] - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**simvastatin** - C10AA01**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze**

(R)	1104490 film tableta; 10mg; blister, 4x7 kom	Cena:	343,80
	3838989567064	3251/2009/12	09.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		
(R)	1104491 film tableta; 20mg; blister, 4x7 kom	Cena:	531,00
	3838989567071	3250/2009/12	09.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		
(R)	1104492 film tableta; 40mg; blister, 4x7 kom	Cena:	854,20
	3838989567088	3249/2009/12	09.06.2009
	3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju		

VASILIP – Krka, Slovenija

film tablete 28 po 10mg

film tablete 28 po 40mg

Varijacija tipa II:S-Izmene u II delu dokumentacije

Prihvata se uvođenje novog idejnog rešenja spoljnog i unutrašnjeg pakovanja za lek. varijacija važi od: 29.04.2009.

VELCADE[®] - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija**bortezomib** - L01XX32**ANTINEOPLASTICI****L01XX ostali antineoplastici**

(SZ)	0039101 prašak za rastvor za injekciju; 1mg; bočica staklena, 1x1 mg	Cena:	-
	8606102804465	1502/2009/12	11.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju		

VODA ZA INJEKCIJE rastvarač za parenteralnu upotrebu 50 po 5ml – Galenika AD, Srbija

varijacija tipa IB:S: izmena uslova čuvanja leka

umesto: čuvati na 25 C, zaštićeno od svetlosti**prihvata se:** čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

varijacija važi od: 22.04.2009.

ZYLIT[®] - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija**klopidogrel** - B01AC04**ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)****B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin**

(R)	1068502 film tableta; 75mg; blister, 4x7 kom	Cena:	2682,40
	3838989505059	3043/2009/12	08.06.2009
	2 godine, na temperaturi do 25°C		

ZYLLT- Krka Farma D.O.O., Hrvatska

film tabl. 14 po 75mg

film tabl. 28 po 75mg

film tabl. 56 po 75mg

film tabl. 84 po 75mg

Varijacija tipa II:S-Izmene u II delu dokumentacije

Prihvata se uvođenje novog idejnog rešenja spoljnog i unutrašnjeg pakovanja za lek
varijacija važi od: 04.05.2009.

PROMENE NAZIVA PROIZVODA (VARIJACIJA)

dosadašnji naziv: AMLOPIN LEK®

novi naziv: AMLOPIN®

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

amlodipin

tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

515-04-02833-1 od 28.09.04
2569/2009/12 od 06.05.2009

tableta; 5mg; blister, 2x10 kom

515-04-02833/03 od 28.09.04
2568/2009/12 od 06.05.2009,

dosadašnji naziv: BISOPROLOL SANDOZ film tablete, 30 po 5mg – Lek, Slovenija

novi naziv: BYOL film tablete, 30 po 5mg – Lek, Slovenija

varijacija važi od: 18.08.2009.

dosadašnji naziv: BISOPROLOL SANDOZ film tablete, 30 po 2.5mg – Lek, Slovenija

novi naziv: BYOL film tablete, 30 po 2.5mg – Lek, Slovenija

varijacija važi od: 18.08.2009.

dosadašnji naziv: BISOPROLOL SANDOZ film tablete, 30 po 10mg – Lek, Slovenija

novi naziv: BYOL film tablete, 30 po 10mg – Lek, Slovenija

varijacija važi od: 18.08.2009.

dosadašnji naziv: CITALOPRAM HEXAL®

novi naziv: CITALOPRAM SANDOZ®

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

citalopram

film tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

1070/2008/12 od 18.03.08
1457/2009/12 od 21.04.2009

film tableta; 20mg; blister, 2x10 kom

1071/2008/12 od 18.03.08
1458/2009/12 od 21.04.2009

film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom

1072/2008/12 od 18.03.08
1459/2009/12 od 21.04.2009,

dosadašnji naziv: ENALAPRIL LEK®

novi naziv: ENALAPRIL SANDOZ®

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

enalapril

tableta; 10mg; blister, 2x10 kom

515-04-01219/04 od 28.09.04
2446/2009/12 od 29.04.2009

tableta; 5mg; blister, 2x10 kom

515-04-01218/04 od 28.09.04
2445/2009/12 od 29.04.2009,

dosadašnji naziv: KLOPIDOGREL film tablete, 56 po 75mg – Galenika AD, Srbija

novi naziv: CLOPIGAL film tablete, 56 po 75mg – Galenika AD, Srbija

varijacija važi od: 08.09.2009.

dosadašnji naziv: KLOPIDOGREL film tablete, 28 po 75mg – Galenika AD, Srbija

novi naziv: CLOPIGAL film tablete, 28 po 75mg – Galenika AD, Srbija

varijacija važi od: 08.09.2009.

dosadašnji naziv: **PCM-HEMOFARM**

novi naziv: **FEBRICET**

HEMOFARM AD - Srbija

paracetamol

šumeća tableta; 500mg; fiola, 1x10 kom

3057/2007/12 od 18.12.07
2571/2009/12 od 07.05.2009,

dosadašnji naziv: **FERRUM LEK®**

novi naziv: **FERRUM SANDOZ®**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

gvožđe III

rastvor za injekciju; 100mg/2mL; ampula, 5x2 mL

515-04-02837/04 od 28.09.04
1453/2009/12 od 21.04.2009,

dosadašnji naziv: **FERRUM LEK®**

novi naziv: **FERRUM SANDOZ®**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

gvožđe III

sirup; 50mg/5mL; boca staklena, 1x100 mL

515-04-02839/04 od 28.09.04
1454/2009/12 od 21.04.2009

tableta za žvakanje; 100mg; blister, 3x10 kom

515-04-02838/04 od 28.09.04
1455/2009/12 od 21.04.2009,

dosadašnji naziv: **KETONAL® LEK**

novi naziv: **KETONAL®**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

ketoprofen

gel; 2.5%; tuba, 1x50 g

515-04-01956/03 od 28.09.04
3038/2009/12 od 08.06.2009,

dosadašnji naziv: **KETONAL® LEK**

novi naziv: **KETONAL®**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

ketoprofen

rastvor za injekciju; 100mg/2mL; ampula, 10x2 mL

515-04-01955/03 od 28.09.04
3037/2009/12 od 08.06.2009,

dosadašnji naziv: **KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE**

novi naziv: **KETONAL® FORTE**

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO - Srbija

ketoprofen

film tableta; 100mg; bočica od tamnog stakla, 1x20 kom

199/2005/12 od 26.08.05
3254/2009/12 od 09.06.2009,

dosadašnji naziv: **TRAMA 24® RETARD**

novi naziv: **TRAMA 24®**

PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

tramadol

tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg; blister, 2x10 kom

2728/2009/12 od 20.05.09
3399/2009/12 od 23.06.2009

tableta sa produženim oslobađanjem; 150mg; blister, 2x10 kom

2729/2009/12 od 20.05.09
3400/2009/12 od 23.06.2009

tableta sa produženim oslobađanjem; 200mg; blister, 2x10 kom

2730/2009/12 od 20.05.09
3401/2009/12 od 23.06.2009,

PROMENE PAKOVANJA REGISTROVANIH LEKOVA

ACETISAL PH 8° - GALENIKA AD - Srbija

acetilsalicilna kiselina - N02BA01

ANALGETICI

N02BA salicilna kiselina i derivati

(BR) 1086032 film tableta; 500mg; blister, 2x10 kom

Cena: -

8608808107277

3331/2009/12 15.06.2009

2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage

04.06.2014

AMIGREN° - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina

kamilofin, mekloksamin, propifenazon, kofein, ergotamin - N02CA52

ANALGETICI

N02CA ergot alkaloidi

△(R) 1086024 film tableta; 25mg+20mg+200mg+80mg+0.75mg; fiola, 1x10 kom

Cena: -

3870010006388

2600/2009/12 08.05.2009

2 godine, na temperaturi do 25° C

28.03.2013

CINEDIL° - ALKALOID AD - Makedonija

cinarizin - N07CA02

OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU
NA NERVENI SISTEM

N07CA lekovi protiv vertiga

△(R) 1106211 tableta; 75mg; blister, 3x15 kom

Cena: -

5310001206307

2879/2009/12 28.05.2009

3 godine, bez posebnih uslova čuvanja

18.12.2012

FOLACIN° - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska

folna kiselina - B03BB01

ANTIANEMICI

B03BB folna kiselina i derivati

(R) tableta; 5mg; blister, 2x10 kom

Cena: -

3858881053311

1212/2009/12 06.04.2009

3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti

12.06.2012

FOLKODIN ALKALOID° - ALKALOID AD - Makedonija

folkodin - R05DA08

LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE

R05DA alkaloidi opijuma i derivati

△(R) 1115150 kapsula, tvrda; 10mg; blister, 2x10 kom

Cena: -

5310001206291

2880/2009/12 28.05.2009

4 godine, na temperaturi do 30° C

21.02.2013

HEFEROL° - ALKALOID AD - Makedonija

gvožđe(II)-fumarat - B03AA02

ANTIANEMICI

B03AA dvovalentno gvožđe, oralni preparati

(R) 1060140 kapsula, tvrda; 350mg; blister, 3x10 kom

Cena: -

5310001206338

2860/2009/12 26.05.2009

5 godina, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju

28.02.2013

KABIVEN - FRESENIUS KABI AB - Švedska

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje - B05BA10

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI**

B05BA rastvori za parenteralnu ishranu

- (SZ) 0171306 emulzija za infuziju; 190g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L
+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L
+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 3x2566 mL (2300 kcal) **Cena:** -
8606010925788 3260/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 11.05.2014

KABIVEN PERIPHERAL - FRESENIUS KABI AB - Švedska

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, histidin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje - B05BA10

**SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI**

B05BA rastvori za parenteralnu ishranu

- (SZ) 0171305 emulzija za infuziju; 110g/L+16g/L+11.3g/L+3.4g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+5.6g/L
+7.9g/L+9g/L+5.6g/L+7.9g/L+6.8g/L+4.5g/L+5.6g/L+1.9g/L+0.23g/L+7.3g/L+0.74g/L
+5.04g/L+1.6g/L+5.97g/L+4.9g/L+200g/L; plastična kesa, 3x2400 mL (1700 kcal) **Cena:** -
8606010925801 3262/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 11.05.2014

MEDICINSKI KISEONIK - MESSER TEHNOGAS A.D. - Srbija**kiseonik - V03AN01****SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI****V03AN medicinski gasovi**

- (SZ) 9119005 medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x46 l **Cena:** 5072.9din
8606103795137 1332/2007/12 13.06.2007
60 dana, skladištiti dobro zatvorene boce na natkrivenom
otvorenom skladištu na temperaturi okoline 11.06.2012
- (SZ) 9119008 medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x36 l **Cena:** 3855.4din
8606103795106 1331/2007/12 13.06.2007
60 dana, skladištiti dobro zatvorene boce na natkrivenom
otvorenom skladištu na temperaturi okoline 11.06.2012
- (SZ) 9119013 medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x1000 l **Cena:** 33084din
8606103795052 1333/2007/12 13.06.2007
60 dana, skladištiti dobro zatvorene boce na natkrivenom
otvorenom skladištu na temperaturi okoline 11.06.2012
- (SZ) 9119017 medicinski gas, delimično tečni;
100% v/v; kontejner, 1x600 l **Cena:** 29113.9din
8606103795014 1330/2007/12 13.06.2007
60 dana, skladištiti dobro zatvorene boce na natkrivenom
otvorenom skladištu na temperaturi okoline 11.06.2012

MEDICINSKI UGLJENDIOKSID - MESSER TEHNOGAS A.D. - Srbija**ugljen-dioksid** - V03AN02

SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI

V03AN medicinski gasovi

(SZ)	9119307 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x1 kg	Cena:	-
	8606103795311	4059/2008/12	05.11.2008
	5 godina, na izdvojenom, dobro ventiliranom mestu, na temperaturi do 40°C		20.08.2013

NEXIUM® - ASTRAZENECA AB - Švedska**esomeprazol** - A02BC05

LEKOWI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

A02BC inhibitori protonске pumpe

(R)	1122814 gastorozistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom	Cena:	-
	7321839221910	2883/2009/12	28.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30° C		04.02.2013
(R)	1122815 gastorozistentna tableta; 20mg; blister, 1x14 kom	Cena:	-
	7321839221866	2881/2009/12	28.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 30° C		04.02.2013

NIPAM® - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina**nitrazepam** - N05CD02

PSIHOLEPTICI

N05CD derivati benzodiazepina

▲(R)	1077261 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom	Cena:	-
	3870010006395	2670/2009/12	14.05.2009
	3 godine, na temperaturi do 25° C		18.12.2012

PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija**cefiksim** - J01DD08ANTIBAKTERIJSKI LEKOWI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

J01DD cefalosporini, III generacija

(R)	1321620 film tableta; 400mg; blister, 2x5 kom	Cena:	-
	5310001206277	3029/2009/12	08.06.2009
	3 godine, na temperaturi od 15 - 25° C		23.09.2009
(R)	1321622 film tableta; 400mg; blister, 1x5 kom	Cena:	-
	5310001206260	3028/2009/12	08.06.2009
	3 godine, na temperaturi od 15° C do 25° C		23.09.2009

PAVULON® - N.V. ORGANON - Holandija**pankuronijum-bromid** - M03AC01

MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03AC ostala kvaternerna amonijum jedinjenja

(SZ)	0082351 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2 mL	Cena:	4126.9din
	8600103419376	3180/2007/12	22.01.2008
	3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C zaštićeno od svetlosti		22.01.2013

SUNTENT® - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija**sunitinib** - L01XE04

ANTINEOPLASTICI

L01XE inhibitori protein kinaze

(R)	1039703 kapsula, tvrda; 12.5mg; blister, 4x7 kom	Cena:	-
	4034541008580	3845/2009/12	14.07.2009
	2 godine, bez posebnih uslova čuvanja		06.05.2013
(R)	1039704 kapsula, tvrda; 25mg; blister, 4x7 kom	Cena:	-
	4034541008597	3846/2009/12	14.07.2009
	2 godine, bez posebnih uslova čuvanja		06.05.2013
(R)	1039706 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 4x7 kom	Cena:	-
	4034541008603	3847/2009/12	14.07.2009
	2 godine, bez posebnih uslova čuvanja		06.05.2013

TETANUS GAMMA - KEDRION S.P.A. - Italija**antitetanusni imunoglobulin, humani** - J06BB02 **IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI****J06BB imunoglobulini, specifični**

(R)	0013434 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 250i.j./mL; napunjen injekcioni špric, 1x1 mL	Cena:	-
	8606103273314	2878/2009/12	27.05.2009
	3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C, zaštićeno od svetlosti		14.11.2010

TYLOL® HOT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**pseudoefedrin, paracetamol, hlorfenamin** - R01BA52 **NAZALNI PREPARATI****R01BA adrenomimetici**

(BR)	3111288 oralni prašak; 60mg+500mg+4mg; kesica, 6x20 g	Cena:	-
	8699540250109	2561/2009/12	06.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznak bez posebnih naznaka		13.07.2011

TYLOL® HOT ZA DECU - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**pseudoefedrin, paracetamol, hlorfenamin** - R01BA52 **NAZALNI PREPARATI****R01BA adrenomimetici**

(BR)	3111287 oralni prašak; 30mg+250mg+2mg; kesica, 6x10 g	Cena:	-
	8699540250147	2560/2009/12	06.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		12.09.2011

TYLOL® HOT-D - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska**pseudoefedrin, paracetamol, hlorfenamin** - R01BA52 **NAZALNI PREPARATI****R01BA adrenomimetici**

(BR)	3111289 oralni prašak; 60mg+500mg+4mg; kesica, 6x6 g	Cena:	-
	8699540250185	2562/2009/12	06.05.2009
	3 godine, bez posebnih naznaka		13.07.2011

ABECEDNI SPISAK PROIZVOĐAČA SA ASORTIMANOM NOVOREGISTROVANIH LEKOVA

ABBOTT S.R.L. - Italija

SYNAGIS (palivizumab)

ACINO AG - Nemačka

VICTANYL® (fentanil)

ADAMED SP.Z.O.O. - Poljska

AMLONORM® (amlodipin)

AESICA QUEENBOROUGH LTD

- Velika Britanija

ZEMPLAR® (parikalcitol)

ALKALOID AD - Makedonija

CAFFETIN MENSTRUAL® (ibuprofen)

SKOPRYL PLUS® (lizinopril, hidrohloriazid)

AMGEN EUROPE B.V. - Holandija

ARANESP® (darbepoetin alfa)

ASTRAZENECA AB - Švedska

PULMICORT® (budesonid)

ASTRAZENECA UK LIMITED

- Velika Britanija

CRESTOR® (rosuvastatin)

FASLODEX® (fulvestrant)

BAXTER S.A. - Belgija

KIOVIG (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu)

BELUPO,

LJEEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska

EMINENS® (ropinirol)

HALEA® (sertralin)

TIRAMAT® (topiramid)

BIOTEST PHARMA GMBH - Nemačka

INTRATECT® (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu)

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA

GMBH & CO.KG - Nemačka

SPIRIVA® RESPIMAT® (tiotropijum-bromid)

DR. AUGUST WOLFF

GMBH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka

ARILIN® RAPID (metronidazol)

EMBIL PHARMACEUTICAL CO. LTD - Turska

NEO-PENOTRAN® FORTE

(metronidazol, mikonazol)

F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska

TAMIFLU® (oseltamivir)

FARMAL D.D. - Hrvatska

OMEX® (omeprazol)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND

GMBH - Nemačka

OSVAREN®

(kalcijum-acetat, magnezijum-karbonat)

GALENIKA AD - Srbija

LAMOTRAL® (lamotrigin)

LOSAR® (losartan)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. -

Belgija

HAVRIX® (vakcina protiv hepatitisa A,

inaktivisana)

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija

GLICLADA® (gliklazid)

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER -

Francuska

METEOSPASMYL (alverin, simetikon)

LABORATORI BALDACCI S.P.A. - Italija

NORMOGIN (Liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus))

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. -

Slovenija

BISOPROLOL SANDOZ® (bisoprolol)

LISINOPRIL H SANDOZ® (lizinopril, hidrohloriazid)

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE -

Francuska

BIVALOS® (ranelinska kiselina (stroncijum ranelat))

MCNEIL AB - Švedska

NICORETTE® FRESHFRUIT (nikotin)

NICORETTE® FRESHMINT (nikotin)

NICORETTE® MICROTAB LEMON (nikotin)

MERCK KGaA - Nemačka

ERBITUX® (cetuximab)

NEXTPHARMA SAS - Francuska

KEPPRA® (levetiracetam)

NI MEDIC D.O.O. - Srbija

KLACID® (klaritromicin)

NOBELFARMA ILAC SANAYII**VE TICARET A.S. - Turska**

CO-IRDA® (irbesartan, hidrohloriazid)

PHARMACIN B.V. - Holandija

GASTROPERIDON® (domperidon)

PHARMANOVA D.O.O. - Srbija

MELOXAN (meloksikam)

PHARMASWISS D.O.O. - Srbija

MIPECID® (imipenem, cilastatin)

OXALIPLATIN PHARMASWISS (oksaliplatin)

PLANICID® (teikoplanin)

PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska

CLAREXID® (klaritromicin)

LOSARTIC® PLUS (losartan, hidrohloriazid)

STARCITIN® (citalopram)

REMEDICA LTD - Kipar

CARBAMAZEPINE-RETARD (karbamazepin)

OMEPRAZOL (omeprazol)

ROCHE PHARMA AG - Nemačka

ACTEMRA® (tocilizumab)

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija

SINDARABIN® (fludarabin)

SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija

EFEXIVA® (venlafaksin)

MIRTAZAPIN ODT SANDOZ® (mirtazapin)

TALECRIS BIOTHERAPEUTICS GMBH - Nemačka

PLASBUMIN®-20 (albumin, humani)

UCB PHARMA SA - Belgija

KEPPRA® (levetiracetam)

ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska

SPEDIFEN® 200 (ibuprofen)

SPEDIFEN® 400 (ibuprofen)

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
NACIONALNI REGISTAR LEKOVA

Za izdavača
Mr ph. spec. Tatjana Šipetić

Lektor
Prof Radmila Arsenijević

Dizajn i prelom teksta
HELICON PUBLISHING

Tehnička obrada i kompjuterska priprema
Vladimir Đorđević

Tiraž
3000

Štampa
Grafolik, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

615

NACIONALNI registar lekova / glavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić. - 2006 - Beograd (Vojvode Stepe 458) : Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije : Helicon Publishing, 2006 (Beograd : Grafolik). - 22 cm

Godišnje
ISSN 1452-3337 = Nacionalni registar lekova
COBISS.SR-ID 127781900