

## Kako izbeći zabunu

Ukoliko ste slepi ili slabovidni i niste u mogućnosti da očitajte brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez pomoći. Neka Vam pomogne osoba sa dobrim vidom koja je obučena za upotrebu leka Tresiba®.

Uvek proverite nalepnicu na insulinu prilikom preuzimanja leka u apoteci, kao i pre svakog ubrizgavanja, kako biste izbegli da slučajno pomešate dve različite jačine leka Tresiba® i ostale insulinske preparate koje eventualno uzimate.

Upotreba pogrešne jačine insulina ili pogrešnog leka mogla bi potencijalno da dovede do toga da uzmete previše ili premalo insulina. Prevelika količina insulina može dovesti do hipoglikemije, odnosno suviše niskog nivoa šećera u krvi. Za više informacija, obratite se svom lekaru.

▼Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija.

Sumnju na neželjene reakcije na lek, možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- online prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

Dodatno, u slučaju sumnje na neželjene reakcije na lek Tresiba® ili medikacijskih grešaka, kao i za sva dodatna pitanja u vezi sa iznetim informacijama ili u vezi sa bezbednom i efikasnom primenom leka Tresiba®, možete se obratiti nosiocu dozvole za ovaj lek u Republici Srbiji:

Kompanija Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd  
Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd  
tel: +381 (0)11 22 22 700  
fax: +381 (0)11 22 22 701  
e-mail: [NNSCGSafety@novonordisk.com](mailto:NNSCGSafety@novonordisk.com)

## Lek Tresiba® ne smeju da koriste

- osobe koje su alergične na insulin degludek ili na neki od ostalih sastojaka leka Tresiba®

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Pridržavajte se svih instrukcija navedenih u uputstvu za lek koje se nalazi u pakovanju. Ukoliko Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Datum odobrenja: avgust 2016. godine

**Referenca: 1.** Sažetak karakteristika leka za lek Tresiba® FlexTouch®, 200 jedinica/mL.



## Informacije o leku Tresiba® ▼ (insulin degludek)

(insulin degludek, rastvor za injekciju,  
proizveden tehnologijom rekombinantne DNK)

## Razumevanje formulacije i jačine leka koji Vam je propisao Vaš lekar



# Šta je Tresiba® i za šta se koristi

Lek Tresiba® je bazalni analog insulina. Koristi za lečenje dijabetes melitus-a kod odraslih, adolescenata i dece od 1 godine starosti.<sup>1</sup> On pomaže Vašem organizmu da smanji nivo šećera u krvi. Tresiba® se koristi jednom dnevno. U slučajevima kada se ne možete pridržavati svog redovnog rasporeda uzimanja leka, možete promeniti vreme uzimanja leka. Postarajte se da vremenski razmak između doza bude najmanje 8 časova.

## Dve različite jačine leka Tresiba®

Lek Tresiba® je dostupan u dve jačine: 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL. Tresiba® 200 jedinica/mL FlexTouch® pen ima dvostruko više jedinica insulina u svakom mL. Vaš lekar će Vam propisati jačinu leka koja je za Vas odgovarajuća.

Oba pena za davanje insulina imaju brojač doza koji pokazuje tačan broj odabranih doza. To znači da će doza koja se prikazuje na brojaču doza biti ubrizgana bez obzira na jačinu leka. Uvek koristite brojač i pokazivač doza kako biste odabrali potrebnu dozu leka. Ne brojite klikove. Ne treba vršiti konverziju doze u slučaju da prelazite sa jedne na drugu jačinu leka. Pre ubrizgavanja leka Tresiba® proverite koliko je jedinica odabrano.

### Tresiba® Jačina 100 jedinica/mL

Maksimalna doza  
po injekciji 80 jedinica

svetlozelena



Sadrži 300 jedinica insulina u 3 mL

### Tresiba® Jačina 200 jedinica/mL

Maksimalna doza  
po injekciji 160 jedinica

tamnozeleno



Sadrži 600 jedinica insulina u 3 mL

## Kako da prepoznate jačinu leka koja Vam je propisana

Važno je da budete sigurni u to da koristite ispravnu jačinu leka koju Vam je propisao Vaš lekar. „Tresiba® 100 jedinica/mL“ ili „Tresiba® 200 jedinica/mL“ su jasno naznačeni na nalepnici i spoljašnjem pakovanju.

Osim toga, pakovanje i nalepnica leka Tresiba® 100 jedinica/mL su svetlozelene boje, a pakovanje i nalepnica leka Tresiba® 200 jedinica/mL su tamnozeleno boje sa prugama. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 200 jedinica/mL takođe sadrže crveno polje u kome je naznačena jačina leka.

Pakovanje leka Tresiba®  
100 jedinica/mL  
5 penova u kartonskoj kutiji



Pakovanje leka Tresiba®  
200 jedinica/mL  
3 pena u kartonskoj kutiji



Ukoliko ste daltonista  
(ne razlikujete boje),  
lek Tresiba® 200 jedinica/mL  
takođe možete prepoznati  
po dvema izbočenim tačkama  
na dugmetu za ubrizgavanje doze.



Tresiba®  
100 jedinica/mL



Tresiba®  
200 jedinica/mL