

Strana 1

<p>VAŽNO - KARTICA UPOZORENJA Kivexa® (lamivudin/abakavir), film tableta Karticu uvek nosite sa sobom</p>
--

S obzirom da ovaj lek sadrži abakavir, kod nekih pacijenata koji upotrebljavaju lek Kivexa® može doći do razvoja reakcije preosetljivosti (ozbiljne alergijske reakcije) koja **može ugroziti život pacijenta**, u slučaju da se terapija lekom Kivexa® nastavi.

OBRATITE SE ODMAH VAŠEM LEKARU za savet da li da prekinete sa primenom leka Kivexa® **ukoliko:**

1) **dođe do pojave kožnog osipa ILI**

2) **ukoliko Vam se javi jedan ili više simptoma iz najmanje DVE od dalje navedenih grupa simptoma**

- groznica
- kratak dah, bolno grlo ili kašalj
- mučnina ili povraćanje ili proliv ili bol u trbuhu
- teška malaksalost ili bolovi ili opšti osećaj slabosti

Ukoliko zbog navedene reakcije prekinete sa primenom leka Kivexa®, **NE SMETE VIŠE NIKADA PONOVO DA UPOTREBLJAVATE** lek Kivexa® ili bilo koji drugi lek koji sadrži abakavir (npr. lekovi Ziagen, Trizivir ili Triumeq), s obzirom da u toku **nekoliko časova** može doći do smanjenja krvnog pritiska koje ugrožava Vaš život ili smrti.

(pogledati poledinu kartice)

Strana 2

Potrebno je da se odmah obratite Vašem lekaru ukoliko smatrate da je došlo do pojave reakcije preosetljivosti na lek Kivexa®. Zapišite podatke Vašeg lekara:

Lekar:

Tel:

Ukoliko Vaš lekar nije dostupan, neophodno je da hitno potražite medicinsku pomoć na drugom mestu (npr. odeljenje za hitan prijem najbliže bolnice).

Za opšte informacije o leku Kivexa®, obratite se Predstavništvu GlaxoSmithKline Export Limited, tel: 00 381 11 31 05 700.