

VAŽNO – KARTICA UPOZORENJA

Triumeq® (lamivudin/abakavir/dolutegravir), film tableta

Karticu uvek nosite sa sobom

Kod pacijenata koji upotrebljavaju lek Triumeq® može doći do razvoja reakcije preosetljivosti (ozbiljne alergijske reakcije) koja **može ugroziti život pacijenta**, u slučaju da se terapija lekom Triumeq® nastavi.

OBRATITE SE ODMAH VAŠEM LEKARU za savet da li da prekinete sa primenom leka Triumeq® ukoliko:

- 1) dođe do pojave kožnog osipa ILI**
- 2) ukoliko Vam se javi jedan ili više simptoma iz najmanje DVE od dalje navedenih grupa simptoma**
 - groznica
 - kratak dah, bolno grlo ili kašalj
 - mučnina ili povraćanje ili proliv ili bol u truhu
 - teška malaksalost ili bolovi ili opšti osećaj slabosti

Ukoliko zbog navedene reakcije prekinete sa primenom leka Triumeq®, **NE SMETE VIŠE NIKADA PONOVO DA UPOTREBLJAVATE** lek Triumeq® ili bilo koji drugi lek koji sadrži abakavir®, s obzirom da u toku **nekoliko časova** može doći do smanjenja krvnog pritiska koje ugrožava Vaš život ili smrti.

(pogledati poledinu kartice)

Potrebno je da se odmah obratite Vašem lekaru ukoliko smatrate da je došlo do pojave reakcije preosetljivosti na lek Triumeq®. Zapišite podatke Vašeg lekara:

Lekar:

Tel:

Ukoliko Vaš lekar nije dostupan, neophodno je da hitno potražite medicinsku pomoć na drugom mestu (npr. odeljenje za hitan prijem najbliže bolnice).

Za opšte informacije o leku Triumeq®, obratite se Predstavništvu GlaxoSmithKline Export Limited,
tel: 00 381 11 31 05 700.