

Kartica sa upozorenjima za pacijente

Nosite ovu karticu sa sobom sve vreme i pokažite je svim zdravstvenim radnicima i radnicima hitne pomoći kako biste ih informisali da ste na terapiji lekom LEMTRADA.

Lečim se lekom LEMTRADA zbog multiple skleroze (MS), bolesti koja utiče na moj imunološki sistem. Učestvujem u posebnom programu praćenja, koje se sprovodi svakog meseca tokom terapije ovim lekom i 4 godine nakon poslednje doze ovog leka.

Terapija lekom LEMTRADA može povećati rizik od:

- **Autoimunih poremećaja poput:**
 - poremećaja krvarenja koji se zove imunološka trombocitopenijska purpura (ITP)
 - retkih problema sa bubrežima, kao što je bolest sa antitelima na glomerularnu bazalnu membranu [anti-GBM bolest]
 - poremećaja tiroidne žlezde (hipotireoza/hipertireoza)
- **Ozbiljnih infekcija**

Lekari: za više informacija o leku LEMTRADA pogledajte Sažetak karakteristika leka.

Šta morate znati o leku LEMTRADA® (alemtuzumab)

Važna neželjena dejstva na koje morate obratiti pažnju:

Odmah pozovite svog neurologa kako biste prijavili dole navedene simptome bez obzira na to da li se radi o pojavi novih, pogoršanju već postojećih ili ponovnoj pojavi simptoma. Ako Vaš lekar nije dostupan, odmah potražite medicinsku pomoć. Pokažite lekaru ovu karticu.

Imunološka trombocitopenijska purpura (ITP)

- male, raspršene crvene, ružičaste ili ljubičaste tačkice na koži
- lako nastajanje modrica
- krvarenje iz posekotine, koje se teže zaustavlja nego obično
- obilnije, duže ili češće menstrualno krvarenje, nego obično
- krvarenje između dve menstruacije ili obilnije menstrualno krvarenje
- krvarenje iz desni ili nosa koje je novo ili duže traje nego obično, dok se ne zaustavi
- iskašljavanje krvi (može biti znak problema sa bubrežima takođe)

Poremećaji bubrega

- > krv u mokraći (koja može biti crvenkasta ili boje čaja)
- > oticanje nogu ili stopala

Ozbiljne infekcije

- > groznica i/ili jeza
- > otečene limfne žlezde
- > otežano disanje, kašalj, zviždanje i bol u grudima, stezanje u grudima i iskašljavanje krvi.

Neželjena dejstva mogu se javiti dugo nakon završetka terapije lekom LEMTRADA. Veoma je važno da svakoga meseca nastavite redovno da obavljate kontrolne analize (čak i ako se osećate dobro).



Rano otkrivanje i
dijagnoza pružaju
Vam najbolju priliku
za oporavak.



Takođe, morate
nastaviti da pratite
pojavu znakova i
simptoma.



Činite to još 4 godine
nakon poslednjeg
terapijskog ciklusa
lekom LEMTRADA.

Neurolog koji mi propisuje lek LEMTRADA dostupan je na navedenom broju. Drugi zdravstveni radnici koji učestvuju u mom lečenju, mogu biti navedeni u nastavku.

Ako se sprovode bilo kakve medicinske procedure, molim Vas obezbedite kopiju celokupne medicinske dokumentacije, uključujući svaku terapiju i/ili rezultate testova, dole navedenom lekaru/lekarima.

Ime i prezime pacijenta:

Potpis pacijenta:

	Ime i prezime	Brojevi telefona
Neurolog		
Lekar opšte prakse		
Medicinska sestra (za MS)		