

# Kartica-podsetnik za osobe pod rizikom kod preekspozicione profilakse (PrEP)

Propisan Vam je lek Gilestra Duo T za preekspozicionu profilaksu (PrEP) kao pomoć u smanjenju rizika za nastanak HIV-1 infekcije. Kako bi lek delovao, važno je da ne propuštate doze. Preporučena doza je jedna tableta svaki dan. Lek Gilestra Duo T uzimate tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.

Kad god je to moguće, lek treba uzimati s hranom.

Kako ne biste zaboravili da uzmete lek:

- Možete ga učiniti delom svoje rutine. Uzimate ga na primer uz ručak ili kad perete zube nakon doručka. Važno je da nađete vreme koje Vam najviše odgovara.
- Možete dodati podsetnik na svoj mobilni telefon ili neki drugi uređaj kako bi Vas svaki dan podsetio kada treba da uzmete lek.
- Takođe možete upotrebljavati i malu kutijicu za lekove u koju raspoređujete tablete za svaku nedelju.
- Kad uzmete lek, možete to označiti na kalendaru. Počevši od prve nedelje, označite dan kada ste počeli sa uzimanjem leka Gilestra Duo T, a zatim svaki dan nakon što uzmete lek stavite oznaku na odgovarajući dan. Možete i zabeležiti datum kada ste uzeli prvu tabletu leka Gilestra Duo T iz nove bočice. Ako niste sigurni jeste li uzeli tabletu, možete izbrojati tablete preostale u bočici (svaka bočica sadrži 30 tableta).

Počnite  
ovde

	Pon	Uto	Sre	Čet	Pet	Sub	Ned
1. nedelja							
2. nedelja							
3. nedelja							
4. nedelja							
5. nedelja							
6. nedelja							

Ako na svom telefonu ili računaru koristite kalendar, možete dodati podsetnik za lek Gilestra Duo T

Datum kada ste uzeli prvu tabletu leka iz nove bočice (dan/mesec/godina):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Podsetnik na posete lekaru

Vaš sledeći termin na klinici:

Poseta	Datum	Vreme	Lokacija

### Poziv na prijavljivanje neželjenih dejstava

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u *Uputstvu za lek*. Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE aplikacije dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs).

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Gilestra Duo T:

Actavis d.o.o. Beograd,

Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd

Telefon: (011) 209 93 00

E-mail: [Pharmacovigilanca-RS@actavis.com](mailto:Pharmacovigilanca-RS@actavis.com)