


Bortezomib



Telesna površina (m²)

Prema formuli Dubois i Dubois, Arch Intern Med 1916;17:863

UPUTSTVA:

Postavite težinu i visinu koristeći odgovarajuće mernе jedinice.

Očitajte **telesnu površinu u m²** ispod strelice.

Molimo Vas da pogledate delove Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka važećeg Sažetka karakteristika leka za informacije o promeni doziranja.

Rekonstitucija rastvora
3,5 mg bortezomiba za

**I. V.
injekciju**

Način primene	Jačina	Volumen rastvarača	Konačna koncentracija
Samo intravenska primena	3,5 mg	3,5 ml	1,0 mg/ml

Rekonstitucija rastvora
3,5 mg bortezomiba za

**S. C.
injekciju**

Način primene	Jačina	Volumen rastvarača	Konačna koncentracija
Samo supkutana primena	3,5 mg	1,4 ml	2,5 mg/ml

Samo za supkutanu ili intravensku primenu. Ne sme se primeniti drugim putem primene.

Način primene

Bortezomib


I. V. primena:


Rekonstituisani rastvor se primenjuje intravenskom bolus injekcijom tokom 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter u venu, nakon čega sledi ispiranje venskog katetera sterilnim 0,9% rastvorom natrijum-hlorida (9 mg/ml).

S. C. primena:

Rekonstituisani rastvor se primenjuje supkutano u butinu (desnu ili levu, gornji ili donji deo) ili u abdomen (desno ili levo, gornji ili donji kvadrant). Mesta primene injekcije treba da se stalno menjaju.

Površina tela m ²	Ukupna doza u (mg) s 1,3 mg/m ²	Primenjeni volumen za I. V. (u ml)	Primenjeni volumen za S. C. (u ml)
1,5	1,95	1,95	0,78
1,6	2,08	2,08	0,83
1,7	2,21	2,21	0,88
1,8	2,34	2,34	0,94
1,9	2,47	2,47	0,99
2,0	2,60	2,60	1,04
2,1	2,73	2,73	1,09





Pre propisivanja leka bortezomib, molimo Vas da pročitate odobreni
Sažetak karakteristika leka/
Uputstvo za lek, uključujući detaljne informacije o indikacijama,
kontraindikacijama, neželjenim dejstvima, merama opreza i doziranju i načinu primene.
Odobreni Sažetak karakteristika leka sastavni je deo ovog materijala.