

# **Vaš praktični vodič za Revolade (eltrombopag)**

Eltrombopag je indikovano za lečenje hronične imunske trombocitopenijske purpore (ITP) kod pacijenata uzrasta 1 godine i starijih koji su refrakterni na terapiju drugim lekovima (npr. kortikosteroidima, imunoglobulinima).

Molimo da pogledate Uputstvo za lek.

# O Vama

## Podaci o pacijentu

Ime i prezime:

---

Adresa:

---

Telefon/mob:

---

Datum rođenja:

---

Alergije:

---

Kontakt za hitne slučajeve:

---

## Podaci o lekaru i bolnici

Ime i prezime lekara:

---

Ime i prezime medicinske sestre:

---

Adresa:

---

Broj telefona:

---

Telefon bolnice:

---

# Praktični vodič za Vas

## SADRŽAJ

- 4** Podrška dok primete eltrombopag
- 6** Važne činjenice o Vama
- 8** Šta je hronična ITP?
- 9** Šta je eltrombopag?
- 10** Ono što treba da znate kada uzimate eltrombopag
- 11** Kada treba da uzimate eltrombopag?
- 22** Šta možete da očekujete od eltrombopaga?
- 24** Šta da radite Vi (ili Vaše dete) ukoliko Vam se pojavi NEŽELJENO DEJSTVO LEKA
- 28** Pitanja i odgovori

# Podrška dok primate eltrombopag

Vaš lekar je Vama (ili Vašem detetu) propisao eltrombopag za terapiju hronične imunske trombocitopenijske purpуре (hronična ITP) i dao Vam je ovu brošuru sa smernicama o primeni leka.

## **Hajde da krenemo**

Odvojite vreme da pročitate ovaj materijal koji će Vam pomoći da bolje razumete kako eltrombopag deluje, kako se ispravno uzima, i na koja neželjena dejstva treba obratiti pažnju, a dobićete i neke praktične savete kako da obezbedite da se eltrombopag najjednostavnije uklopi u Vašu svakodnevnu rutinu. Ali ne zaboravite, uvek treba da se obratite svom lekaru ili medicinskoj sestri za dodatne savete.

**Ovaj materijal ne treba da zameni informacije iz Uputstva za lek koje dobijete u kutiji eltrombopaga. Molim Vas obavezno pročitate Uputstvo za lek za više informacija o eltrombopagu.**



## Važne činjenice o Vama (ili Vašem detetu)

### Recite svom lekaru ako Vi (ili Vaše dete) ...

- imate problema sa jetrom. Tokom terapije eltrombopagom redovno će Vam se sprovesti laboratorijske analize
- uzimate lekove za prevenciju formiranja krvnih ugrušaka, kao što su antikoagulansi ili antitrombocitni lekovi
- imate povećan rizik za formiranje krvnih ugrušaka u venama ili arterijama (tj. ako pušite, uzimate kontraceptivne pilule ili hormonsku supstitucionu terapiju, ako ste nedavno bili podvrgnuti hirurškom zahvatu ili doživeli fizičku povredu, ako je neko od članova Vaše porodice imao krvne ugruške, ili ako imate hronično oboljenje jetre
- imate kataraktu (zamućenje očnog sočiva)
- imate drugo oboljenje krvi, uključujući i maligno oboljenje krvi kao što je mijelodisplastični sindrom (MDS)
- ste trudni, mislite da možete biti trudni ili planirate da zatrudnite
- dojite ili planirate da dojite

### **Recite svom lekaru ako Vi ( ili Vaše dete) ...**

- Uzimate ili planirate da uzimate druge lekove. To obuhvata:
  - antacide (lekove koji se uzimaju kod poremećaja varenja, gorušice ili čira na želucu) koji sadrže minerale kao što je aluminijum, kalcijum ili magnezijum
  - statine, lekove koji se koriste za snižavanje holesterola
  - lekove za lečenje HIV-a, kao što su lopinavir ili ritonavir
  - lekove ili suplemente, koji sadrže kalcijum, aluminijum, gvožđe, magnezijum, selen ili cink. Ovo obuhvata i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta, biljne lekove i multivitaminske suplemente, kao i proteinske obroke (šejkove)
  - lekove za lečenje raka kao što su metotreksat ili topotekan
  - lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao što su antikoagulansi ili antiagregacioni lekovi
  - druge lekove koji se koriste u terapiji ITP-a, kao što su kortikosteroidi, danazol ili azatioprin

- Ukoliko ste istočno-azijskog porekla (Kinezi, Japanci, Tajvanci ili Koreanci), jer to može značiti da će biti potrebno da započnete terapiju nižim dozama leka eltrombopaga

### **Vi (ili Vaše dete) ne biste smeli da uzimate eltrombopag ako ste Vi (ili Vaše dete)**

- alergični (hiperosetljivi) na aktivni sastojak eltrombopag, ili na bilo koji drugi sastojak koji ovaj proizvod sadrži
- **Proverite sa svojim lekarom ukoliko mislite da ovo može da se odnosi na Vas.**

## Šta je hronična ITP?

Krv je sastavljena od različitih tipova ćelija, uključujući i trombocite. To su male ćelije, koje pomažu vašoj krvi da se zgrušava i formira krastu, kako bi se zaustavilo krvarenje, na primer kada se posećete ili ogrebete.

Trombociti se stvaraju u koštanoj srži i prirodno se uklanjaju putem slezine i jetre nakon približno sedam dana. Međutim, kod osoba sa ITP-om, antitela napadaju trombocite i sprečavaju njihovu normalnu funkciju. Ovi trombociti se nakon toga uklanjaju iz organizma mnogo brže nego što je to uobičajeno.

Antitela takođe intereaguju sa ćelijama koje prave nove trombocite, što dovodi do smanjenog stvaranja trombocita.

Kada broj trombocita koji se uklanjaju postane veći od broja trombocita koji se stvaraju, dolazi do pada ukupnog broja Vaših trombocita i Vaša krv ne može normalno da se zgrušava. Zbog toga možete imati simptome kao što su stvaranje modrica, tačkasta krvarenja na koži, krvarenje iz nosa, krvarenje desni, ne možete da zaustavite krvarenje kada se posećete ili povredite.

**Ako Vi (ili Vaše dete) imate ITP više od 12 meseci, to se smatra hroničnom ITP**



## Šta je eltrombopag?

Eltrombopag je indikovano za lečenje hronične imune (idiopatske) trombocitopenijske purpore (ITP) kod pacijenata uzrasta 1 godine i starijih koji su refrakterni na prethodne terapijske linije.

### **Kako eltrombopag deluje**

On deluje slično hormonima koji su prirodno u našem organizmu (nazvanim faktorima rasta) koji povećavaju proizvodnju trombocita u koštanoj srži. Ovo zauvrat može dovesti do porasta broja trombocita u Vašoj krvi.

Možda ste prethodno u Vašoj terapiji imali lekove koji usporavaju razgradnju trombocita. TPO-R agonist, kao što je eltrombopag deluje drugačije, tako što pomaže Vašem organizmu da stvara više trombocita. To bi trebalo da dovede do porasta broja Vaših trombocita i omogući Vam bolje upravljanje Vašim hroničnim ITP-om.

# Ono što treba znati kada uzimate eltrombopag

**Eltrombopag je dostupan u dve jačine tableta:**



25 mg



50 mg

*Vaše eltrombopag tablete mogu izgledati drugačije nego što su tablete na slikama iznad.*

Vaš lekar će Vam reći koja je prava doza za Vas. U zavisnosti kako odgovorite na lečenje, ta doza se može menjati tokom vremena.

Vaš lekar će Vam reći ukoliko je potrebno da se plan lečenja promeni. Nemojte menjati broj eltrombopag tableta koje uzimate osim ako niste dobili takvo uputstvo od svog lekara.

**Kako se uzima eltrombopag**

Treba da uzimate eltrombopag:

- kao jednu dnevnu dozu
  - ako treba da uzmete više od jedne tablete, uzmite ih sve u isto vreme
- popijte, jednu po jednu sa malo vode

**Čuvanje eltrombopaga**

Lek eltrombopag ne zahteva posebne uslove čuvanja, ali ga treba čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Nemojte koristiti eltrombopag posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i blisteru.



## Kada bi Vi ili Vaše dete trebalo da uzimate eltrombopag?

Eltrombopag treba da uzimate jedanput dnevno. Od Vas zavisi u koje doba dana (ili noći) ćete ga uzimati. Međutim, biće Vam lakše za pamćenje, ukoliko ga svakog dana u isto vreme uzimate.

**VAŽNA NAPOMENA:** Eltrombopag ne treba uzimati sa hranom, pićem ili drugim lekovima koji sadrže visoke koncentracije kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, aluminijuma, seleni ili cinka.

Interakcija nije štetna, ali može sprečiti pravilnu apsorpciju eltrombopaga u Vašem telu što dovodi do toga da neće biti adekvatne aktivnosti leka.

**Iz tog razloga, morate uzeti eltombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon određene hrane, pića ili lekova.**



## **Uvrstite eltrombopag u Vašu (ili Vašeg deteta) svakodnevnu rutinu**

Neophodno je razmisliti, kada bi bilo najbolje vreme za Vas za uzimanje eltrombopaga. Ovo je posebno važno s obzirom da ne smete uzimati eltrombopag sa određenom hranom, pićima ili lekovima koji sadrže visoke koncentracije kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, aluminijuma, selena ili cinka.

**Na sledećim stranama ćete naći preporuke kako da uzimanje leka eltrombopag postane deo Vaše svakodnevne rutine**

- Uzimajte ga uveče pre odlaska na spavanje ili
- Uzimajte ga ujutru čim se probudite

# Kako biste omogućili da eltrombopag ostvari najbolje rezultate...


## ...uzimajte eltrombopag

najmanje 2 sata pre...



...ili 4 sata nakon određene hrane,  
pića i lekova

# Uzimanje eltrombopaga pre nego što Vi (ili Vaše dete) odete na spavanje



Ako planirate da uzmete eltrombopag pre 22:00 časa, ovdje je predlog hrane i pića koje možete jesti tokom večernjeg obroka:

- Meso kao što je pileće meso, nemasna šunka, ili govedina
- bela riba npr. bakalar
- nelisnato povrće
- krompir, integralni pirinač, pasta
- voće
- voćni sokovi bez dodatih minerala
- crna kafa, čaj



## ZAPAMTITE...

Najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon uzimanja eltrombopaga, treba da izbegavate:

- Hranu, piće ili lekove bogate kalcijumom\*
- Mineralne suplemente ili obogaćenu hranu, npr. hranu kojoj je dodat kalcijum, gvožđe, magnezijum, aluminijum, selen ili cink



Sir



Energetska pločica



Milkšejk




Sladoled

Obratite se svom lekaru ako niste sigurni u odnosu na bilo koje pitanje u vezi sa uzimanja eltrombopaga.

\* 'Bogata kalcijumom' znači hrana, pića ili lekovi koji sadrže 50 mg ili više kalcijuma. Obavezno proverite podatke o nutritivnom sastavu na pakovanju, ili ako niste sigurni obratite se svom lekaru.

# Uzimanje eltrombopaga neposredno posle Vašeg buđenja (ili buđenja Vašeg deteta)



## ZAPAMTITE...

Eltrombopag bi trebalo uzimati bar 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja određenih namirnica:

- Hrana, piće ili lekovi bogati kalcijumom\*
- Mineralni suplementi obogaćena hrana, npr. hrana kojoj je dodat kalcijum, gvožđe, magnezijum, aluminijum, selen ili cink



Mleko



Jogurt



Obogaćene žitnice



Obogaćeni sokovi

Obratite se svom lekaru ako niste sigurni u odnosu na bilo koje pitanje u vezi uzimanja eltrombopaga.

\* 'Bogata kalcijumom' znači hrana, pića ili lekovi koji sadrže 50 mg ili više kalcijuma. Obavezno proverite podatke o nutritivnom sastavu na pakovanju, ili ako niste sigurni obratite se svom lekaru.

## Ostalo na šta BI TREBALO OBRATITI PAŽNJU

Minerali koji stupaju u interakciju sa eltrombopagom takođe se nalaze i u nekim lekovima. Kao i sa hranom bogatom kalcijumom, pazite da uzmete eltrombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon uzimanja ovih lekova:

- određeni antacidi (lekovi za poremećaj varenja, gorušicu i čir na želucu)
- lekovi ili suplementi koji sadrže kalcijum, aluminijum, gvožđe, magnezijum, selen ili cink. Ovo obuhvata i neke lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta, minerale i multivitaminske suplemente, kao i proteinske obroke (šejkove)

Ukoliko je neophodno da uzmete antacid, uzmite eltrombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon uzimanja antacida.

- Obratite se svom lekaru da Vam predloži tip antacida koji će imati manji uticaj na Vašu ITP terapiju

### **Obratite se svom lekaru ako uzimate bilo koji drugi lek, što obuhvata:**

- statine, koji se koriste za snižavanje holesterola
- lekove koji se koriste za lečenje HIV infekcije, kao što su lopinavir ili ritonavir
- hemioterapiju, lekove kao što su topotekan ili metotreksat
- lekove koji sprečavaju formiranje krvnih ugrušaka kao što su antikoagulantni ili antiagregacioni lekovi
- druge lekove za ITP, kao što su kortikosteroidi, danazol ili azatioprin
- kontraceptivne lekove ili hormonsku supsticionu terapiju
- biljne preparate i ostale lekove koje možete kupiti bez recepta

### **Ako ste trudni ili dojite**

Ne smete uzimati eltrombopag ako ste trudni osim ukoliko Vaš lekar ne preporuči drugačije. Dejstvo uzimanja eltrombopaga u trudnoći nije poznato.

- Obratite se svom lekaru ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite dok uzimate eltrombopag
- Koristite pouzdanu metodu kontracepcije dok uzimate eltrombopag

**Ne smete** dojiti dete ukoliko uzimate eltrombopag. Recite svom lekaru ako dojite ili planirate da dojite.

### **Vaš lekar može preporučiti pregled očiju radi provere postojanja katarakte**

U ispitivanjima na životinjama, katarakta (zamućenje očnog sočiva) je bila zapažena kod primene eltrombopaga. Klinički značaj ovih nalaza nije poznat, a u kliničkim ispitivanjima na ljudima do sada nije pronađen povećan rizik za pojavu katarakte. Vaš lekar može preporučiti pregled očiju na prisustvo katarakte kao deo rutinskih ispitivanja očiju.

## Šta možete da očekujete od eltrombopaga

Kada se uzima ispravno, eltrombopag može pomoći da se drži pod kontrolom Vaša (ili Vašeg deteta) hronična ITP i da se smanje njegovi efekti, kao što je npr. krvarenje.

### **U prvim nedeljama**

Kod svakodnevne primene leka kao što je slučaj sa eltrombopagom, može biti potrebno izvesno vreme da lek počne da deluje. Tipično, to može trajati do 2 nedelje dok Vaš organizam odgovori na primenu eltrombopaga, pa se zato nemojte brinuti ukoliko ne primetite neku promenu odmah.

Kada započnete lečenje eltrombopagom, Vaš lekar će morati da Vas pošalje na laboratorijska ispitivanja krvi svake nedelje kako bi proverio broj krvnih ćelija i trombocita. Funkcija Vaše jetre će takođe biti ispitana pre i tokom lečenja eltrombopagom. Na osnovu Vašeg prvobitnog odgovora na lečenje, Vaš lekar će možda preporučiti promenu jačine tableta.

Onda kada Vaš lekar zaključi da jačina tableta može ostati ista, tada će biti potrebno da radite laboratorijska ispitivanja krvi jednom mesečno. Vaš lekar će i dalje nastaviti da prati Vaš odgovor na lečenje kako bi mogao da donese odluku da li treba da nastavite da uzimate eltrombopag.



## Šta da radite Vi (ili Vaše dete) ukoliko Vam se pojavi NEŽELJENO DEJSTVO LEKA

Kao i kod svih drugih lekova, možete dobiti neželjeno dejstvo leka i kod primene eltrombopaga i ukoliko se pojavi to bi trebalo da kažete svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu. Vaš lekar će takođe brižljivo pratiti ispoljavanje neželjenih dejstava tokom lečenja eltrombopagom.

**Nemojte prestati da uzimate svoje lekove bez prethodne konsultacije sa lekarom.**



Priprema će Vam pomoći da postupate sa neželjenim dejstvima u slučaju da se ona pojave. U daljem tekstu je nekoliko ideja kako da postupate u slučaju češćih neželjenih dejstava koja Vam se mogu javiti kod primene eltrombopaga:

#### **Ako dobijete glavobolju:**

- Pijte dosta vode
- Ograničite unos kofeina
- Izbegavajte jarku svetlost, buku i jake mirise

#### **Ako osećate mučninu:**

- Promenite navike u ishrani:
  - Jedite pre nego što osetite glad
  - Jedite manje obroke tokom dana
  - Pijuckajte tečnost tokom dana
  - Izbegavajte masnu hranu, vrlo slatku ili začinjenu hranu

**Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa neželjenim dejstvima ili kako da postupate, obratite se svom lekaru.**

#### **Ako imate proliv:**

- Probajte da promenite način ishrane:
  - Pijte dosta vode
  - Jedite hranu sa niskim sadržajem masti, hranu sa visokim sadržajem proteina kao što je nemasno meso, umesto pržene, masne i začinjene hrane
  - Izbegavajte mleko i mlečne proizvode, uključujući sladoled
  - Jedite kuvano umesto sirovo povrće, oljuštite koru sa voća
  - Izbegavajte biljne preparate jer neki od njih mogu biti uzrok proliva

**Zapamtite da uzimate eltrombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon određene hrane, pića ili lekova.**

## Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti kod primene eltrombopaga

### Visok broj trombocita

Ako Vaš broj trombocita postane previše visok, Vaš lekar će prilagoditi jačinu tablete, ili će Vas zamoliti da prestanete da uzimate eltrombopag.

### Problemi sa jetrom

Treba da se obratite svom lekaru odmah ukoliko se kod Vas razviju znaci ili simptomi problema sa jetrom, kao što su:

- Pospanost
- Ubrzano disanje
- Drhtanje ruku
- Žuta prebojenost kože i beonjača (žutica)
- Oticanje stomaka ili članaka
- Neobična tamna prebojenost mokraće

### **Krvarenje (nakon prestanka terapije)**

Kod 8% pacijenata u kliničkim studijama, nakon prestanka primene eltrombopaga, nivo trombocita je padao ispod nivoa na početku lečenja eltrombopagom. Recite svom lekaru ako imate krvarenje ili pojavu modrica tokom 4 nedelje nakon prestanka uzimanja eltrombopaga.

### **Rizik od formiranja krvnih ugrušaka**

Eltrombopag može povećati rizik od formiranja krvnih ugrušaka. Rizik je veći ako ste: pušač, starijeg životnog doba, uzimate neke kontraceptivne pilule ili hormonsku supstitucionu terapiju, nedavno ste imali hirurški zahvat ili doživeli fizičku povredu, imate prekomernu telesnu masu (gojaznost), bili ste vezani za postelju tokom dužeg perioda vremena, imate određene genetske predispozicije koje se mogu javiti u Vašoj porodici ili imate hronično oboljenje jetre. Odmah se obratite svom lekaru ako imate simptome formiranja krvnog ugruška, kao što su:

- otok, bol i bolnu osetljivost jedne noge
- iznenadni nedostatak vazduha, posebno praćen oštrim bolom u grudima i ubrzanim disanjem
- bol u stomaku, uvećan (otečen) stomak, krv u stolici

### **Problemi sa koštanom srži**

Neki ljudi mogu imati problema sa koštanom srži (tkivo unutar kostiju) i primenom lekova, uključujući i eltrombopag te može doći do pogoršanja ovih problema. Vaš lekar može sprovoditi ispitivanja koštane srži tokom lečenja eltrombopagom.

### **Pogoršanje oblika raka krvnih ćelija**

Pre nego što počnete sa terapijom eltrombopagom, Vaš lekar će izvršiti testiranje, kako bi utvrdio da Vi imate ITP, a ne neko drugo oboljenje, kao što je mijelodisplastični sindrom (MDS). Ako imate MDS i primete eltrombopag, Vaše stanje MDS se može pogoršati. Za više saveta, obratite se Vašem lekaru.

## Često postavljana PITANJA

Ovaj odeljak pokriva neka od čestih pitanja koja se postavljaju o eltrombopagu. Ako imate pitanje na koje ovde nije odgovoreno, molimo da se obratite svom lekaru.

### **? Zaboravio sam da uzmem svoju dozu eltrombopaga, šta treba da radim?**

Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme, i recite to svom lekaru. Nemojte uzimati dvostruku dozu tokom jednog dana kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

### **? Uzeo sam previše eltrombopaga, šta treba da radim?**

Obratite se odmah svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu. Ako ste u mogućnosti, pokažite im pakovanje iz koga ste uzeli lek, ili Uputstvo za lek koje se nalazi u pakovanju. Vaš lekar će Vas pratiti zbog znakova ili simptoma neželjenih dejstava i osigurati da odmah dobijete odgovarajuće lečenje.

### **? Šta da uradim ako povraćam nakon uzimanja eltrombopaga?**

Sačekajte do sledećeg dana i uzmite svoju uobičajenu dozu u uobičajeno vreme. Ako Vam je često muka kada uzimate eltrombopag, recite to svom lekaru.

**? Jeo sam mlečne proizvode i uzeo svoju dozu eltrombopaga, šta treba da radim?**

Postoji verovatnoća da se Vaša doza neće pravilno apsorbovati u organizmu. Uzmite svoju sledeću dozu u uobičajeno vreme. Obratite se svom lekaru ako Vam je nešto nejasno, i sledite njegove preporuke kako da uzmete eltrombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata nakon hrane.

*Važno je takođe da uzimate eltrombopag najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle hrane, pića, lekova koji sadrže visoku koncentraciju gvožđa, magnezijuma i aluminijuma, seleno i cinka, kao i kalcijuma.*

**? Šta ako dobijem neželjeno dejstvo leka koje teško podnosim?**

Ako neželjena dejstva leka previše teško podnosite, obratite se svom lekaru; on će moći da Vam da savet kako da se bolje nosite sa njima. Nemojte prestati sa uzimanjem leka eltrombopaga pre razgovora sa svojim lekarom.

**? Šta ako zatrudnim?**

Ako zatrudnite, odmah se obratite svom lekaru. On će Vas posavetovati o najboljem toku daljih aktivnosti.

**? Šta da radim ako mi je ostalo višak tableta ili tablete eltrombopaga sa isteklim rokom?**

Nemojte koristiti eltrombopag nakon isteka roka naznačenog na kutiji i blister pakovanju. Ako Vam je ostao višak eltrombopag tableta ili tablete sa isteklim rokom, trebalo bi da pitate svog farmaceuta kako da ih odložite. Ne treba ih bacati u kanalizaciju niti u kantu sa kućnim smećem.

**? Kada treba da prestanem da uzimam eltrombopag?**

Nemojte prestati da uzimate eltrombopag ako prethodno niste razgovarali sa svojim lekarom. Ako Vi i Vaš lekar odlučite da treba da prestanete da uzimate eltrombopag, treba da uradite laboratorijsku analizu krvi tokom najmanje 4 nedelje nakon što ste uzeli poslednju dozu, kako bi se pratilo Vaše stanje.

## Beleške

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

A white rounded rectangular area with ten horizontal lines, resembling a notepad page. The lines are evenly spaced and extend across the width of the white area. The corners of the white area are rounded.

## PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA LEKOVA:

Svaku sumnju na neželjeno dejstvo leka treba prijaviti zdravstvenom radniku (uključujući i potencijalna neželjena dejstva koja nisu navedena u Uputstvu za lek). Na taj način omogućavate bolje sagledavanje bezbednosnih informacija o ovom leku.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- online prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili

popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

Sumnju na neželjenu reakciju na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Revolade u Republici Srbiji, čiji su kontakti navedeni niže u tekstu:

Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.

Omladinskih brigada 90a,

11070 Beograd

Tel. 011/2014 000;

fax. 011/3112 605

e-mail: [serbia.drugsafety@novartis.com](mailto:serbia.drugsafety@novartis.com)

online preko globalne internet stranice <https://psi.novartis.com/>

Za dodatne informacije pročitajte Uputstvo za lek.