


Eligard[®] (leuprorelin-acetat): Uputstvo za pripremu

Eligard: Uputstvo za pripremu



KORAK 1 Špric B



Sadrži prašak

Povući plavi čep kratkog štapića klipa da bi se izvukao sivi gumeni čep - NE ODVRĆITE

Izvući


Zavrните beli štapić klipa u Špric B

VAŽNE INFORMACIJE - OBAVEZNO PROČITATI PRE MEŠANJA LEKA

Molimo Vas da celokupno uputstvo za pripremu leka i informacije o leku potražite u Sažetku karakteristika leka

- Lek Eligard sme pripremati i primenjivati jedino zdravstveni stručnjak koji je edukovan za pravilnu primenu leka.
- Ukoliko nije pripremljen na ispravan način, lek ne sme da bude primenjen pacijentu.
- Uvek pustite da lek Eligard postigne sobnu temperaturu pre mešanja (lek izvaditi iz frižidera otprilike 30 minuta pre pripreme).
- Prvo pripremite pacijenta za injekcije, pa potom počnite se pripremom leka.
- Primenite lek Eligard supkutano odmah nakon rekonstitucije.
- **S obzirom na to da zbog nepravilne pripreme, rekonstitucije ili primene leka može doći do izostanka kliničke efikasnosti, potrebno je uraditi procenu nivoa testosterona ukoliko postoji sumnja ili je ustanovljena greška u rukovanju lekom Eligard.**

KORAK 2 Špric A



Sadrži tečnost


Odvrnuti providnu kapicu šprica držeći špric u vertikalnom položaju da bi se sprečilo curenje tečnosti

PRIJAVA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK

• Sumnju na neželjene reakcije na lek potrebno je da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) na jedan od sledećih načina: popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem: poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu/Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija - telefaksom na (011) 3951 130 ili -elektronskom poštom na nezeljene.reakcije@alims.gov.rs - popunjavanjem ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs

• S obzirom na to da zbog nepravilne rekonstitucije leka može doći do izostanka kliničke efikasnosti, kao i da postoje prijave o medicinskim greškama povezanim sa čuvanjem, pripremom i rekonstitucijom leka Eligard, molimo Vas da prijavite i slučajeve nepravilnog čuvanja, pripreme, rekonstitucije i/ili primene leka Eligard. Prijave možete proslediti i kompaniji Astellas putem e-mail adrese ili na faks predstavništva kompanije Astellas: Predstavništvo Astellas Pharma Beograd Strahinjica Bana 39, 11 000 Beograd; e mail: Pharmacovigilance_RS@astellas.com; mob: +381 60 60 11 620; tel: +381 11 7850 503; +381 11 7850 500; faks +381 11 2620 865.

KORAK 3 Mešanje



Povući sivi zapašać sa Šprica B

Zavrnuti Špric B na Špric A u vertikalnom položaju

Potiskujte sadržaj napred - nazad 60 puta (ukupno 30 krugova)


60x

Potisnite celokupan sadržaj Šprica A u Špric B, a onda odvrnite i odložite Špric A

KORAK 4 Primena

Pričvrstite sigurnosnu iglu na špric B držeći špric i nežno okrećući iglu u smeru kazaljke na satu, otprilike tri četvrtine okreta dok igla nije stabilna.

Nemojte previše da stežete, jer to može da prouzrokuje pucanje podnožja igle, što dovodi do isticanja leka tokom davanja injekcije. U slučaju oštećenja podnožja igle, potrebno je primeniti novi lek.



Ubrizgajte lek supkutano odmah nakon mešanja.

'Klik'

Gurajte prema gore zaštitni poklopac igle dok se ne čuje 'klik' - špric tada može biti bačen u kontejner namenjen za oštar otpad.