

Šta treba da znam o leku Xarelto?

- ◆ Xarelto razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka
- ◆ Xarelto morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu.**
- ◆ Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Xarelto, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ◆ Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste do nedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek Xarelto.
- ◆ Obavestite svog lekara o tome da uzimate Xarelto pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet svog lekara?

Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je Xarelto, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte počinjati sa uzimanjem leka ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su sledeći:

- ◆ Bol
- ◆ Otok ili nelagodnost
- ◆ Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- ◆ Neuobičajena pojava modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja iz desni, krvarenja iz posekotina kojima treba mnogo vremena da prestanu

- ◆ Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- ◆ Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- ◆ Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe

Kako da uzimam lek Xarelto?

Da bi se obezbedila optimalna zaštita:





- ◆ Xarelto 2.5 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
- ◆ Xarelto 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
- ◆ Xarelto 15 mg se mora uzimati sa hranom
- ◆ Xarelto 20 mg se mora uzimati sa hranom



verzija 3.0, avgust 2019. | MA-XAR-RS-0003-3



Kartica sa upozorenjima za pacijenta

Xarelto® 2.5 mg 
Xarelto® 10 mg 
Xarelto® 15 mg 
Xarelto® 20 mg 

Odaberite propisanu dozu

- ◆ Ovu karticu stalno imajte kod sebe
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije

**PRIMAM antikoagulantnu terapiju
lekom Xarelto (rivaroksaban)**

Ime

Adresa

Datum rođenja

Težina

Drugi lekovi/ stanja

**U hitnom slučaju
obavestite:**

Ime lekara

Telefon lekara

Pečat lekara

*Podaci o pacijentima (lični podaci pacijenata)
nisu dostupni kompaniji Bayer d.o.o. Beograd*

Takođe obavestite:

Ime

Telefon

Srodstvo

**Informacija za
zdravstvene radnike:**

- ◆ INR vrednosti ne treba da se koriste jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti leka Xarelto