

Remicade
infliksimab

Kartica sa podsetnikom za pacijenta

Ime pacijenta:

Ime lekara:

Telefon lekara:

Ova kartica sa podsetnikom za pacijenta sadrži važne bezbednosne informacije, kojih morate da budete svesni pre i tokom lečenja lekom Remicade.

Pokažite ovu karticu svakom lekaru koji učestvuje u Vašem lečenju.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uputstvo za lek Remicade pre nego što počnete da primete ovaj lek.

Datum početka lečenja lekom Remicade:

Trenutni režim primene leka:

Važno je da Vi i Vaš lekar zabeležite zaštićeni naziv i broj serije Vašeg leka.

Zamolite Vašeg lekara da ovde zabeleži vrstu i datum poslednjeg testiranja na tuberkulozu (TBC):

Test	Test
Datum	Datum
Rezultat:	Rezultat:

Molimo Vas da se postarate da prilikom svake posete lekaru sa sobom imate i spisak svih drugih lekova koje koristite.

Spisak alergija:

Spisak drugih lekova:

Infekcije

Pre lečenja lekom Remicade

- Obavestite Vašeg lekara ako imate neku infekciju, čak iako je veoma blaga.
- Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ako ste nekada imali tuberkulozu (TBC) ili bili u bliskom kontaktu sa nekim ko je imao tuberkulozu. Vaš lekar će Vas testirati da utvrdi da li imate tuberkulozu. Zamolite lekara da na ovu karticu upiše vrstu i datum Vašeg poslednjeg testiranja na tuberkulozu.
- Obavestite Vašeg lekara ako imate hepatitis B ili ako znate ili sumnjate da ste zaraženi virusom hepatitisa B.

Tokom lečenja lekom Remicade

- Odmah obavestite Vašeg lekara ako imate znake neke infekcije. Ovi znaci uključuju povišenu telesnu temperaturu, zamor, (uporan) kašalj, nedostatak daha, gubitak telesne mase, noćno znojenje, dijareju, pojavu rana, probleme sa zubima, osećaj pečenja tokom mokrenja ili simptome slične gripu.

Trudnoća i vakcinacija

- U slučaju da ste primali lek Remicade tokom trudnoće, važno je da o tome obavestite lekara Vaše bebe, pre nego što Vaša beba primi bilo koju vakcinu. Vaša beba ne sme da primi „živu vakcinu“, kao što je BCG (koristi se za prevenciju tuberkuloze), tokom perioda od 6 meseci nakon rođenja.

Nosite ovu karticu sa sobom još 4 meseca nakon primanja poslednje doze leka Remicade ili, u slučaju trudnoće, još najmanje 6 meseci

	nakon porođaja. Neželjene reakcije mogu da se pojave i dugo vremena nakon poslednje doze leka.
--	--