

# Kartica sa upozorenjima za pacijenta

Uvek nosite ovu karticu sa sobom i pokažite je zdravstvenim radnicima kod kojih se lečite.

## Važne informacije o bezbednosti leka Forxiga (dapagliflozin) – samo za šećernu bolest tip 1

### Znaci dijabetičke ketoacidoze (DKA) uključuju:

**Usta i trbuh:** osećaj mučnine ili povraćanje, bol u trbuhu, izrazita žeđ/suvoća usta (znaci dehidracije), slatki ili metalni ukus u ustima.

**Dah, disanje i miris:** brzo i duboko disanje, zadah slatkog mirisa, promenjen miris mokraće ili znoja.

**Drugi znaci:** povišen nivo ketona u mokraći ili krvi, nagli gubitak telesne težine, smetnost, neuobičajena pospanost ili umor.

**Ako imate znake/simptome DKA, obratite se lekaru ili odmah idite u bolnicu i odmah prestanite sa uzimanjem leka Forxiga.**

### Zapamtite:

Kod pacijenata koji uzimaju lek Forxiga može doći do razvoja DKA čak i kad je nivo šećera u krvi ispod 14 mmol/L (250 mg/dL). To stanje se zove „euglikemijska DKA“.

**Vaši kontakt podaci i  
kontakt podaci Vašeg  
lekara**



Vaše ime:

---

Ime lekara:

---

Broj telefona lekara:

---

Datum početka primene leka Forxiga:

---

Član porodice ili prijatelj kojeg treba kontaktirati u hitnim slučajevima:

---

Broj telefona člana porodice ili prijatelja:

---

## Informacije za lekare, farmaceute i medicinske sestre



### **Ovaj pacijent uzima lek Forxiga (dapagliflozin) za šećernu bolest tip 1**

- On je dodatak lečenju insulinom.
- To je lek iz grupe „inhibitora SGLT-2“.
- Primenu leka Forxiga treba privremeno prekinuti pre hirurških zahvata ili u slučaju hospitalizacije zbog ozbiljne akutne bolesti.

### **Ako pacijent pokazuje znake dijabetičke ketoacidoze (DKA), odmah procenite da li ima DKA**

- Procenite da li pacijent ima DKA nezavisno od nivoa glukoze u krvi.
- Kod pacijenata koji uzimaju lek Forxiga može doći do razvoja DKA čak i kad je nivo glukoze u krvi ispod 14 mmol/L (250 mg/dL). To stanje se zove „euglikemijska DKA“.

### **Lečenje DKA**

- **Ako posumnjate na DKA:** pružite pacijentu hitnu medicinsku pomoć i odmah prekinite primenu leka Forxiga
- **Lečenje euglikemijske DKA može da zahteva:** dodatni unos ugljenih hidrata uz primenu insulina i unos tečnosti.

**Ni u kom slučaju nemojte ni privremeno ni trajno prekinuti insulinsku terapiju.**

Uputstvo za lek nalazi se u pakovanju leka Forxiga. Takođe, dostupno je u elektronskoj formi na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs).

Kartica sa upozorenjima za pacijenta je dostupna u elektronskoj formi i na sajtu ALIMS-a, u delu Farmakovigilanca/Bezbednosne informacije/Upravljanje rizicima/Edukativni materijali.

AstraZeneca 

Verzija 1, novembar 2019.

RS-0932, Januar 2020.

  
**forxiga.**  
(dapagliflozin)