

## **ESMYA® 5mg tableta**

### **KARTICA ZA PACIJENTKINJU**

#### **ŠTA TREBA DA ZNATE PRE PRIMENE LEKA ESMYA?**

Lek Esmya može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijentkinja koje uzimaju ovaj lek. Jedno od mogućih neželjenih dejstava je ozbiljno oštećenje jetre. Prijavljeni su slučajevi insuficijencije jetre kod žena koje su uzimale lek Esmya. U malom broju ovih slučajeva bila je potrebna transplantacija jetre.

Ova Kartica Vam pruža informacije o laboratorijskim analizama krvi koje ćete obavljati tokom lečenja i o tome šta treba da preduzmete ukoliko se jave neželjena dejstva vezana za jetru.

Nemojte primenjivati lek Esmya ukoliko imate problema sa jetrom. Obavestite svog lekara ukoliko znate da imate problema sa jetrom ili ukoliko imate bilo kakvih sumnji u vezi sa stanjem Vaše jetre.

#### **ŠTA TREBA DA RADITE PRE, TOKOM I NAKON LEČENJA?**

##### **Redovno radite laboratorijske analize krvi**

Potrebno je da date krv na laboratorijsku analizu pre započinjanja svakog ciklusa lečenja kako biste proverili kakva je funkcija Vaše jetre.

U zavisnosti od rezultata ovih analiza, lekar će odlučiti da li je terapija lekom Esmya pogodna za Vas. Tokom terapije lekom Esmya Vaš lekar će vršiti redovne analize krvi kako bi proverio funkciju Vaše jetre. Ove analize je potrebno obavljati svakog meseca, uključujući i nekoliko nedelja nakon što završite ciklus lečenja (videti tabelu u nastavku). Ove analize krvi će pružiti lekaru informacije o funkciji Vaše jetre i izuzetno su važne za praćenje Vaše terapije.

##### **TABELA U NASTAVKU VAM OLAKŠAVA PRAĆENJE ANALIZA KRVU:**

	<b>DATUM</b>
<b>1. TEST (pre početka lečenja)</b>	
<b>Početak lečenja</b>	
<b>2. TEST (4 nedelje nakon početka lečenja)</b>	
<b>3. TEST (8 nedelja nakon početka lečenja)</b>	
<b>4. TEST (12 nedelja nakon početka lečenja)</b>	
<b>5. TEST (2- 4 nedelje nakon prekida uzimanja leka Esmya)</b>	

##### **ZNACI I SIMPTOMI MOGUĆIH PROBLEMA SA JETROM**

Prekinite terapiju i odmah kontaktirajte lekara ukoliko primetite bilo koji od sledećih znakova ili simptoma:

- umor, težak zamor
- žutu prebojenost kože/očiju
- tamnu mokraću
- bol u gornjem desnom delu stomaka
- svrab
- mučninu
- povraćanje

Lekar treba odmah da proveri funkciju Vaše jetre i odluči da li možete da nastavite sa terapijom.