

UPUTSTVO ZA LEK

POVIDON JOD, rastvor za kožu, 10%
Pakovanje: kontejner plastični, 1 x 100 ml

POVIDON JOD, rastvor za kožu, 10%
Pakovanje: kontejner plastični, 1 x 500 ml

Proizvođač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu
INN: povidon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek POVIDON JOD i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek POVIDON JOD
3. Kako se upotrebljava lek POVIDON JOD
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek POVIDON JOD
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK POVIDON JOD I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek POVIDON JOD predstavlja kompleks joda i povidona. Iz takvog kompleksa, jod se postepeno oslobađa delujući protiv širokog spektra patogenih uzročnika: bakterija, virusa, gljivica, spora i protozoa. Povidon jod rastvor se koristi za dezinfekciju kože i sluzokože pre i posle složenih i jednostavnih hirurških zahvata.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD ne smete koristiti:

- ukoliko ste preosetljivi na jod
- ako imate oboljenje štitne žlezde (uključujući gušavost i Hašimotov tireoiditis)
- za ispiranje telesnih šupljina
- kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500g).

Kada uzimate lek POVIDON JOD, posebno vodite računa ukoliko:

- imate bubrežnu bolest
- uzimate litijum (za lečenje psihoza)

Primena joda na velike površine oštećene kože može dovesti do prekomerne resorpcije joda.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Primena leka POVIDON-JOD može uticati na testove ispitivanja funkcije štitne žlezde. Kod nekoliko vrsta testova za određivanje prisustva krvi u stolici ili mokraći, povidon-jod može dati lažno pozitivne rezultate.

Primena leka POVIDON JOD u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ne preporučuje se hronična primena povidon-joda za vreme trudnoće i dojenja s obzirom da resorbovan jod može proći kroz placentu a i izlučuje se u mleko dojilje. Iako neželjeni efekti nisu prijavljeni tokom kratkotrajne primene povidon-joda kod trudnica, preporučuje se oprez i treba proceniti korist od terapije u odnosu na moguće neželjene efekte resorpcije joda na funkciju i razvoj štitne žlezde ploda.

Uticaj leka POVIDON JOD na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji ukazuju da rastvor povidon-joda utiče na upravljanje motornim vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD ne sadrži pomoćne supstance koje mogu imati uticaja na bezbednu primenu leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Povidon-jod rastvor za kožu je namenjen samo za lokalnu primenu na kožu.

Odrasli, starije osobe i deca

Za pre i postoperativnu dezinfekciju kože treba koristiti nerazblažen rastvor. Treba sprečiti nakupljanje rastvora ispod pacijenta i u naborima kože. Odstraniti višak rastvora pre upotrebe zavoja. Povidon-jod se ne preporučuje za hroničnu primenu kod novorođenčadi, a kontraindikovano je kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500g).

Ako ste uzeli više leka POVIDON JOD nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Jod uzet u velikim količinama može izazvati gušavost i povećanu ili smanjenu funkciju štitne žlezde. Simptomi akutnog predoziranja su: metalni ukus u ustima, prekomerno lučenje pljuvačke, pečenje ili bol u grlu ili ustima, iritacija ili oticanje očiju, otežano disanje zbog plućnog edema, reakcije na koži, stomachne tegobe i proliv. Može doći do razvoja metaboličkog poremećaja (acidoze), povećanja natrijuma u krvi i oštećenja funkcije bubrega.

Ako ste zaboravili da uzmete lek POVIDON JOD

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek POVIDON JOD

Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom POVIDON JOD bez saveta Vašeg lekara.

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek POVIDON JOD, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

- iritacija kože
- preosetljivost (uključujući težak oblik alergijske reakcije – anafilaktičku reakciju)

- metabolički poremećaji (acidoza)
- porast koncentracije natrijuma u krvi (hipernatremija)
- oštećenje bubrežne funkcije

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK POVIDON JOD

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

3 (tri) godine.

Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek POVIDON JOD

Aktivne supstance su:

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu

100 ml rastvora sadrži:

povidon-jod 10 g (što odgovara 1g raspoloživog joda)

Ostali sastojci su:

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu

- glicerol (85%);
- nonoksinol 9;
- natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat;
- limunska kiselina, monohidrat;
- natrijum-hidroksid 45%;
- voda, prečišćena.

Kako izgleda lek POVIDON JOD i sadržaj pakovanja

Rastvor za kožu (rastvor tamnosmeđe boje, karakterističnog mirisa na jod).

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu, 100 ml:

HDPE kontejner bele boje sa belim PP zatvaračem. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu, 500 ml:

HDPE kontejner bele boje sa belim PP zatvaračem.

Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2011.

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu, 100 ml: 515-01-0123-11-002 od 21.12.2011.

POVIDON JOD, 10 %, rastvor za kožu, 500 ml: 515-01-0126-11-002 od 21.12.2011.