

## UPUTSTVO ZA LEK

**Diflucan<sup>®</sup> 50 mg kapsule, tvrde**  
**Diflucan<sup>®</sup> 150 mg kapsule, tvrde**

**flukonazol**

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.**

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

**U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Diflucan i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diflucan
3. Kako se uzima lek Diflucan
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Diflucan
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

## 1. Šta je lek Diflucan i čemu je namenjen

Diflucan spada u grupu antigljivičnih lekova za sistemsku primenu. Aktivna supstanca je flukonazol.

Diflucan se primenjuje kod odraslih za lečenje:

- kriptokoknog meningitisa- gljivične infekcije mozga
- kokcidioidomikoze – oboljenja pluća i bronhija
- invazivne kandidijaze (infekcije koje izaziva *Candida*)
- kandidijaze sluznice uključujući orofaringealnu kandidijazu (infekcije koja zahvata unutrašnjost usta i grla), ezofagealnu kandidijazu (zahvata jednjak), kandiduriju (prisustvo *Candida*-e u mokraći) i hroničnu kandidijazu koja se javlja na prelazu kože u sluzokožu na telesnim otvorima
- hronične oralne atrofične kandidijaze (rane izazvane zubnom protezom) ukoliko higijena usne duplje ili lokalna terapija ne daju rezultate
- vaginalne kandidijaze (akutne gljivične infekcije vagine ili ponovne pojave ove infekcije), kada lokalna terapija nije prikladna
- balanitis (gljivične infekcije penisa) izazvanog kandidom, kada lokalna terapija nije odgovarajuća
- dermatomikoze (kožne infekcije) npr. atletsko stopalo, gljivična infekcija u obliku prstena, gljivična infekcija pregibnih površina, kožne infekcije kandidom koje zahtevaju sistemsku terapiju
- *Tinea unguinum* (onihomikoza, gljivična infekcija nokta, i/ili ležišta nokta) kada se primena drugih lekova smatra neodgovarajućom

Diflucan se primenjuje kod odraslih za sprečavanje:

- ponovne pojave kriptokoknog meningitisa kod pacijenata sa visokim rizikom od ponavljanja
- ponovne pojave orofaringealne ili ezofagealne kandidijaze kod pacijenata zaraženih HIV-om koji imaju visok rizik od ponovne pojave bolesti
- smanjenje učestalosti ponovne pojave vaginalne kandidijaze (4 ili više epizoda godišnje)
- infekcija koje izaziva *Candida* kod pacijenata sa produženom neutropenijom (smanjenim brojem jedne vrste belih krvnih zrnaca, kao što su pacijenti sa malignim oboljenjima krvi koji su na hemioterapiji ili pacijenti koji su imali transplantaciju matičnih ćelija).

Diflucan se primenjuje kod novorođenčadi rođenih u terminu, odojčadi, dece i adolescenata uzrasta od 0 do 17 godina:

- za lečenje kandidijaze sluznice usta i grla, invazivne kandidijaze, kriptokoknog meningitisa i sprečavanje ponovne pojave infekcija koje izaziva *Candida* ukoliko je imunski sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba.
- kao terapija održavanja u sprečavanju ponovne pojave kriptokoknog meningitisa kod dece sa visokim rizikom od ponovne pojave infekcije.

Terapija se može započeti pre nego što rezultati kultura i drugih laboratorijskih ispitivanja budu poznati; ali, kada ovi rezultati postanu dostupni, antiinfektivna terapija se mora uskladiti sa dobijenim rezultatima.

Treba uzeti u obzir zvanične smernice za odgovarajuću primenu antigljivičnih lekova.

## 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diflucan

**Lek Diflucan ne smete uzimati:**

- ako ste alergični (preosetljivi) na flukonazol ili na druge antigljivične lekove ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). Ovi simptomi uključuju: svrab, crvenilo kože ili otežano disanje.
- ako uzimate astemizol, terfenadin (antihistaminske lekove protiv alergija)
- ako uzimate cisaprid (koristi se za lečenje želudačnih tegoba)
- ako uzimate pimozyd (koristi se za lečenje mentalnih bolesti)
- ako uzimate hinidin (koristi se za lečenje srčanih aritmija)

- ako uzimate eritromicin (antibiotik koji se koristi za lečenje infekcije)
- ako uzimate amjodaron (koristi se za lečenje neujednačenih otkucaja srca – aritmija)

### Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Diflucan:

- ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima
- ako imate oboljenje srca, uključujući probleme sa srčanim ritmom
- ako imate izmenjene nivoe kalijuma, kalcijuma ili magnezijuma u krvi
- ako se razviju teške reakcije na koži (svrab, crvenilo kože ili otežano disanje)
- ako se razviju znaci insuficijencije nadbubrežnih žlezda; stanje u kojem nadbubrežne žlezde ne luče odgovarajuću količinu određenih steroidnih hormona, kao što je kortizol (hroničan ili dugotrajan umor, mišićna slabost, gubitak apetita, smanjenje telesne mase, abdominalni bol)

Diflucan ne treba primenjivati u terapiji površinskog gljivičnog oboljenja kose (*tinea capitis*) kod dece.

Lek Diflucan se ne može preporučiti za lečenje kriptokokoze na drugim mestima (npr. plućna i kožna kriptokokoza), kao ni u terapiji drugih formi endemskih mikoza.

### Drugi lekovi i Diflucan

Obavestite Vašeg lekara **odmah** ukoliko uzimate astemizol, terfenadin (antihistaminici za lečenje alergija), cisaprid (za lečenje želudačnih tegoba), pimizid (za lečenje mentalnih bolesti) ili hinidin (za lečenje srčanih aritmija) ili eritromicin (antibiotik za lečenje infekcije) ili amjodaron (koristi se za lečenje neujednačenih otkucaja srca – aritmija), pošto se navedeni lekovi ne smeju uzimati istovremeno sa lekom Diflucan (videti odeljak “Lek Diflucan ne smete uzimati”).

Neki lekovi menjaju dejstvo leka Diflucan. Recite Vašem lekaru, ako uzimate neki od dole navedenih lekova:

- rifampicin ili rifabutin (antibiotici za lečenje infekcija)
- alfentanil, fentanil (anestetici)
- amitriptilin, nortriptilin (za lečenje depresije)
- amfotericin B, vorikonazol (antigljivični lekovi)
- lekovi za razređivanje krvi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka (varfarin ili slični lekovi)
- benzodiazepini (midazolam, triazolam ili slični lekovi) koji se koriste u terapiji nesanicе i anksioznosti (uznemirenosti)
- karbamazepin, fenitoin (koriste se za lečenje epilepsije)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin i losartan (za lečenje hipertenzije - visokog krvnog pritiska)
- ciklosporin, everolimus, sirolimus ili takrolimus (za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa)
- ciklofosfamid, vinka alkaloidi (vinkristin, vinblastin ili slični lekovi) koji se koriste za lečenje karcinoma (raka)
- halofantrin (koristi se za lečenje malarije)
- statini (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin ili slični lekovi) koji se koriste za snižavanje visokog nivoа holesterola
- metadon (protiv bolova)
- celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - NSAID)
- oralni kontraceptivi
- prednizon (steroid)
- zidovudin (takođe nazvan i AZT); sakvinavir (koriste se za lečenje HIV-a)
- lekovi za terapiju šećerne bolesti kao što su hlorpropamid, glibenklamid, glipizid ili tolbutamid
- teofilin (koristi se za kontrolu astme)
- vitamin A (dodatak ishrani)
- ivakaftor (koristi se za lečenje cistične fibroze)

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

### **Uzimanje leka Diflucan sa hranom i pićima**

Diflucan se može uzimati sa ili bez hrane.

### **Trudnoća i dojenje**

Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što počnete da uzimate ovaj lek ukoliko ste trudni ili dojite, ukoliko mislite da ste trudni ili pokušavate da zatrudnite.

Ne treba da uzimate lek Diflucan ukoliko ste trudni, osim ako Vam je lekar rekao suprotno.

Možete nastaviti da dojite nakon unosa pojedinačne doze leka Diflucan od 200 mg.

Ne treba da nastavite sa dojenjem ukoliko uzimate ponovljenu dozu leka Diflucan.

### **Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama**

Prilikom upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama treba imati na umu da se povremeno mogu javiti vrtoglavica ili konvulzije.

### **Diflucan kapsule sadrže laktozu, monohidrat.**

Ukoliko imate netoleranciju na neke šećere, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara pre nego što uzmete ovaj lek.

## **3. Kako se uzima lek Diflucan**

**Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je lekar objasnio.** Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Progutajte kapsulu celu sa dovoljnom količinom vode. Najbolje je da uzimate kapsule svakog dana u isto vreme.

Preporučene doze leka Diflucan za lečenje različitih infekcija navedene su u sledećoj tabeli:

### **Odrasli**

<b>Indikacija</b>	<b>Doza</b>
Za lečenje kriptokoknog meningitisa	400 mg prvog dana a zatim 200 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 6 do 8 nedelja, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg
Za sprečavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa	200 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar kaže da prekinete terapiju
Za lečenje kokcidioidomikoze	200 mg do 400 mg jednom dnevno od 11 meseci do 24 meseca, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg
Za lečenje unutrašnjih gljivičnih infekcija čiji je uzročnik <i>Candida</i>	800 mg prvog dana, a zatim 400 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar kaže da prekinete terapiju
Za lečenje infekcija sluznica koje zahvataju unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom	200 mg do 400 mg prvog dana, a zatim 100 mg do 200 mg sve dok Vam lekar kaže da prekinete terapiju

Za lečenje gljivičnog oboljenja sluznica – doza zavisi od lokalizacije infekcije	50 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 7 do 30 dana sve dok Vam lekar kaže da prekinete terapiju
Za sprečavanje infekcija sluznica koje zahvataju unutrašnjost usta, grla	100 mg do 200 mg jednom dnevno, ili 200 mg 3 puta nedeljno, dok ste pod rizikom da dobijete infekciju
Za lečenje gljivičnih infekcija polnih organa	150 mg kao pojedinačna doza
Za sprečavanje ponovne pojave vaginalnog gljivičnog oboljenja	150 mg svakog trećeg dana do ukupno 3 doze (1., 4. i 7. dan) a zatim jednom nedeljno tokom 6 meseci dok ste pod rizikom da dobijete infekciju
Za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju	U zavisnosti od mesta infekcije, 50 mg jednom dnevno, 150 mg jednom nedeljno, 300 do 400 mg jednom nedeljno tokom 1 do 4 nedelje (za atletsko stopalo može trajati do 6 nedelja, za lečenje infekcija noktiju sve do potpune zamene inficiranog nokta)
Za sprečavanje infekcije koju izaziva <i>Candida</i> (ukoliko je imunski sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)	200 mg do 400 mg jednom dnevno dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

### Adolescenti uzrasta od 12 do 17 godina

Pridržavajte se doze koju Vam je propisao Vaš lekar (lekar Vam može propisati doze koje se primenjuju kod odraslih ili doze koje se primenjuju kod dece).

### Deca uzrasta do 11 godina

Maksimalna doza kod dece je 400 mg dnevno.

Doziranje se određuje u odnosu na telesnu masu deteta u kilogramima.

Indikacija	Dnevna doza
Gljivične infekcije sluznica i grla čiji je uzročnik <i>Candida</i> – doza i trajanje zavise od težine infekcije i lokalizacije infekcije	3 mg po kg telesne mase (6 mg po kg telesne mase može biti dato prvog dana)
Kriptokokni meningitis ili unutrašnje gljivične infekcije čiji je uzročnik <i>Candida</i>	6 mg do 12 mg po kg telesne mase
Za sprečavanje infekcije kod dece čiji je uzročnik <i>Candida</i> (ukoliko njihov imunski sistem ne funkcioniše kako treba)	3 mg do 12 mg po kg telesne mase

### Upotreba kod dece uzrasta od 0 do 4 nedelje

Upotreba kod dece uzrasta od 3 do 4 nedelje:

Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u dva dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg po kg telesne mase na svakih 48 sati.

Upotreba kod dece mlađe od 2 nedelje:

Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u tri dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg po kg na svaka 72 sata.

### Upotreba kod starijih pacijenata

Primenjuje se uobičajena doza za odrasle, osim ukoliko pacijent ima poremećaj funkcije bubrega.

## Upotreba kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega

Vaš lekar će prilagoditi dozu u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije bubrega.

### Ako ste uzeli više leka Diflucan nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Diflucan nego što bi trebalo, moguće je da ćete se loše osećati. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbliže odeljenje hitne pomoći. Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti halucinacije i paranoidno ponašanje (kada čujete, osećate i umišljate stvari koje nisu realne). U slučaju predoziranja, treba primeniti simptomatsku terapiju (uz suportivne mere i ispiranje želuca ako je potrebno).

### Ako ste zaboravili da uzmete lek Diflucan

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite, osim ako je vreme za uzimanje sledeće doze. Ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nemojte nadoknađivati propuštenu dozu, već samo nastavite sa redovnim uzimanjem leka.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

## 4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Kod malog broja pacijenata mogu se razviti **alergijske reakcije**, mada su ozbiljne alergijske reakcije retke. Ukoliko se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se lekaru ili farmaceutu, uključujući i neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu. Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma, **odmah** se javite Vašem lekaru:

- iznenadno sviranje u grudima, teškoće pri disanju ili stezanje u grudima
- oticanje očnih kapaka, lica ili usana
- svrab po celom telu, crvenilo kože ili pojava crvenih tačkica koje svrbe
- kožni osip
- teške kožne reakcije kao što je osip sa pojavom plikova (može se pojaviti u ustima i na jeziku).

Diflucan može uticati na jetru. Znaci koji ukazuju na probleme sa jetrom su:

- zamor
- gubitak apetita
- povraćanje
- žuta prebojenost kože i beonjača (žutica)

Diflucan može uticati na nadbubrežne žlezde i nivo izlučenih steroidnih hormona. Znaci koji ukazuju na problem sa nadbubrežnom žlezdom su:

- umor
- mišićna slabost
- gubitak apetita
- smanjenje telesne mase
- abdominalni bol

Ukoliko se dogodi bilo šta od navedenog, prekinite terapiju lekom Diflucan i **odmah** obavestite Vašeg lekara.

## Druga neželjena dejstva:

Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- glavobolja
- nelagodnost u želucu, proliv, mučnina, povraćanje
- povećanje vrednosti parametara funkcije jetre u laboratorijskim analizama (krvi porast enzima jetre alanin aminotransferaze, aspartat aminotransferaze)
- povećanje alkalne fosfataze u krvi
- osip

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- anemija (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca koji dovodi do bledila kože i može izazvati slabost ili nedostatak daha)
- smanjen apetit
- nesanica, pospanost
- konvulzije, vrtoglavica, nesvestica, osećaj golicanja, bockanja ili utnulosti, promene čula ukusa, vertigo (osećaj vrtenja)
- zatvor, otežano varenje, gasovi, suvoća usta
- bol u mišićima
- otežano oticanje žuči (holestaza), porast bilirubina i žuta prebojenost kože i beonjača (žutica)
- koprivnjača, svrab, pojačano znojenje, reakcije na koži koje se javljaju na istom mestu pri ponovljenoj primeni leka
- zamor, opšti osećaj pacijenta da se ne oseća dobro, groznica

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- agranulocitoza (smanjen broj jedne vrste belih krvnih zrnaca koji se nazivaju granulociti), leukopenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca koji se nazivaju leukociti), neutropenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca koji se nazivaju neutrofilima), a ova stanja dovode do povećanog rizika od infekcije; trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica, trombocita, koje pomažu u sprečavanju krvarenja)
- promene hemijskih parametara u krvi (visok nivo holesterola, masti)
- smanjena koncentracija kalijuma u krvi
- drhtavica
- promene na elektrokardiogramu (EKG), promena brzine otkucaja srca ili srčanog ritma
- insuficijencija (slabost) jetre, zapaljenje jetre i drugi poremećaji jetre
- alergijske reakcije (ponekad teške), uključujući široko rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože, ozbiljne kožne reakcije (toksična epidermalna nekroliza, *Stevens-Johnson-ov* sindrom, akutna generalizovana egzantemozna pustuloza, ekfolijativni dermatitis), otok lica ili angioedem (praćen otokom lica, usana ili vrata)
- gubitak kose

## Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije  
Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

## 5. Kako čuvati lek Diflucan

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Diflucan posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

## 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

### Šta sadrži lek Diflucan

Aktivna supstanca je flukonazol.

Jedna kapsula, tvrda sadrži flukonazol u dozi od 50 mg ili 150 mg.

Pomoćne supstance:

*Sadržaj kapsule:* laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat.

*Sastav kapsule:*

Kapa: želatin; titan-dioksid (E171); patent plavo V (E131)

Telo: želatin; titan-dioksid (E171); patent plavo V (E131) – samo za kapsule od 150 mg

*Crno mastilo za štampanje oznaka na kapsuli (S-1-27794 Opacode black ili TekPrint SW-9008 Black ink):*

šelak; gvožđe(III)-oksid, crni (E172); n-butanol; voda, prečišćena; propilenglikol; izopropilalkohol; industrijski metilovani alkohol; etanol, bezvodni; koncentrovani amonijum-hidroksid; kalijum-hidroksid.

### Kako izgleda lek Diflucan i sadržaj pakovanja

#### Izgled kapsula:

Diflucan 50 mg kapsula, tvrda: Tvrda želatinska kapsula N° 4, belog tela i svetlotirkiznoplave kape, sa crnom oznakom „Pfizer“ na kapi i „FLU-50“ na telu, koja sadrži prašak bele boje.

Diflucan 150 mg kapsula, tvrda: Tvrda želatinska kapsula N° 1, svetlotirkiznoplavog tela i kape, sa crnom oznakom „Pfizer“ na kapi i „FLU-150“ na telu, koja sadrži prašak bele boje.

#### Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje: PVC/aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje:

Diflucan 50 mg kapsula, tvrda: složiva kartonska kutija koja sadrži Uputstvo za lek i jedan blister sa 7 kapsula od 50 mg (ukupno 7 kapsula, tvrdih)

Diflucan 150 mg kapsula, tvrda: složiva kartonska kutija koja sadrži Uputstvo za lek i jedan blister sa 1 kapsulom od 150 mg (ukupno 1 kapsula, tvrda).



**Nosilac dozvole i proizvođač**

**Nosilac dozvole:** PREDSTAVNIŠTVO PFIZER H.C.P. CORPORATION, BEOGRAD, Trešnjiog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd

**Proizvođač:** FAREVA AMBOISE, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, Poce Sur Cisse, Francuska

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Januar, 2017.

**Režim izdavanja leka:**

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

**Broj i datum dozvole:**

Diflucan kapsula, tvrda 50 mg x 7: 515-01-02201-16-001 od 30.01.2017.

Diflucan kapsula, tvrda 150 mg x 1: 515-01-02202-16-001 od 30.01.2017.