



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije

---

**UPUTSTVO ZA LEK**

**Viranti; štapić za kožu; 50mg/g**  
**Pakovanje: uložak, 1x3g**

Proizvođač: **LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.**

Adresa: **Via Vicenza 67, 36015 Schio (VI) Italija**

Podnosilac zahteva: **ALVOGEN PHARMA D.O.O.**

Adresa: **Pašnjačka bb, Barice, Plandište**

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik  
**Viranti, 50mg/g, štapić za kožu**

INN: aciklovir

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.**

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Viranti, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje deset, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

**U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Viranti i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viranti
3. Kako se upotrebljava lek Viranti
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Viranti
6. Dodatne informacije

## 1. ŠTA JE LEK VIRANTI I ČEMU JE NAMENJEN

Viranti, štapić za kožu sadrži aktivnu supstancu aciklovir, i pripada grupi antivirusnih lekova za dermalnu upotrebu.

Lek Viranti je namenjen za lečenje "groznice" (infekcija usana i lica uzrokovanih herpes simpleks virusom). Lek Viranti treba primeniti što ranije, pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje i svrab) koji najčešće prethode izbijanju mehurića na koži. Takođe, ovaj lek se može koristiti da ubrza zaceljenje u slučaju da se "groznica" već pojavila.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIRANTI

### Lek Viranti ne smete koristiti:

- ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (druge sastojke ovog leka možete videti u tački 6).

### Kada uzimate lek Viranti, posebno vodite računa:

- Nemojte koristiti lek Viranti unutar usta, za lečenje ranica u ustima i u očima ili genitalnoj regiji.
- Izbegavajte dodirivanje "groznice" kako biste sprečili prenošenje infekcije ili njeno pogoršanje.
- Ako Vam je Vaš lekar rekao da imate oslabljen imuni sistem, obratite se svom lekaru pre lečenja bilo koje vrste infekcija
- Ako ste u nedoumici da li imate herpesnu infekciju ("groznicu") obratite se svom lekaru.
- Ako Vaša "groznica" postaje veoma ozbiljna, obratite se svom lekaru.

### Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koje ste nabavili bez lekarskog recepta.

Pri dermalnoj upotrebi leka koji sadrži aciklovir nisu zapažene interakcije sa drugim lekovima.

### Uzimanje leka Viranti sa hranom ili pićima

Nema posebnih napomena.

### Primena leka Viranti u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni ili dojite bebu, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.

---

## Uticaj leka Viranti na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji bi ukazivali da lek koji sadrži aciklovir a dermalno se upotrebljava, utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

### Važne informacije o nekim sastojcima leka Viranti

Viranti, štapić za kožu sadrži ricinusovo ulje koje može izazvati reakcije na koži.

Viranti, štapić za kožu sadrži butilhidroksitoluen koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis) ili iritaciju očiju i sluznica.

### 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIRANTI

Uvek koristite ovaj lek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako su Vam Vaš lekar ili farmaceut rekli. Ako niste sigurni kako da ga koristite, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

#### Lek Viranti može da se upotrebljava kod odraslih i dece:

- Nanesite lek što je pre moguće, pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje i svrab).
- Nanosite ga na obolelu površinu 5 puta dnevno (izostavljajući primenu u toku noći). Pri jednoj primeni potrebno je da lek Viranti, štapić za kožu 5 puta nanesete/premažete preko inficirane površine (ukupno 120mg stika).
- Lečenje lekom Viranti treba da traje najmanje 4 dana. Ako herpesni mehurići ("groznica") nisu zacelili nakon tog vremena, možete da nastavite njegovu primenu tokom još 6 dana (sve ukupno 10 dana od početka terapije).
- 
- Ako ne dođe do izlečenja nakon 10 dana primene leka, ili ako se u bilo kojem trenutku Vaše stanje pogorša, obratite se svom lekaru.
- Nikada nemojte da date svoj Viranti, štapić za kožu nekom drugom, čak i ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.
- Jedan štapić za kožu (3g) je dovoljan za lečenje groznice u trajanju od 5 dana. Pri nekoj narednoj pojavi "groznice", započnite lečenje pri pojavi prvih znakova "groznice" (kao što su peckanje ili svrab). Lečenje se može započeti i u kasnijoj fazi infekcije (kada nastanu mehurići).
- 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

#### **Ako ste uzeli više leka Viranti nego što je trebalo**

Ne primenjujte više leka Viranti, štapića za kožu od preporučenog načina primene.

#### **Ako ste zaboravili da uzmete lek Viranti**

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek, primenite ga čim se setite i nastavite sa njegovom primenom kao i ranije.

## **Ako naglo prestanete da uzimate lek Viranti**

Veoma je važno da se pridržavate preporučenog režima doziranja.

## **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih.

### **Prestanite sa primenom ovog leka i obratite se lekaru ako Vam se jave:**

- Alergijske reakcije, kao npr. oticanje usana, lica i očnih kapaka, koprivnjača. Ove reakcije se javljaju veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

Takođe se mogu javiti sledeća neželjena dejstva:

Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

Prolazno žarenje ili peckanje kože nakon primene, blaga suvoća kože ili perutanje kože, svrab.

Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- Crvenilo, kontaktni dermatitis (testovi osetljivosti su pokazali kako se češće radi o reakciji preosetljivosti na pomoćne supstance u preparatu nego na sam aciklovir).

### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije  
Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd  
Republika Srbija  
website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)  
e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

## **5. KAKO ČUVATI LEK VIRANTI**

Držati lek van pogleda i domašaja dece!

### **Rok upotrebe**

3 godine

Nemojte koristite ovaj lek posle isteka roka upotrebe označenog na kartonskoj kutiji i na štapiću nakon oznake „Važi do:“. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

### **Čuvanje**

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrtebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Šta sadrži lek Viranti**

- Aktivna supstanca je aciklovir.  
Viranti, 50mg/g štapić za kožu od 3 g sadrži 150mg aciklovira, dok 1 gram proizvoda sadrži 50 mg aciklovira.  
100g proizvoda odgovara 5% m/m aciklovira.  
Pomoćne supstance su: ricinusovo ulje, hladno ceđeno; polusintetski gliceridi; karnauba vosak; pčelinji vosak; oktildodekanol; parafin beli, meki; aroma vanile; butilhidroksitoluen (E321).

### **Kako izgleda lek Viranti i sadržaj pakovanja**

Viranti, 50mg/g, štapić za kožu je cilindričnog oblika, bele do svetlo žute boje, blagog mirisa na vanilu.  
Viranti, 50mg/g, štapić za kožu se nalazi u polistirenskom ulošku sa odvijanjem od acetalne smole. Uložak se zatvara plastičnom kapičicom.

*Veličina pakovanja:* Jedan uložak sa štapićem za kožu se nalazi u kartonskoj kutiji.

### **Nosilac dozvole i Proizvođač:**

**Nosilac dozvole:** ALVOGEN PHARMA D.O.O, Pašnjačka bb, 26367 Barice, Plandište

**Proizvođač:** LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L., Via Vicenza 67, Schio (VI) Italija

### **Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Septembar, 2015.

### **Režim izdavanja leka:**

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

### **Broj i datum dozvole:**

515-01-03897-14-003 od 03.11.2015.