



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije

---

### **UPUTSTVO ZA LEK**

**HEMOKULIN<sup>®</sup>**, kapi za oči, rastvor, 0.03%  
**Pakovanje:** bočica, 1x10 mL

Proizvođač: Hemomont d.o.o.  
Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora  
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.  
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

**HEMOKULIN<sup>®</sup>**, kapi za oči , rastvor; 0.03%  
**INN:** nafazolin

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.**

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

**U ovom uputstvu pročitacete:**

Šta je lek Hemokulin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemokulin

Kako se upotrebljava lek Hemokulin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Hemokulin

Dodatne informacije

## 1. ŠTA JE LEK HEMOKULIN I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Hemokulin sadrži aktivnu supstancu nafazolin, koja pripada grupi vazokonstriktora. Vazokonstriktori su lekovi koji dovode do skupljanja krvnih sudova. Lek Hemokulin skuplja krvne sudove na mestu primene i time, smanjuje postojeće crvenilo i/ili otok u predelu oka.

Hemokulin kapi za oči se primenjuju za privremeno simptomatsko uklanjanje crvenila koje nastaje usled manjih iritacija oka.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMOKULIN

Lek Hemokulin se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.

### ***Lek Hemokulin ne smete koristiti:***

- ukoliko ste preosetljivi/alergični na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu leka (videti deo *Šta sadrži lek Hemokulin*)
- ukoliko imate glaukom zatvorenog ugla (glaucoma angulare),
- ukoliko ste imali operaciju oka ili bolujete od nekog teškog oboljenja oka.

### **Kada uzimate lek Hemokulin, posebno vodite računa:**

Recite Vašem lekaru pre primene leka ako :

- imate srčano oboljenje, povišeni krvni pritisak, dijabetes (šećernu bolest), hipertireoidizam (pojačano lučenje hormona štitne žlezde) ili depresiju;
- uzimate inhibitore monoamino oksidaze (MAO) ili ste ih uzimali u prethodnom periodu od dve nedelje;
- imate infekciju ili povredu oka.

Treba da razgovarate sa Vašim lekarom ukoliko se tokom upotrebe kapi javi jak bol u oku, promene u vidu ili sekret iz oka, ili se Vaše stanje pogorša.

Kontaktna sočiva treba skinuti pre svake primene leka i vratiti ih najranije nakon 15 minuta!

Nakon primene kapi za oči pažljivo pritiskajte unutrašnji ugao oka u trajanju od jednog minuta. Ovaj postupak je neophodan da ne bi kapi za oči otekle u nos i grlo preko suznog kanala.

Ukoliko primena leka Hemokulin ne dovede do poboljšanja stanja nakon 2 dana lečenja ili dodje do pogoršanja postojećih simptoma, odmah se obratite lekaru.

### **Primena drugih lekova**

Obavestite svog lekara ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate:

- lekove koji se primenjuju lokalno (u oko) u terapiji povišenog očnog pritiska (glaukom);
- inhibitore monoamino oksidaze (MAO);
- lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska;
- lekove koji se koriste u terapiji srčane slabosti (kardiotonični glikozidi);
- kvinidin (antiaritmik);
- lekove koji se koriste u terapiji depresije (triciklične antidepressive).

### **Uzimanje leka Hemokulin sa hranom ili pićima**

Hemokulin je preparat za lokalnu primenu, tako da uzimanje hrane ili pića ne utiče na efekat ovog leka.

### **Primena leka Hemokulin u periodu trudnoće i dojenja**

Ukoliko ste trudni ili dojite, razgovarajte sa Vašim lekarom pre primene leka Hemokulin, kapi za oči. Bezbednost primene nafazolina tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena.

Iako je koncentracija nafazolina u kapima niska, pa postoji mala veovatnoća da on u značajnim koncentracijama dospe u sistemsku cirkulaciju i zatim, do fetusa i u majčino mleko, ovaj preparat se tokom trudnoće i dojenja može primeniti samo ako je to neophodno i isključivo po savetu lekara.

### **Uticaj leka Hemokulin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

Nema podataka da nafazolin može uticati na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

### **Važne informacije o nekim sastojcima leka Hemokulin**

Ovaj preparat sadrži benzalkonijum hlorid koji može izazvati iritaciju oka. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Kontaktna sočiva treba skinuti pre svake upotrebe leka i vratiti ih najranije nakon 15 minuta. Poznato je da benzalkonijum hlorid menja boju mekih kontaktnih sočiva.

## **3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOKULIN**

Uzimajte lek Hemokulin tačno kako Vam je lekar preporučio. Vaš lekar će Vam reći koliko često treba da uzimate Hemokulin kapi za oči i koliko kapi ćete ukapati pri svakoj primeni. Nikada ne uzimajte više kapi ili duži vremenski period nego što Vam je Vaš lekar preporučio.

Lek mogu da upotrebljavaju odrasli i deca koja su starija od 12 godina. Ne treba koristiti rastvor koji je zamućen ili koji je promenio boju. Ako nosite kontaktna sočiva neophodno je da ista skinete pre korišćenja leka. Strogo treba paziti da se rastvor ne kontaminira (vrh bočice ne treba dirati prstima niti ga, pak, treba oslanjati na strukture oka!).

Uobičajena primena podrazumeva ukapavanje 1-2 kapi u donji očni kapak do četiri puta dnevno. Preporučena

dužina trajanja lečenja je 3-4 dana. Ako posle 48 časova nema poboljšanja simptoma Vaše bolesti, terapiju treba prekinuti i treba se javiti svom lekaru.

*Hemokulin kapi za oči, treba primeniti na sledeći način:*

Operite ruke, uzmite bočicu iz kutije, skinite zatvarač, pažljivo povucite donji kapak i ukapajte kapi za oči u donji kapak u količini koju Vam je preporučio Vaš lekar. Pažljivo pritiskajte unutrašnji ugao oka u trajanju od jednog minuta. Ovaj postupak je neophodan da ne bi kapi za oči otekle u nos i grlo preko suznog kanala.

#### **Ako ste uzeli više leka Hemokulin nego što je trebalo**

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

#### **Ako ste zaboravili da uzmete lek Hemokulin**

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

#### **Ako naglo prestanete da uzimate lek Hemokulin**

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

#### **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Kao i svi lekovi i Hemokulin može imati neželjena dejstva.

Na početku lečenja, ukapavanje leka može pojačati crvenilo i peckanje u oku. Ove pojave su prolazne i, obično, ne zahtevaju prekid lečenja.

Crvenilo oka može se pojačati ako lek neprekidno upotrebljavate duže vremena. Samo u retkim slučajevima može doći do suzenja oka, širenja zenica, zamagljenja vida i povećanja očnog pritiska.

*U slučaju pojave nekog od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite Vašem lekaru:*

- mučnina, pojačano znojenje, ošamućenost, pospanost, glavobolja i sniženje telesne temperature.

*Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija leka Hemokulin, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta*

#### **5. KAKO ČUVATI LEK HEMOKULIN**

*Držite lek Hemokulin van domašaja dece!*

#### **Rok upotrebe**

2 (dve) godine (neotvorena bočica). Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.  
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka iznosi 28 dana.

### Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 30° C. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.  
Nakon otvaranja bočice, čuvati na sobnoj temperaturi.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.  
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Šta sadrži lek Hemokulin

#### Aktivne supstance su:

1 mL kapi sadrži:  
Nafazolin-hidrochlorid .....0,3 mg

#### Ostali sastojci su:

- Benzalkonijum-hlorid;
- Dinatrijum-edetat;
- Natrijum-hlorid;
- Borna kiselina;
- Boraks;
- Voda za injekcije.

### Kako izgleda lek Hemokulin i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor.

Bočica od bezbojnog stakla sa 10 mL rastvora koja je zatvorena gumenim zatvaračem preko koga se nalazi aluminijumska kapica. U posebnoj kesici nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem koja služi za doziranje leka.

### Nosilac dozvole i Proizvođač

#### Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

#### Proizvođač

Hemomont d.o.o., ul. Ilije Plamenca bb, Podgorica, CG

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Jul 2012.

**Režim izdavanja leka:**

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

**Broj i datum dozvole:**

515-01-0444-12-001 od 17.08.2012.