



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

UPUTSTVO ZA LEK

HLORAMKOL[®], mast za oči, 1 %
Pakovanje: tuba; 1 x 5g

Proizvodač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnositelac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

HLORAMKOL[®], 1 %, mast za oči

INN: hloramfenikol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek HLORAMKOL i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HLORAMKOL
3. Kako se upotrebljava lek HLORAMKOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek HLORAMKOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek HLORAMKOL sadrži hloramfenikol. On pripada grupi lekova poznatoj kao antibiotici. Deluje tako što sprečava rast bakterija, pomažući tako Vašem organizmu da se bori sa infekcijom.

Koristi se za lečenje infekcija očiju i kapaka izazvanih bakterijama (bakterijski konjunktivitis). Znaci infekcije su bol, crvenilo ili zapaljenje očiju, pojačana sekrecija i stvaranje naslaga (krmelja) na ivici kapaka.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HLORAMKOL

Lek HLORAMKOL ne smete koristiti ukoliko:

- ste alergični (preosetljivi) na hloramfenikol ili bilo koji drugi sastojak leka. Znaci alergijske reakcije mogu biti: ospa, otežano gutanje i teškoće sa disanjem, otok usana, lica, grla, jezika, pogoršanje crvenila, svrab ili otok oka ili kapka.
- ukoliko Vi (ili neko od Vaših krvnih srodnika) imate ili ste imali oboljenje krvi (krvne diskrazije), uključujući i aplastičnu anemiju (nedostatak svih formiranih elemenata krvi usled nesposobnosti kostne srži da stvara krvne ćelije).

Kada uzimate lek HLORAMKOL posebno vodite računa ukoliko:

- imate poremećaj vida
- imate jak bol u oku
- imate fotofobiju (preosetljivost oka na svetlost, koja se ispoljava neprijatnošću ili bolom u očima prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti ili veštačkom izvoru svetlosti)
- imate zapaljenje oka sa pojavom ospe po poglavini i licu
- Vam oko izgleda „zamućeno”



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

- Vam zenica oka ima neuobičajen izgled
- imate osećaj stranog tela u oku
- ste skoro imali konjunktivitis (zapaljenje vežnjače)
- imate glaukom
- Vaše oči ''stvaraju'' manju količinu suza (imate sindrom suvog oka)
- ste u poslednjih 6 meseci imali operaciju na oku ili lasersku terapiju
- imate povredu oka
- već koristite druge kapi ili masti za oči
- nosite kontaktna sočiva. Potrebno je da skinete sočiva pre početka primene leka i ne bi trebalo da ih koristite sve vreme trajanja lečenja. Sočiva stavite ponovo 24 sata nakon poslednje primene leka.

Ukoliko Vam se posle dva dana primene masti stanje ne poboljša ili se u bilo kom trenutku pogorša obavezno se javite Vašem lekaru.

Lek HLORAMKOL mast za oči ne treba primenjivati duže od 5 dana, osim ukoliko Vam je lekar drugačije propisao. Producenu upotrebu masti treba izbegavati, jer može doći do pojave preosetljivosti i razvoja mikroorganizama koji su neosetljivi na hloramfenikol.

Primena drugih lekova

Recite svome lekaru ako koristite bilo koji lek, uključujući i one koji se kupuju bez recepta, pa i biljne preparate, jer lek HLORAMKOL može imati uticaja na druge lekove, ali i drugi lekovi mogu uticati na lek HLORAMKOL. Posebno naglasite ukoliko koristite:

- lekove za lečenje raka
- lekove za supresiju (slabljenje) imunog sistema, kao npr. azatioprin.

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Primena leka HLORAMKOL u periodu trudnoće i dojenja

U toku perioda trudnoće i dojenja se ne preporučuje upotreba leka HLORAMKOL masti za oči.

Pre upotrebe leka HLORAMKOL recite svome lekaru ukoliko ste trudni, postoji mogućnost da ostanete trudni ili mislite da ste trudni.

Ne bi trebalo da dojite ukoliko koristite lek HLORAMKOL, jer male količine leka prelaze u majčino mleko.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka HLORAMKOL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lek HLORAMKOL može dovesti do prolaznog zamućenja vida. Ukoliko Vam je vid zamućen, ne upravljajte motornim vozilima i ne rukujte mašinama sve dok Vam vid ne postane jasan.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Važne informacije o nekim sastojcima leka HLORAMKOL

Lek HLORAMKOL kao pomoćne supstance sadrži cetilalkohol i lanolin, koji mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HLORAMKOL

Lekar će odrediti potrebnu dozu i dužinu trajanja terapije. Ne prekidajte lečenje sve dok Vam lekar ne kaže da to učinite. Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili suviše jako deluje na Vaš organizam, obavestite Vašeg lekara.

Trajanje lečenja

Lek HLORAMKOL mast za oči ne treba primenjivati duže od 5 dana, osim ukoliko Vam je lekar drugačije propisao.

Način primene

- operite ruke
- skinite poklopac sa tube
- zabacite glavu unazad i povucite naniže donji kapak
- istisnite oko 1 cm masti u unutrašnjost donjeg kapka bez dodirivanja oka
- zatvorite oko
- obrišite višak masti čistom maramicom
- čim završite sa primenom masti vratite poklopac nazad na tubu.

Doziranje

Odrasli, stariji i deca starija od 2 godine

- stavljajte mast u oko (oči) 3-4 puta svakog dana
- ukoliko preko dana koristite kapi hloramfenikola, mast možete koristiti samo noću
- ukoliko Vam se simptomi ne poboljšaju u roku od 2 dana obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu
- nastavite da koristite lek HLORAMKOL 5 dana i u slučaju da Vam se simptomi poboljšaju.

Ako ste zaboravili da uzmete lek HLORAMKOL

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmetite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite preskočenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek HLORAMKOL

Nastavite sa korišćenjem leka 5 dana i u slučaju poboljšanja stanja. Nemojte prestati sa korišćenjem leka čak iako Vam se stanje popravlja. Ukoliko ranije prestanete sa korišćenjem leka može se desiti da Vam se infekcija vrati.

Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka HLORAMKOL obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek HLORAMKOL, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite sa korišćenjem leka HLORAMKOL mast za oči i javite se Vašem lekaru što je pre moguće:

- promene po koži, kao što su ospa ili svrab oko očiju ili pojačano crvenilo očiju
- izraženja pojave modrica (od uobičajenog); češća i lakša pojавa infekcija nego inače; osećaj umora i slabosti.

Recite Vašem lekaru ukoliko neko od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana:

- bockanje ili peckanje u oku. Ovo bi trebalo da traje kratko i da se javi neposredno nakon stavljanja masti.

Neposredno nakon primene leka možete imati zamućen vid.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK HLORAMKOL

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

3 (tri) godine.

Nakon otvaranja, tubu čuvati na sobnoj temperaturi i mast iskoristiti u roku od 28 dana.

Nemojte koristiti lek HLORAMKOL posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Nakon otvaranja, tubu čuvati na sobnoj temperaturi i mast iskoristiti u roku od 28 dana.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek HLORAMKOL

HLORAMKOL, 1 %, mast za oči

Aktivne supstance su:

1 g masti za oko sadrži:
hloramfenikol 10 mg

Ostali sastojci su: parafin, beli, meki; parafin, tečni, laki; cetilalkohol; lanolin.

Kako izgleda lek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja

HLORAMKOL, 1 %, mast za oči
Poluprovidna mast žućkaste boje.
Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem sa 5 g masti za oči.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Proizvođač
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2013.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

HLORAMKOL, 1 %, mast za oči: 515-01-5986-12-001 od 26.02.2013.