



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

UPUTSTVO ZA LEK

STANICID (fusidinska kiselina), **impregnirana kompres**a, 30 mg
Pakovanje: aluminijumska folija, 1 x 10 impregniranih kompres

Proizvođač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

STANICID, 30 mg, impregnirana kompresa

INN: fusidinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek STANICID i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek STANICID
3. Kako se upotrebljava lek STANICID
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek STANICID
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK STANICID I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek STANICID sadrži kao aktivni sastojak natrijum-fusidat, koji pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici. Koristi se u lečenju stanja u kojima je koža inficirana bakterijama, kao što su:

- impetigo (pojava bistrih mehurića koji se brzo zamute i sasue u kraste žučkaste boje)
- infektivni dermatitis (zapaljenje kože)
- inficirane posekotine i ogrebotine

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STANICID

Lek STANICID ne smete koristiti:

- ako ste alergični (preosetljivi) na fusidinsku kiselinu ili na druge sastojke u preparatu (*videti odeljak 6*).
- ako imate infekciju izazvanu nekim neosetljivim mikroorganizmom, posebno sa *Pseudomonas aeruginosa*

Kada uzimate lek STANICID, posebno vodite računa:

- ako lek primenjujete u blizini očiju
- ako lek primenjujete tokom dužeg vremenskog perioda, s obzirom da se tada povećava mogućnost pojave neželjenih efekata. Takođe, Vaša koža može postati osetljiva na primenu ovog leka.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka STANICID sa hranom ili pićima

Nije relevantno.

Primena leka STANICID u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, ili dojite, obratite se Vašem lekaru.

Uticao leka STANICID na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lek STANICID ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Ukoliko osetite bilo koje neželjeno dejstvo koje može da vas spreči da vozite i rukujete mašinama konsultujte se sa vašim lekarom.

Važne informacije o nekim sastojcima leka STANICID

STANICID impregnirana kompresa sadrži lanolin i cetilalkohol koji mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis). Ukoliko do toga dođe, obratite se Vašem lekaru.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STANICID

Lek STANICID uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.



STANICID impregnirana kompresa

Pre nanošenja STANICID impregnirane komprese (gaze) na kožu, rana mora prethodno biti očišćena odgovarajućim sterilnim rastvorom, kao što je npr. fiziološki rastvor.

Odseći željenu veličinu gaze i naneti na obolelu površinu (videti na slici).

STANICID gaza je u omotu koji obezbeđuje sterilnost, deljenje i aseptično nanošenje (sprečava se unošenje mikroorganizama na ranu prilikom aplikacije leka).

STANICID gaza je porozna, masna, ne lepi se za ranu i ne oštećuje granulacije (ново stvoreno mlado vezivno tkivo koje se stvara prilikom obnavljanja oštećenog tkiva). Preko nje se postavlja obična gaza i fiksira na odgovarajući način.

Učestalost zamene sterilne gaze zavisi isključivo od prirode rane, i to će odrediti Vaš lekar

Ako ste uzeli više leka STANICID nego što je trebalo

Nisu zabeleženi slučajevi trovanja nakon lokalne primene STANICID preparata prema priloženom uputstvu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek STANICID

Nije relevantno.

Ako naglo prestanete da uzimate lek STANICID

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek STANICID, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

U slučaju pojave nekih od sledećih simptoma, odmah se obratite lekaru, s obzirom da može biti u pitanju reakcija preosetljivosti:

- otežano disanje
- oticanje lica ili grla
- pojava ospe po koži

Druga moguća neželjena dejstva su:

- svrab, sitnozrnasta ospa, zapaljenje kože i iritacija (uključujući bol, bockanje, osećaj paljenja i crvenilo) na mestu primene
- koprivnjača
- angioedem (otok na koži)
- ekcem
- periorbitalni edem (otok u blizini oka)
- konjunktivitis (zapaljenje vežnjače oka)
- hipersenzitivnost

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK STANICID

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

3 godine.

Nemojte koristiti lek STANICID posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Čuvati u horizontalnom položaju na temperaturi do 25°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek STANICID

Aktivne supstance su:

STANICID, impregnirana kompres, 30 mg/kom
1 sterilna gaza (10x10 cm) impregnirana sa 1,5 g masti sadrži:
natrijum-fusidat 30 mg

Ostali sastojci su:

STANICID, impregnirana kompres, 30 mg/kom:

- cetilalkohol
- lanolin
- parafin, tečni
- parafin beli, meki
- gaza

Kako izgleda lek STANICID i sadržaj pakovanja

STANICID, impregnirana kompres, 30 mg/kom

Bela gaze 10 x 10cm, impregnirani glatkom, homogenom mašću bledo-žute boje.

STANICID gaza je sa svake strane obložena zaštitnim pergament papirom i zatopljena u kesici od aluminijumske folije.

Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

STANICID, impregnirana kompres, 10 x 30 mg/kompresi: 515-01-6857-10-001 od 18.10.2011.