



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije

---

**UPUTSTVO ZA LEK**

**STANICID** (fusidinska kiselina), **mast**, 2%  
Pakovanje: tuba, 1 x 10g

Proizvođač: Hemofarm A.D.  
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija  
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.  
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

## **STANICID, 2%, mast**

INN: fusidinska kiselina

### **Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.**

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

### **U ovom uputstvu pročitćete:**

1. Šta je lek STANICID i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek STANICID
3. Kako se upotrebljava lek STANICID
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek STANICID
6. Dodatne informacije

## **1. ŠTA JE LEK STANICID I ČEMU JE NAMENJEN?**

Lek STANICID sadrži kao aktivni sastojak natrijum-fusidat, koji pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici. Koristi se u lečenju stanja u kojima je koža inficirana bakterijama, kao što su:

- impetigo (pojava bistrih mehurića koji se brzo zamute i sasuše u kraste žučkaste boje)
- infektivni dermatitis (zapaljenje kože)
- inficirane posekotine i ogrebotine

## **2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STANICID**

### **Lek STANICID ne smete koristiti:**

- ako ste alergični (preosetljivi) na fusidinsku kiselinu ili na druge sastojke u preparatu (*videti odeljak 6*).
- ako imate infekciju izazvanu nekim neosetljivim mikroorganizmom, posebno *Pseudomonas aeruginosa*

### **Kada uzimate lek STANICID, posebno vodite računa:**

- ako lek primenjujete u blizini očiju
- ako lek primenjujete tokom dužeg vremenskog perioda, s obzirom da se tada povećava mogućnost pojave neželjenih efekata. Takođe, Vaša koža može postati preosetljiva na ovaj lek.

## **Primena drugih lekova**

*Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.*

## **Uzimanje leka STANICID sa hranom ili pićima**

Nije relevantno.

## **Primena leka STANICID u periodu trudnoće i dojenja**

*Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.*

Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, ili dojite, obratite se Vašem lekaru.

## **Uticaj leka STANICID na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

Lek STANICID ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Ukoliko osetite bilo koje neželjeno dejstvo koje može da vas spreči da vozite i rukujete mašinama konsultujte se sa vašim lekarom.

## **Važne informacije o nekim sastojcima leka STANICID**

STANICID mast sadrži lanolin i cetilalkohol koji mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktne dermatitis). Ukoliko do toga dođe, obratite se Vašem lekaru.

## **3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STANICID**

*Lek STANICID uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.*

STANICID mast se nanosi isključivo na kožu. Nemojte je gutati. Nije namenjena za unutrašnju upotrebu.

STANICID mast se može primenjivati sa ili bez zavoja. STANICID mast se u maloj količini nanosi na obolelo mesto 3 do 4 puta dnevno (ređe ako se primenjuje sa zavojem), dok se ne postignu zadovoljavajući rezultati. Imajte na umu da se pelena kod bebe takođe ponaša kao zavoj.

Uvek operite ruke pre nanošenja STANICID masti. Blago utrljajte mast u kožu. Ukoliko nanosite mast na kožu lica, obratite pažnju da mast ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko do toga ipak dođe (može se javiti bockanje i bol u oku), isperite oči hladnom vodom. Ako se bol u oku nastavi ili imate problema sa vidom, odmah se obratite lekaru.

Nakon nanošenja STANICID masti, uvek operite ruke, sem ako mast nanosite na ruke.

### **Ako ste uzeli više leka STANICID nego što je trebalo**

Nisu zabeleženi slučajevi trovanja nakon lokalne primene STANICID preparata prema priloženom uputstvu. Ukoliko nehotično progutate malu količinu kreme, malo je verovatno da će to štetno uticati na vas. Ukoliko progutate veliku količinu kreme kontaktirajte vašeg lekara ili farmaceuta.

### **Ako ste zaboravili da uzmete lek STANICID**

Ako ste zaboravili da primenite lek STANICID, primenite ga čim se setite. Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom režimu.

### **Ako naglo prestanete da uzimate lek STANICID**

Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da primenjujete lek STANICID. Nemojte da prestanete sa primenom leka STANICID bez savetovanja sa lekarom, čak iako primećujete poboljšanje.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

## **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Lek STANICID, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

U slučaju pojave nekog od sledećih simptoma, odmah se obratite lekaru, s obzirom da može biti u pitanju reakcija preosetljivosti:

- otežano disanje
- oticanje lica ili grla
- pojava ospe po koži

Druga moguća neželjena dejstva su:

- svrab, sitnozrnasta ospa, zapaljenje kože i iritacija (uključujući bol, bockanje, osećaj paljenja i crvenilo) na mestu primene
- koprivnjača
- angioedem (otok na koži)
- ekcem
- periorbitalni edem (otok u blizini oka)
- konjunktivitis (zapaljenje vežnjače oka)
- hipersenzitivnost

*Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.*

## 5. KAKO ČUVATI LEK STANICID

*Čuvati van domašaja i vidokruga dece!*

### **Rok upotrebe:**

3 godine.

Nemojte koristiti lek STANICID posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

### **Čuvanje:**

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### **Šta sadrži lek STANICID**

#### **Aktivne supstance su:**

*STANICID, mast, 2%:*

1 g masti sadrži:

natrijum-fusidat            20 mg

#### **Ostali sastojci su:**

*STANICID, mast, 2%:*

- cetilalkohol
- lanolin
- parafin, tečni
- parafin, meki

### **Kako izgleda lek STANICID i sadržaj pakovanja**

*STANICID, mast, 2%:*

Providna, homogena mast, blede žute boje.

Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem.

### **Nosilac dozvole i proizvođač**

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

### **Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Avgust, 2011.

### **Režim izdavanja leka:**

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

### **Broj i datum dozvole:**

Broj i datum dozvole za lek Stanicid; 2%; mast 10g: 515-01-6858-10-001 od 18.10.2011.