



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije

---

### **UPUTSTVO ZA LEK**

#### **Marocen<sup>®</sup>, 250 mg, film tablete**

*Pakovanje: ukupno 10 kom, blister; 1 x 10 film tableta*

#### **Marocen<sup>®</sup>, 500 mg, film tablete**

*Pakovanje: ukupno 10 kom, blister; 1 x 10 film tableta*

Proizvođač: HEMOFARM A.D.  
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija  
Podnosilac zahteva: HEMOFARM A.D.  
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

**Marocen<sup>®</sup>, 250 mg, film tablete**

**Marocen<sup>®</sup>, 500 mg, film tablete**

INN: ciprofloksacin

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.**

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

**U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Marocen film tablete i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Marocen film tablete
3. Kako se upotrebljava lek Marocen film tablete
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Marocen film tablete
6. Dodatne informacije

## 1. ŠTA JE LEK MAROCEN I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek Marocen je antibiotik iz grupe fluorohinolona. Aktivni sastojak je ciprofloksacin. Ciprofloksacin deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija. Deluje samo na određene vrste bakterija.

### *Odrasli*

Kod odraslih pacijenata lek Marocen se koristi u sledećim stanjima:

- infekcije disajnih puteva
- infekcije ušiju ili sinusa koje dugo traju ili se često ponavljaju
- infekcije mokraćnih puteva
- infekcije genitalnih (polnih) organa kod žena i muškaraca
- infekcije organa za varenje i intraabdominalne infekcije
- infekcije kože i mekih tkiva
- infekcije kostiju i zglobova
- sprečavanje infekcija izazvanih bakterijom *Neisseria meningitidis*
- izlaganje udisanju antraksa.

Lek Marocen se može koristiti za lečenje pacijenata sa sniženim brojem belih krvnih zrnaca (sa neutropenijom) koji imaju groznicu, za koju se sumnja da je posledica infekcije.

Ukoliko imate težak oblik infekcije ili infekciju koja je izazvana sa više od jedne vrste bakterija, lekar Vam može pored leka Marocen dati još neki antibiotik.

### *Deca i adolescenti*

Kod dece i adolescenata lek Marocen se, pod nadzorom lekara specijaliste, koristi za lečenje sledećih bakterijskih infekcija:

- infekcije pluća i bronhija kod dece i adolescenata obolelih od cistične fibroze
- komplikovanih infekcija mokraćnih puteva, uključujući i infekcije bubrega (pijelonefritis)
- izlaganje udisanju antraksa.

Pored pomenutih, lek Marocen se, ukoliko lekar smatra da je to neophodno, može koristiti i za lečenje drugih teških oblika infekcija.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAROCEN

### **Lek Marocen ne smete koristiti:**

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu, druge antibiotike iz grupe hinolona ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka (*Videti odeljak 6*)
- ukoliko uzimate lek tizanidin (lek koji se koristi za opuštanje mišića) (*Videti odeljak 2: Primena drugih lekova*)

### **Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa:**

- ukoliko ste imali problema sa bubrezima, jer Vam u tom slučaju lekar može smanjiti dozu leka
- ukoliko imate epilepsiju ili neke druge neurološke probleme

- ukoliko ste ranije, prilikom upotrebe antibiotika, kao što je ciprofloksacin, imali problema sa tetivama
- ukoliko ste dijabetičar (imate šećernu bolest), jer možete biti u riziku od pojave hipoglikemije (snižene vrednosti šećera u krvi)
- ukoliko imate miasteniju gravis (bolest koju karakteriše slabost mišića), jer se simptomi bolesti mogu pogoršati
- ukoliko imate probleme sa srcem. Lek Marocen sa oprezom treba koristiti ukoliko imate ili neko od Vaših krvnih srodnika ima urođeno produžen QT interval (što se može videti na EKG-u), imate disbalans (poremećene vrednosti) soli u krvi (posebno nizak nivo kalijuma ili magnezijuma u krvi), imate usporen rad srca (tzv. „bradikardiju“), imate slabost srca (srčanu insuficijenciju), imali ste srčani udar (infarkt miokarda), ukoliko ste osoba ženskog pola ili ste starije životne dobi ili uzimate druge lekove koji mogu dovesti do poremećaja srca, što se može videti kao poremećaj na EKG-u (*Videti odeljak: Primena drugih lekova*)
- obavestite lekara ukoliko Vi ili neko od Vaših krvnih srodnika ima deficit glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, zbog povećanog rizika od anemije ukoliko se koristi ciprofloksacin.

Za lečenje pojedinih infekcija genitalnog trakta, lekar Vam može pored ciprofloksacina propisati još neki antibiotik. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma nakon 3 dana lečenja, obratite se lekaru.

#### *Dok ste na terapiji lekom Marocen*

Ukoliko Vam se dok uzimate lek Marocen desi bilo šta od dole navedenog odmah se javite Vašem lekaru.

Lekar će odlučiti da li treba da prekinete sa uzimanjem leka Marocen.

- iznenadna pojava teškog oblika alergijske reakcije (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Čak i prilikom uzimanja prve doze leka, postoji mala verovatnoća da Vam se javi ozbiljna alergijska reakcija sa sledećim simptomima: stezanje u grudima, ošamućenost, mučnina ili nesvestica ili vrtoglavica prilikom ustajanja. U ovom slučaju *-prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru.*
- ponekad se može javiti bol i otok u zglobovima i upala tetiva, posebno ukoliko ste starije životne dobi ili se istovremeno lečite kortikosteroidima. Upala i ruptura (pucanje) tetiva se može javiti čak i u prvih 48 sati terapije, ali i do nekoliko meseci nakon završetka terapije. U slučaju pojave prvog znaka bola ili upale zgloba, prekinite sa uzimanjem leka. Zahvaćeni deo tela mora da miruje. Izbegavajte nepotrebnu fizičku aktivnost, jer to može povećati rizik od rupture (pucanja) tetive.
- ukoliko imate epilepsiju ili druge neurološke poremećaje, kao što su ishemija mozga (slaba prokrvljenost mozga) ili moždani udar, možete imati neželjena dejstva kao posledicu nadražaja centralnog nervnog sistema. Ukoliko Vam se ovo dogodi- *prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru.*
- mogu Vam se javiti psihijatrijski poremećaji nakon prvog uzimanja leka. Ukoliko bolujete od depresije ili psihoze, može doći do pogoršanja Vaših simptoma nakon uzimanja leka. U retkim slučajevima, depresija ili psihoza može napredovati i dovesti do pojave misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili izvršenja samoubistva. Ukoliko Vam se javi pogoršanje simptoma- *prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru.*
- mogu Vam se javiti znaci neuropatije, kao što su bolovi, žarenje, bockanje, utrnulost i/ili slabost. Ukoliko Vam se ovo dogodi- *prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru.*

- hipoglikemija je prijavljena najčešće kod pacijenata koji imaju šećernu bolest, pretežno kod starih. Ako se ovo desi, odmah se obratite svom lekaru.
- možete dobiti dijareju (proliv) u toku ili čak nekoliko nedelja nakon prestanka korišćenja leka Marocen. Ukoliko imate težak oblik dijareje ili dijareja dugo traje ili primetite da stolica ima primesa krvi ili sluzi, prekinite sa uzimanjem leka, jer to može biti vrlo težak poremećaj koji može ugroziti život. Nemojte uzimati lekove koji usporavaju rad creva i *odmah se javite Vašem lekaru*.
- obavestite Vašeg lekara/zdravstvene radnike da koristite lek Marocen ukoliko treba da radite laboratorijske analize krvi i urina.
- ukoliko imate problema sa bubrezima, obavestite lekara, jer je možda potrebno da Vam smanji dozu leka
- ciprofloksacin može uzrokovati oštećenje jetre. Ukoliko primetite simptome kao što su gubitak apetita, žutica (žuta prebojenost kože i sluzokoža), tamna boja urina, svrab ili preosetljivost stomaka- *prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite Vašem lekaru*.
- ciprofloksacin može dovesti do smanjenja broja belih krvnih zrnaca, što može dovesti do smanjene otpornosti Vašeg organizma. Ukoliko dobijete infekciju sa simptomima kao što su groznica i ozbiljno narušavanje opšteg stanja organizma, ili groznica sa lokalnim znacima infekcije kao što su upala grla/ždrelo/usta ili infekcije mokraćnih puteva-*odmah se javite Vašem lekaru*. Lekar će tražiti da uradite analize krvi da bi se utvrdilo da li možda imate smanjen broj belih krvnih ćelija (agranulocitozu). Važno je da obavestite Vašeg lekara koji lek pijete.
- u toku korišćenja ciprofloksacina Vaša koža postaje osetljivija na sunčevu svetlost ili ultraljubičasto (UV) zračenje. Iz tog razloga izbegavajte izlaganje jakim sunčevim ili veštačkim UV zracima (npr. upotreba solarijuma).

### Primena drugih lekova

*Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.*

Lek Marocen ne smete uzimati istovremeno sa tizanidinom, zbog moguće pojave neželjenih dejstava kao što su pad krvnog pritiska i pospanost (*Videti odeljak: „Lek Marocen ne smete koristiti“*).

Za niže navedene lekove je poznato da stupaju u interakciju sa lekom Marocen. Istovremeno uzimanje ovih lekova i leka Marocen može poremetiti njihov terapijski efekat. Može se, takođe, i povećati rizik za pojavu neželjenih dejstava.

Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

- antagonist vitamina K (npr. varfarin, acenokumarol, fenprokumon ili fluindion) ili druge oralne antikoagulanse (lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi)
- probenecid (za terapiju gihta)
- metotreksat (za terapiju pojedinih vrsta raka, psorijaze, reumatoidnog artritisa)
- teofilin (bronhodilatator, lek koji se daje kod otežanog disanja)
- tizanidin (za opuštanje mišića u multiploj sklerozi)
- olanzapin (antipsihotik, lek za lečenje psihijatrijskih bolesti)
- klozapin (antipsihotik, lek za lečenje psihijatrijskih bolesti)

- ropinirol (za Parkinsonovu bolest)
- fenitoin (za epilepsiju)
- metoklopramid (za mučninu i povraćanje)
- ciklosporin (za bolesti kože, reumatoidni artritis i pri transplantaciji organa)
- drugi lekovi koji mogu uticati na srčani ritam: lekovi iz grupe antiaritmika (npr. hinidin, hidrohinihin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklični antidepressivi, neki antimikrobni lekovi (iz grupe makrolida), neki antipsihotici.

Lek Marocen može povećati nivoe sledećih lekova u krvi:

- pentoksifilin (za poremećaje cirkulacije)
- kofein
- duloksetin (za depresiju, oštećenje nerava kod dijabetičara ili nevoljno mokrenje (inkontinenciju))
- lidokain (za srčane poremećaje ili anesteziju)
- sildenafil (npr. za erektilnu disfunkciju tj. impotenciju).

Neki lekovi mogu smanjiti efekat leka Marocen. Recite Vašem lekaru ukoliko pijete ili bi trebalo da pijete neki od sledećih lekova:

- antacide (lekove za smanjenje kiselosti želuca)
- omeprazol
- mineralne suplemente
- sukralfat (lek u terapiji čira)
- polimere koji vezuju fosfate (npr. sevelamer ili lantanum-karbonat)
- lekove ili suplemente koji sadrže kalcijum, magnezijum, aluminijum ili gvožđe

Ukoliko je upotreba ovih lekova neophodna, lek Marocen uzmite dva sata pre ili najmanje četiri sata nakon uzimanja nekih od pomenutih lekova.

### **Uzimanje leka Marocen sa hranom ili pićima**

Ukoliko uzimate lek u toku obroka, nemojte jesti ili piti bilo kakve mlečne proizvode (kao što su mleko ili jogurt) ili napitke obogaćene kalcijumom, jer oni mogu uticati na resorpciju aktivne supstance.

### **Primena leka Marocen u periodu trudnoće i dojenja**

*Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.*

#### *Trudnoća*

Poželjno je izbegavati upotrebu leka Marocen u periodu trudnoće. Obavestite Vašeg lekara i ukoliko planirate trudnoću.

#### *Dojenje*

Nemojte uzimati lek Marocen ukoliko dojite, jer se ciprofloksacin izlučuje u majčino mleko i može biti štetan po odojče.

---

## Uticaj leka Marocen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lek Marocen može smanjiti Vaš stepen opreznosti. Mogu se javiti i neki neurološki poremećaji. Iz tog razloga, budite sigurni da lek Marocen nema takvo dejstvo na Vas, pre nego što započnete upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju, obratite se Vašem lekaru.

### Važne informacije o nekim sastojcima leka Marocen

Nema važnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži lek Marocen.

### 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAROCEN

#### *Način primene:*

Oralna primena.

Lekar će Vam objasniti kako tačno da pijete lek Marocen (koliko tableta, kada i koliko dugo). To zavisi od vrste i težine infekcije koju imate.

Recite Vašem lekaru ukoliko imate problema sa bubrežima, jer će Vam u tom slučaju možda biti smanjena doza leka.

Lečenje uobičajeno traje od 5 do 21 dana, ali u težim oblicima infekcija može trajati i duže. Postoje situacije kada lečenje može da traje i kraće. Uzimajte tablete tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni koliko tableta, kada i kako da uzmete lek, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

- progutajte tablete sa dovoljnom količinom tečnosti. Nemojte žvakati tablete.
- trudite se da lek uzimate svakog dana u približno isto vreme
- tablete možete uzimati za vreme ili između obroka. Kalcijum iz hrane neće značajno uticati na resorpciju leka, ali **ne uzimajte** lek Marocen sa mlečnim proizvodima kao što su mleko i jogurt ili sa obogaćenim voćnim sokovima (npr. kalcijumom obogaćeni sok od pomorandže).

Nemojte zaboraviti da pijete dosta tečnosti dok ste na terapiji ovim lekom.

### Ako ste uzeli više leka Marocen nego što je trebalo

Ukoliko ste popili više leka nego što je trebalo, odmah se javite Vašem lekaru. Ukoliko je moguće, ponesite kutiju leka sa sobom.

### Ako ste zaboravili da uzmete lek Marocen

Ukoliko ste zaboravili da popijete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Ipak ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, zanemarite činjenicu da ste zaboravili da uzmete lek i nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka kada za to dođe vreme.

*Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.*

## Ako naglo prestanete da uzimate lek Marocen

Važno je da ne prekidate lečenje pre nego što Vam je to rekao lekar, čak i ukoliko počnete da se osećate bolje nakon par dana. Ukoliko pre vremena prekinete sa uzimanjem leka, Vaša infekcija neće biti pravilno izlečena i može doći do ponovne pojave ili pogoršanja simptoma infekcije. Takođe, možete steći otpornost na antibiotik.

*Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Marocen, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.*

## 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Marocen, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih.

*Česta (mogu se javiti kod 1- 10 od 100 pacijenata koji uzimaju lek):*

- mučnina, dijareja
- bolovi u zglobovima kod dece

*Povremena (mogu se javiti kod 1-10 od 1000 pacijenata koji uzimaju lek):*

- superinfekcija gljivicama
- povećan broj eozinofila, vrste belih krvnih ćelija
- gubitak apetita
- hiperaktivnost ili agitacija
- glavobolja, vrtoglavica, poremećaj spavanja ili poremećaj ukusa
- povraćanje, bol u stomaku, problemi sa varenjem i nelagodnost u stomaku (poremećaj varenja/gorušica) ili gasovi
- povišene vrednosti pojedinih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin)
- ospa, svrab ili koprivnjača
- bolovi u zglobovima (kod odraslih)
- slabljenje bubrežne funkcije
- bolovi u mišićima i kostima, astenija (nemoć i opšta slabost) ili groznica
- porast vrednosti alkalne fosfataze u krvi

*Retka (mogu se javiti kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):*

- upala creva (kolitis) kao posledica korišćenja antibiotika (u pojedinim slučajevima i fatalna)(*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)
- promene u broju krvnih ćelija (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), porast ili smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)
- alergijska reakcija, oticanje (edem) ili brza pojava otoka kože i sluzokoža (angioedem)
- povišen nivo šećera u krvi (hiperglikemija)
- snižena vrednost šećera u krvi (hipoglikemija) (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)



- zbunjenost (konfuzija), dezorijentacija, anksiozne reakcije, čudni snovi, depresija (potencijalno dovodeći do misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili izvršenja samoubistva) ili halucinacije
- bockanje, trnjenje, poremećaj senzibiliteta, smanjena osetljivost kože, tremor (nevoljno podrhtavanje), konvulzije (grčevi) (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*), vrtoglavica (vertigo)
- problemi sa vidom, uključujući i duple slike
- tinitus (zujanje u ušima), gubitak sluha, oštećen sluh
- ubrzan rad srca (tahikardija)
- širenje krvnih sudova (vazodilatacija), pad krvnog pritiska ili nesvestica
- otežano disanje, uključujući simptome astme
- poremećaj jetre, žutica (holestatska žutica) ili hepatitis
- preosetljivost na svetlost (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)
- bolovi u mišićima, upala zglobova, povećan mišićni tonus ili grčevi
- slabost (insuficijencija) bubrega, prisustvo krvi ili kristala u urinu (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*), upala mokraćnih puteva
- zadržavanje tečnosti u organizmu ili pojačano znojenje
- povišene vrednosti enzima amilaze

*Veoma retka (mogu se javiti kod manje od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):*

- smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (hemolitička anemija); drastično smanjenje broja belih krvnih ćelija (agranulocitoza); značajno smanjenje broja crvenih i belih krvnih ćelija i krvnih pločica (pancitopenija), koje može biti fatalno; depresija koštane srži, koja može biti fatalna (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)
- težak oblik alergijske reakcije (anafilaktička reakcija ili anafilaktički šok, koji može biti fatalan, reakcija slična serumskoj bolesti) (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)
- mentalni poremećaji (psihotične reakcije potencijalno dovodeći do misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili izvršenja samoubistva) (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)
- migrena, poremećaj koordinacije, nesiguran hod (poremećaj hoda), poremećaj osećaja mirisa (olfaktorni poremećaji), povećan intrakranijalnih pritisak (pritisak na mozak)
- poremećaj prepoznavanja boja
- upala zidova krvnih sudova (vaskulitis)
- zapaljenje gušterače (pankreatitis)
- izumiranje ćelija jetre (nekroza jetre), veoma retko napreduje do životno-ugrožavajuće slabosti jetre
- mala, tačkasta krvarenja ispod kože (petehije); različite vrste promena po koži ili ospe (npr. potencijalno fatalan *Stevens-Johnson*-ov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza)
- slabost mišića, upala tetiva, ruptura (pucanje) tetiva, posebno velike tetive na gležnju (Ahilova tetiva) (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*); pogoršanje simptoma miastenije gravis (*Videti odeljak 2: Kada uzimate lek Marocen posebno vodite računa*)

*Nepoznata učestalost javljanja (iz dostupnih podataka nije moguće utvrditi učestalost javljanja):*

- poremećaji nervnog sistema (periferna neuropatija i polineuropatija), kao bol, žarenje, bockanje, utrnulost i/ili slabost ekstremiteta
- abnormalno ubrzani rad srca, po život opasan poremećaj ritma (*“torsades de pointes”*), promene u srčanom ritmu (tzv. “produženje QT intervala”, koje se može videti na EKG-u, koji beleži električnu aktivnost srca)
- pustularna ospa
- uticaj na zgrušavanje krvi (kod pacijenata lečenih antagonistima vitamina K)

#### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije  
Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd  
Republika Srbija  
website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)  
e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

## 5. KAKO ČUVATI LEK MAROCEN

*Čuvati van domašaja i vidokruga dece!*

#### **Rok upotrebe:**

*Marocen, 250 mg, film tablete*  
5 godina.

*Marocen, 500 mg, film tablete*  
3 godine.

Nemojte koristiti lek Marocen posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

#### **Čuvanje:**

*Marocen, 250 mg, film tablete*  
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

*Marocen, 500 mg, film tablete*  
Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Šta sadrži lek Marocen

#### Aktivne supstance su:

*Marocen, 250 mg, film tablete:*

1 film tableta sadrži:

ciprofloksacin 250 mg  
(u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida)

*Marocen, 500 mg, film tablete:*

1 film tableta sadrži:

ciprofloksacin 500 mg  
(u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida)

#### Pomoćne supstance su:

*Jezgro:* Celuloza, mikrokristalna; Natrijum-skrobglikolat (tip A); Povidon K25; Kroskarmeloza-natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

*Omotič:* Hipromeloza; Talk; Titan-dioksid E 171, C.I. 77891; Propilenglikol.

### Kako izgleda lek Marocen i sadržaj pakovanja

*Marocen, 250 mg, film tablete*

Okrugle, blago ispupčene, film tablete, bele do slabožućkaste boje koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.

Kutija sa jednim blisterom sa 10 film tableta.

*Marocen, 500 mg, film tablete*

Ovalne film tablete bele boje, sa podeonom crtom sa obe strane, na prelomu bele boje.

Kutija sa jednim blisterom sa 10 film tableta.

### Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

### Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2014.

**Režim izdavanja leka:**

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

**Broj i datum dozvole:**

*Marocen, 250 mg, film tablete*  
515-01-7010-12-001 od 04.07.2013.

*Marocen, 500 mg, film tablete*  
515-01-01398-14-001 od 15.10.2014.