

UPUTSTVO ZA LEK

Vitamin C, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1 x 50 ml

(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

Podnosilac zahteva: **VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D.
Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D.
Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

2. IME LEKA

Vitamin C

askorbinska kiselina (100 mg/mL)
rastvor za injekciju
za konje, goveda, svinje i pse

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Askorbinska kiselina (vitamin C) 100 mg

Pomoćne supstance:

Natrijum hidrogenkarbonat	47 mg
Natrijum hlorid	20 mg
Natrijum metabisulfit	0,05 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

4. INDIKACIJE

Hipovitaminoza i avitaminoza C (skorbut), hemoragične dijateze različite etiologije, potporna terapija pri lečenju infektivnih i zaraznih bolesti, rekovalescencija, trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna), jatrogena trovanja (jedinjenjima arsena, sulfonamidima, barbituratima i dr.), funkcionalni sterilitet na bazi C avitaminoze, terapija stresa, kod primarnih i sekundarnih anemija.

5. KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na neki od sastojaka leka; acidoza.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Posle i.m. ili s.c. aplikacije može se javiti lokalna , prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Pri brznoj intravenskoj primeni može doći do kolapsa.

U visokim dozama preparat kod pasa izaziva dijareju, povraćanje i poremećaj diureze. Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati urolitijazu.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje i psi.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intramuskularno, subkutano ili sporo intravenski.

Daje se jednom dnevno u dozi od 10-20 ml konjima i govedima; 5-10 ml svinjama; i 1-5 ml psima.

Terapija traje više dana, u zavisnosti od procene veterinara.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni, konjima i govedima, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 ml leka.

Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brznoj intravenskoj aplikaciji može doći do kolapsa.

10. KARENCA

Nula (0) dana.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Pre aplikacije primeniti mere asepsa i antiseptičke, odnosno dezinfikovati kožu na mestu na kom će preparat biti aplikovan.

Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brznoj intravenskoj aplikaciji može doći do kolapsa.

U visokim dozama preparat kod pasa izaziva dijareju, povraćanje i poremećaj diureze. Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati urolitijazu.

Pri istovremenoj primeni askorbinske kiseline sa salicilatima, pojačava se njeno izlučivanje, dok se usporava izlučivanje salicilata. Zakišeljavanje mokraće, pri primeni većih doza askorbinske kiseline, može da pospeši izlučivanje drugih lekova koji se istovremeno primenjuju.

U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Osobe preosetljive na neki od sastojaka leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

18.09.2017.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (50 ml) u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11GA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00188-17-001 od 18.09.2017.