

**UPUTSTVO ZA LEK**

**GOPAVAK<sup>®</sup>, 40 a.j./mL, suspenzija za injekciju, 1x50 mL (1x50 doza)**  
**(za primenu na životinjama)**

Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

**1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK/NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.  
Beogradski put 123, Subotica, Srbija

**2. IME LEKA**

GOPAVAK®  
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije *Salmonella typhimurium* var. *Copenhagen*  
suspenzija za injekciju  
za golubove

**3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

1 doza (1 mL) vakcine sadrži:

**Aktivna supstanca:**

Inaktivisana bakterijska kultura  
*Salmonella typhimurium* var. *Copenhagen* najmanje 40 a.j.\*

**Pomoćne supstance:**

Formaldehid, rezidualni najviše 0,5 mg

\*titar antitela u serumu golubova određen metodom aglutinacije nakon dvokratne imunizacije jednom dozom vakcine

**Ostale pomoćne supstance:** voda za injekcije

**4. INDIKACIJE**

Aktivna imunizacija golubova protiv infekcije uzrokovane sa *Salmonella typhimurium* var. *Copenhagen*.

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Primena vakcine je kontraindikovana kod sasvim mladih golubova (mladih od 4 nedelje), kliconoša, bolesnih, kahektičnih i životinja invadiranih parazitima; kao i kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja.

**6. NEŽELJENA DEJSTVA**

Na mestu primene vakcine moguća je pojava prolaznog otoka. Takođe je moguća pojava alergijske ili anafilaktičke reakcije.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

## 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Golubovi.

## 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.

Vakcina se aplikuje subkutano u predelu vrata u dozi od 1 mL, dvokratno u intervalu od 14 dana.

## 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije, bočica sa vakcinom se prethodno dobro protrese.

## 10. KARENCA

Nula dana.

## 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju.

Ne zamrzavati.

**Čuvati van domašaja dece.**

**Rok upotrebe:** 1 godina

**Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:** iskoristiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

## 12. POSEBNA UPOZORENJA

**Za primenu na životinjama.**

**Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu**

Ne koristiti kod drugih ptica osim kod golubova.

**Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja**

Vakcinacija mladih golubova se vrši tek posle potpunog obrastanja perjem.

Vakcinacija se sprovodi samo u toku zimskih meseci, odnosno u periodu mirovanja reprodukcije.

Bolesni i inficirani golubovi se ne vakcinišu i takve jedinke treba neškodljivo ukloniti, a objekat i ispuste nakon toga dezinfikovati.

Ukoliko se kod životinja pojave alergijske ili anafilaktičke reakcije, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

**Upotreba tokom perioda nošenja jaja**

Vakcina se ne primenjuje kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja, kao i najmanje 4 nedelje pre tog perioda.

**Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama**

U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu ili uputstvo za upotrebu vakcine lekaru.

**Predoziranje**

U slučaju predoziranja vakcina ne izaziva sistemske reakcije. U redim slučajevima, može doći do pojave lokalnih reakcija na mestu aplikacije koje ne zahtevaju nikakav dodatni tretman.

**Interakcije**

Nisu poznate.

**Inkompatibilnost**

U nedostatku studija kompatibilnosti, vakcinu ne mešati ni sa jednom drugom vakcinom ili bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

**13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA**

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

**14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA**

19.01.2016.

**15. OSTALI PODACI**

**Pakovanje:** Bočica od 50 mL od tamnog stakla II hidrolitičke grupe, sa gumenim (brombutilnim) zapašaćem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

**Režim izdavanja:** Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

**ATCvet kod:** QI01EB\*\*

**Broj i datum izdavanja dozvole:** 323-01-00432-14-001 od 19.01.2016.