

UPUTSTVO ZA LEK

Oxaway[®], 15 mg, film tablete

Oxaway[®], 30 mg, film tablete

Oxaway[®], 60 mg, film tablete

edoksaban

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Oxaway i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oxaway
3. Kako se uzima lek Oxaway
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Oxaway
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Oxaway i čemu je namenjen

Lek Oxaway sadrži aktivnu supstancu edoksaban i pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulansi. Ovaj lek pomaže u sprečavanju stvaranja krvnih ugrušaka. Deluje tako što blokira delovanje faktora Xa, koji je važna komponenta zgrušavanja krvi.

Lek Oxaway se primenjuje kod odraslih za:

- **sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka u mozgu** (moždani udar) **i drugim krvnim sudovima u telu**, ukoliko imate vrstu nepravilnog srčanog ritma koja se zove nevalvularna atrijalna fibrilacija i bar još jedan dodatni faktor rizika, kao što su slabost srca, prethodni moždani udar ili visok krvni pritisak;
- **lečenje krvnih ugrušaka u venama nogu** (tromboza dubokih vena) **i krvnim sudovima pluća** (plućna embolija), kao i za **sprečavanje ponovnog nastanka krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu i/ili pluća**.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oxaway

Lek Oxaway ne smete uzimati ako:

- ste alergični (preosetljivi) na edoksaban ili na bilo koju od pomoćnih susptanci ovog leka (navedene u odeljku 6);
- trenutno krvarite;
- imate bolest ili stanje koje povećava rizik od ozbiljnog krvarenja (npr. čir na želucu, povredu mozga ili moždano krvarenje ili nedavnu hiruršku intervenciju na mozgu ili očima);
- koristite druge lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban ili heparin), osim kod promene antikoagulantne terapije ili kod primene heparina kroz vensku ili arterijsku liniju u cilju održavanja prohodnosti;
- imate bolest jetre koja povećava rizik od krvarenja;
- imate nekontrolisani povišeni krvni pritisak;
- ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom, pre nego što uzmete lek Oxaway. Posebno, obavestite Vašeg lekara ako:

- imate povećan rizik od krvarenja, što može biti slučaj ako imate neko od sledećih stanja:
 - poslednji stadijum bolesti bubrega ili ste na dijalizi;
 - tešku bolest jetre;
 - poremećaj krvarenja;
 - probleme sa krvnim sudovima u zadnjem delu oka (retinopatija);
 - nedavno krvarenje u mozgu (intrakranijalno ili intracerebralno krvarenje);
 - probleme sa krvnim sudovima u mozgu ili kičmenoj moždini;
- imate mehanički srčani zalistak.

Lek Oxaway, 15 mg koristi se samo kada se terapija lekom Oxaway 30 mg zamenjuje antagonistom vitamina K (npr. varfarinom) (videti odeljak 3. Kako se uzima lek Oxaway).

Budite posebno oprezni prilikom primene leka Oxaway ako:

- znate da imate bolest koja se naziva antifosfolipidni sindrom (poremećaj imunskog sistema koji povećava rizik od nastanka krvnih ugrušaka); obavestite o tome svog lekara koji će odlučiti da li je potrebna promena terapije.

Ukoliko treba da idete na operaciju:

- veoma je važno da uzmete lek Oxaway pre i posle operacije tačno u vreme koje je odredio lekar. Ako je moguće, treba prekinuti primenu leka Oxaway najmanje 24 sata pre operacije. Vaš lekar će odrediti kada ćete ponovno početi da uzimate lek Oxaway.

U hitnim situacijama, lekar će pomoći u određivanju odgovarajućih mera u vezi sa lekom Oxaway.

Deca i adolescenti

Primena leka Oxaway se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lekovi i lek Oxaway

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Obavestite Vašeg lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- neke od lekova koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol);
- lekove koji se koriste u terapiji nepravilnog rada srca (npr. dronedaron, hinidin, verapamil);
- druge lekove koji se koriste za smanjenje zgrušavanja krvi (npr. heparin, klopidoogrel ili antagoniste vitamina K kao što su varfarin, acenokumarol, fenpropakumon ili dabigatran, rivaroksaban, apiksaban);
- antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin);
- lekove za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije (npr. ciklosporin);
- lekove koji se koriste za lečenje zapaljenja i ublažavanje bolova (npr. naproksen ili acetilsalicilna kiselina);
- lekove koji se koriste za lečenje depresije koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina ili inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina.

Ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, obavestite svog lekara pre nego što uzmete lek Oxaway, pošto ovi lekovi mogu pojačati dejstvo leka Oxaway i povećati verovatnoću neželjenog krvarenja. Vaš lekar će odlučiti da li treba da se lečite lekom Oxaway i da li treba da budete pod nadzorom.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite nešto od sledećeg:

- neke lekove za lečenje epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital);
- kantarion (*St. John's Wort*), biljni preparat koji se primenjuje kod anksioznosti i blage depresije;
- antibiotik rifampicin.

Ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, obavestite svog lekara pre nego što uzmete lek Oxaway, jer dejstvo leka Oxaway može biti smanjeno. Vaš lekar će odlučiti da li treba da se lečite lekom Oxaway i da li treba da budete pod nadzorom.

Trudnoća i dojenje

Nemojte koristiti lek Oxaway ukoliko ste trudni ili dojite. Ukoliko postoji mogućnost da zatrudnite dok uzimate lek Oxaway, koristite pouzdanu kontracepciju. Ukoliko zatrudnite dok uzimate lek Oxaway, odmah obavestite svog lekara, koji će odlučiti o daljoj terapiji.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Oxaway nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

3. Kako se uzima lek Oxaway

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Koliko leka uzeti

Preporučena doza je jedna tableta od **60 mg** jednom dnevno.

- **Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega**, lekar Vam može smanjiti dozu na jednu tabletu od **30 mg** jednom dnevno.
- **Ukoliko imate telesnu masu od 60 kg ili manju**, preporučena doza je jedna tableta od **30 mg** jednom dnevno.
- **Ukoliko Vam je lekar propisao lekove koji su poznati inhibitori P-gp:** ciklosporin, dronedaron, eritromicin ili ketokonazol, preporučena doza je jedna tableta od **30 mg** jednom dnevno.

Način primene

Progutajte tabletu, poželjno sa vodom.

Lek Oxaway se može uzimati uz obrok ili nezavisno od njega.

Lekar Vam može promeniti antikoagulantnu terapiju na sledeći način:

Zamena antagonista vitamina K (npr. varfarin) lekom Oxaway

Prestanite sa uzimanjem antagoniste vitamina K (npr. varfarin). Lekar će morati da Vam odradi analize krvi i nakon toga će Vam dati uputstvo kada da počnete sa uzimanjem leka Oxaway.

Zamena oralnih antikoagulanasa koji nisu antagonisti vitamina K (dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) lekom Oxaway

Prestanite sa uzimanjem prethodnih lekova (npr. dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) i počnite da uzimate lek Oxaway u vreme kada prema rasporedu treba da uzmete sledeću dozu.

Zamena parenteralnih antikoagulanasa (npr. heparin) lekom Oxaway

Prestanite sa primenom antikoagulansa (npr. heparin) i počnite da uzimate lek Oxaway u vreme kada prema rasporedu treba da primite sledeću dozu parenteralnog antikoagulansa.

Zamena leka Oxaway antagonistima vitamina K (npr. varfarin)

Ukoliko trenutno koristite lek Oxaway u dozi od 60 mg:

Lekar će Vam reći da smanjite dozu leka Oxaway na 30 mg jednom dnevno, kao i da uzimate lek zajedno sa antagonistom vitamina K (npr. varfarin). Lekar će morati da Vam odradi analize krvi i nakon toga će Vam dati dalja uputstva kada da prestanete sa uzimanjem leka Oxaway.

Ukoliko trenutno koristite lek Oxaway u dozi od 30 mg (smanjena doza):

Lekar će Vam reći da smanjite dozu leka Oxaway na 15 mg jednom dnevno, kao i da uzimate lek zajedno sa antagonistom vitamina K (npr. varfarin). Lekar će morati da Vam odradi analize krvi i nakon toga će Vam dati dalja uputstva kada da prestanete sa uzimanjem leka Oxaway.

Zamena leka Oxaway oralnim antikoagulansima koji nisu antagonisti vitamina K (dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban)

Prestanite sa uzimanjem leka Oxaway i počnite da uzimate antikoagulans koji nije antagonist vitamina K (npr. dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) u vreme kada prema rasporedu treba da uzmete sledeću dozu leka Oxaway.

Zamena leka Oxaway parenteralnim antikoagulansima (npr. heparin)

Prestanite sa uzimanjem leka Oxaway i počnite sa primenom parenteralnog antikoagulansa (npr. heparin) u vreme kada prema rasporedu treba da uzmete sledeću dozu leka Oxaway.

Pacijenti koji će biti podvrgnuti kardioverziji

Ukoliko je kod poremećaja rada srca potrebno uspostaviti normalan srčani ritam primenom postupka koji se naziva kardioverzija, uzmite lek Oxaway u vreme koje odredi lekar, kako biste sprečili nastanak krvnih ugrušaka u mozgu i drugim krvnim sudovima u organizmu.

Ako ste uzeli više leka Oxaway nego što treba

Ako ste uzeli više leka Oxaway nego što treba, odmah obavestite svog lekara.

Ako uzmete više leka Oxaway nego što je preporučeno, možete imati povećan rizik od krvarenja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Oxaway

Tabletu uzmite odmah i nastavite sledećeg dana sa uzimanjem tablete jednom dnevno, prema uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu istog dana kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Oxaway

Nemojte da prestanete da uzimate lek Oxaway bez savetovanja sa lekarom, zato što lek Oxaway leči i sprečava nastanak ozbiljnih stanja.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Kao i drugi slični lekovi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi), lek Oxaway može dovesti do krvarenja, koje potencijalno može biti životno ugrožavajuće. U nekim slučajevima, krvarenje ne mora biti vidljivo.

Ako Vam se javi bilo kakvo krvarenje koje ne prestaje samo od sebe ili se pojave znaci obilnog krvarenja (izrazita slabost, umor, bledilo, vrtoglavica, glavobolja ili neobjašnjivi otoci), odmah se javite lekaru.

Lekar može odlučiti da Vas zadrži pod pažljivim nadzorom ili da promeni lek koji koristite.

Spisak svih mogućih neželjenih dejstava:

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- bol u želucu;
- poremećene vrednosti testova funkcije jetre;
- krvarenje iz kože ili potkožno krvarenje;
- anemija (mali broj crvenih krvnih zrnaca);
- krvarenje iz nosa;
- vaginalno krvarenje;
- osip;
- krvarenje u crevima;
- krvarenje u usnoj duplji i/ili grlu;
- pojava krvi u mokraći;
- krvarenje nakon povreda (uboda);
- krvarenje u želucu;
- vrtoglavica;
- mučnina;
- glavobolja;
- svrab.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- krvarenje u očima;
- krvarenje iz hirurške rane nakon operacije;
- iskašljavanje krvi;
- krvarenje u mozgu;
- druge vrste krvarenja;
- smanjen broj trombocita u krvi (što može uticati na zgrušavanje krvi) ;
- alergijska reakcija;
- koprivnjača.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- krvarenje u mišićima;
- krvarenje u zglobovima;
- krvarenje u abdomenu;
- krvarenje u srcu;
- krvarenje unutar lobanje;
- krvarenje nakon hirurške intervencije;
- alergijski šok;
- oticanje bilo kog dela tela usled alergijske reakcije.

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- krvarenje u bubregu, ponekad sa prisustvom krvi u mokraći, koje onemogućava pravilan rad bubrega (nefropatija povezana sa primenom antikoagulanasa).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Oxaway

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Oxaway posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju i blisteru nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Oxaway

- Aktivna supstanca je edoksaban (u obliku edoksaban-tosilat, monohidrata).

Oxaway, 15 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži 15 mg edoksabana (u obliku edoksaban-tosilat, monohidrata).

Oxaway, 30 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži 30 mg edoksabana (u obliku edoksaban-tosilat, monohidrata).

Oxaway, 60 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži 60 mg edoksabana (u obliku edoksaban-tosilat, monohidrata).

- Pomoćne supstance su:

Oxaway, 15 mg, film tablete:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; krospovidon (tip A); hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga: hipromeloza 2910 (E464); talk (E553b); makrogol 8000 (E1521); titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Oxaway, 30 mg, film tablete:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; krospovidon (tip A); hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga: hipromeloza 2910 (E464); talk (E553b); makrogol 8000 (E1521); titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172)

Oxaway, 60 mg, film tablete:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; krospovidon (tip A); hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Film obloga: hipromeloza 2910 (E464); talk (E553b); makrogol 8000 (E1521); titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Kako izgleda lek Oxaway i sadržaj pakovanja

Oxaway, 15 mg, film tablete:

Narandžasta, okrugla, bikonveksna, film tableta, sa utisnutom oznakom "15" sa jedne strane, nominalni prečnik 6,7 mm.

Oxaway, 15 mg, film tablete, 1 x 10:

Unutrašnje pakovanje je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 film tableta (ukupno 10 film tableta) i Uputstvo za lek.

Oxaway, 15 mg, film tablete, 1 x (10 x 1):

Unutrašnje pakovanje leka je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister deljiv na pojedinačne doze, koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister deljiv na pojedinačne doze sa 10 film tableta (10 x 1 - ukupno 10 film tableta) i Uputstvo za lek.

Oxaway, 30 mg, film tablete:

Pink, okrugla, bikonveksna, film tableta, sa utisnutom oznakom "30" sa jedne strane, nominalni prečnik 8,5 mm.

Oxaway, 30 mg, film tablete, 2 x 14:

Unutrašnje pakovanje je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister koji sadrži 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Oxaway, 30 mg, film tablete, 7 x 14:

Unutrašnje pakovanje je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister koji sadrži 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi sedam blistera sa po 14 film tableta (ukupno 98 film tableta) i Uputstvo za lek.

Oxaway, 60 mg, film tablete:

Žuta, okrugla, bikonveksna, film tableta, sa utisnutom oznakom "60" sa jedne strane, nominalni prečnik 10,5 mm.

Oxaway, 60 mg, film tablete, 2 x 14:

Unutrašnje pakovanje je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister koji sadrži 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Oxaway, 60 mg, film tablete, 7 x 14:

Unutrašnje pakovanje je transparentni PVC/aluminijski ili aluminijum/aluminijum blister koji sadrži 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi sedam blistera sa po 14 film tableta (ukupno 98 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač**Nosilac dozvole:**

GALENICA AD BEOGRAD

Batajnički drum b.b., Beograd

Proizvođač:

GENEPHARM S.A.

18th Km Marathonos Ave, Pallini, Attiki, Grčka

Olpha AS

Rupnicu Iela 5, Olaine, Letonija

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi ili da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2025.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Oxaway, 15 mg, film tablete, 1 x 10: 000461483 2023 od 03.06.2025.

Oxaway, 15 mg, film tablete, 1 x (10 x 1): 000461484 2023 od 03.06.2025.

Oxaway, 30 mg, film tablete, 2 x 14: 000461485 2023 od 03.06.2025.

Oxaway, 30 mg, film tablete, 7 x 14: 000461491 2023 od 03.06.2025..

Oxaway, 60 mg, film tablete, 2 x 14: 000461494 2023 od 03.06.2025..

Oxaway, 60 mg, film tablete, 7 x 14: 000461497 2023 od 03.06.2025.

KARTICA SA UPOZORENJIMA ZA PACIJENTA

Oxaway[®]
film tablete
edoksaban

Ovu karticu uvek nosite sa sobom.

Pre bilo kog medicinskog tretmana ili intervencije, pokažite ovu karticu svom lekaru, farmaceutu, hirurгу ili stomatologu.

INFORMACIJE O PACIJENTU

Ime i prezime pacijenta:

Datum rođenja:

U hitnim slučajevima, molimo vas da kontaktirate:

Ime i prezime:

Broj telefona:

INFORMACIJE O TERAPIJI

(Popunjava lekar)

Lek **Oxaway** je propisan jedanput na dan u dozi od: mg

Početak terapije: / (mesec/godina)

Krvna grupa:

Drugi lekovi/stanja:

INFORMACIJE O PROPISIVAČU

Za više informacija ili u hitnom slučaju, molim Vas da kontaktirate:

Ime i prezime lekara:

Broj telefona, broj licence:

Potpis lekara:

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

- lek **Oxaway** je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.
- U slučaju potrebe invazivnih medicinskih postupaka, potrebno je obustaviti uzimanje leka **Oxaway** najmanje 24 sata pre intervencije i pridržavati se mera opreza.
- Lek **Oxaway** može povećati rizik od krvarenja. U slučaju klinički značajnog krvarenja, potrebno je odmah prekinuti lečenje
- Testovi koagulacije kao što su internacionalni normalizovani odnos (INR), protrombinsko vreme (PT) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) nisu korisni pokazatelji efekta leka **Oxaway**. Međutim, kalibrisani test anti-faktora Xa može pomoći u donošenju kliničkih odluka.

Za ostale informacije, molimo Vas da pogledate Sažetak karakteristika leka (SmPC).

O TERAPIJI

Vama je propisan lek **Oxaway**, antikoagulantni lek, koji razređuje krv i pomaže u sprečavanju stvaranja krvnih ugrušaka. Važno je da uzimate lek tačno po uputstvima lekara.

- Ako propustite dozu, uzmite je odmah, a zatim nastavite sledeći dan kao i obično – ne uzimajte dvostruko više od propisane doze u jednom danu.
- Nemojte započinjati uzimanje bilo kojih drugih lekova a da se prethodno niste posavetovali s lekarom.
- Ne prekidajte uzimanje leka **Oxaway** bez konsultacije sa Vašim lekarom jer to može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška.
- Pročitajte Uputstvo za lek koje se nalazi u svakom pakovanju leka **Oxaway**.

KADA JE POTREBNO TRAŽITI MEDICINSKI SAVET

RIZIK OD KRVARENJA

Uzimanje antikoagulantnog leka kao što je Oxaway može povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno biti svestan mogućih znakova i simptoma krvarenja i **odmah** razgovarati sa svojim lekarom u slučaju pojave:

- modrica ili potkožnog krvarenja
- krvi u urinu
- iskašljavanja krvi
- povraćanja krvi ili sadržaja koji liči na mlevenu kafu
- krvarenja iz nosa ili posekotine kod kojih je potrebno dugo vremena da se zaustavi krvarenje
- stolica boje katrana
- vrtoglavica ili iznenadna glavobolja
- neobjašnjivi umor
- abnormalno vaginalno krvarenje, uključujući jače ili duže menstruacije.

Razgovarajte sa svojim lekarom ako imate bilo kakve neobične simptome.