

UPUTSTVO ZA LEK

Co-Irda[®], 150 mg/12,5 mg, film tablete

Co-Irda[®], 300 mg/12,5 mg, film tablete

Co-Irda[®], 300 mg/25 mg, film tablete

Irbesartan/hidrohlorotiazid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je lek Co-Irda i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Co-Irda
3. Kako se uzima lek Co-Irda
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Co-Irda
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Co-Irda i čemu je namenjen

Lek Co-Irda je kombinacija dve aktivne supstance, irbesartana i hidrohlortiazida.

Irbesartan pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu i vezuje se za receptore na krvnim sudovima, izazivajući njihovo sužavanje. Ovo dovodi do povećanja krvnog pritiska. Irbesartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, dovodeći do opuštanja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska. Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se zovu tiazidni diuretici i izazivaju povećano izlučivanje urina i na taj način sniženje krvnog pritiska.

Hidrohlortiazid pripada grupi lekova (koji se nazivaju tiazidni diuretici) koji povećavaju izlučivanje mokraće i tako snižavaju krvni pritisak.

Ove dve aktivne supstance u leku Co-Irda deluju zajedno i snižavaju krvni pritisak u većoj meri, nego svaki od njih ponaosob.

Lek Co-Irda se koristi u terapiji povišenog krvnog pritiska, kada terapija samo irbesartanom ili samo hidrohlortiazidom nije dovela do adekvatne kontrole krvnog pritiska.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Co-Irda

Lek Co-Irda ne smete uzimati:

- ukoliko ste **alergični** (preosetljivi) na irbesartan ili hidrohlortiazid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6) ili na lekove koji su derivati sulfonamida
- ukoliko ste trudni **više od 3 meseca** (takođe se savetuje izbegavanje leka Co-Irda na početku trudnoće)
- ukoliko imate teško oboljenje jetre ili bubrega
- ukoliko se kod Vas stvara manja količina mokraće od uobičajene
- ukoliko imate neko oboljenje koje je povezano sa perzistentno (stalno) visokom koncentracijom kalcijuma ili niskom koncentracijom kalijuma u krvi
- ukoliko imate **dijabetes melitus ili oštećenu funkciju bubrega** i lečite se lekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Co-Irda i **ako se bilo što od sledećeg odnosi na Vas:**

- ako imate prekomerno **povraćanje ili proliv**
- ako imate **problema sa bubrežima** ili ste imali **transplantaciju bubrega**
- ako imate **srčanih problema**
- ako imate **problema sa jetrom**
- ako imate **dijabetes**
- ako Vam **koncentracija šećera u krvi postane niska** (simptomi mogu uključivati znojenje, slabost, glad, nesvesticu, drhtanje, glavobolju, navale crvenila ili bledilo, utrnulost, ubrzano lupanje srca), posebno ako se lečite od dijabetesa).
- ako bolujete od **eritemskog lupusa** (poznat i kao lupus ili SLE)
- ako bolujete od **primarnog aldosteronizma** (stanje povezano sa visokom proizvodnjom hormona aldosterona, koji uzrokuje zadržavanje natrijuma u telu i samim tim uzrokuje povećanje krvnog pritiska)
- ako uzimate bilo koji od lekova navedenih u nastavku, koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska:
 - ACE inhibitor (na primer enalapril, lisinopril, ramipril), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren.
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promena) na koži tokom lečenja. Lečenje hidrohlortiazidom, naročito dugotrajna primena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zraka za vreme uzimanja leka Co-Irda.

- ako ste u prošlosti imali probleme sa disanjem ili plućima (uključujući zapaljenje ili tečnost u plućima) nakon unosa hidrohlortiazida. Ako osetite bilo kakav težak nedostatak vazduha ili otežano disanje nakon uzimanja leka Co-Irda, odmah potražite lekarsku pomoć.

Lekar Vam može proveravati bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijum) u krvi u redovnim intervalima.

Ako imate bol u stomaku, mučninu, povraćanje ili proliv nakon uzimanja leka Co-Irda, obratite se Vašem lekaru. Vaš lekar će odlučiti o daljem lečenju. Nemojte prestati da uzimate lek Co-Irda bez savetovanja sa lekarom.

Takođe videti informacije pod naslovom „Lek Co-Irda ne smete uzimati“.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. Lek Co-Irda se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se koristiti nakon 3. meseca trudnoće jer može naškoditi bebi (videti odeljak „Trudnoća i dojenje“).

Takođe treba da obavestite lekara:

- ako ste na **dijeti sa malim unosom soli**
- ako osetite **abnormalnu žeđ, suvoću usta, opštu slabost, pospanost, bol ili grčeve u mišićima, mučninu, povraćanje ili ubrzane otkucaje srca**, što može ukazivati na prekomerno dejstvo hidrohlortiazida (sastojak leka Co-Irda).
- ako je Vaša **koža osetljivija na sunce** nego obično sa simptomima opekotina (crvenilo, svrab, otoci, plikovi) koji se javljaju brže nego uobičajeno
- ako treba da se podvrgnete nekoj **operaciji ili da primite anesteziju**
- ako tokom uzimanja leka Co-Irda primetite **slabljenje vida ili bol u jednom ili oba oka**. To mogu biti simptomi nakupljanja tečnosti u sloju oka u kojem su smešteni krvni sudovi (horoidalna efuzija) ili povećanja pritiska u oku (glaukom), a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do nedelju dana nakon uzimanja leka Co-Irda. Ako se ne leči, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, možete biti u većem riziku od razvoja ove komplikacije. Prestanite uzimati lek Co-Irda i zatražite hitnu lekarsku pomoć.

Hidrohlortiazid koji se nalazi u leku Co-Irda može dati pozitivan rezultat pri anti-doping testiranju.

Deca i adolescenti

Lek Co-Irda nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lekovi i lek Co-Irda

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Diuretici, kao što je hidrohlortiazid, koji se nalazi u leku Co-Irda, mogu uticati na dejstvo drugih lekova. Lekove koji sadrže litijum ne treba uzimati istovremeno sa lekom Co-Irda bez pažljivog nadzora lekara.

Lekar će možda morati da prilagodi dozu ili primeni druge mere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitore ili aliskiren (videti informacije u odeljcima „Lek Co-Irda ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“)

Testovi krvi, mogu biti potrebni ako uzimate:

- preparate za nadoknadu kalijuma
- zamene za soli koje sadrže kalijum
- diuretike koji štede kalijum ili druge diuretike (lekovi za izbacivanje tečnosti)
- neke laksative (lekove koji se koriste u lečenju otežanog pražnjenja creva)
- lekove koji se koriste za terapiju gihta

- vitamin D u terapijske svrhe
- lekove za kontrolu srčanog ritma
- lekove za dijabetes (oralne preparate ili insulin)
- karbamazepin (lek za lečenje epilepsije)

Takođe je važno da obavestite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove za sniženje krvnog pritiska, steroide, lekove za lečenje raka, lekove protiv bolova, lekove protiv artritisa (zapaljenja zglobova),olestiramin iliolestipol (lekovi za snižavanje holesterola u krvi).

Uzimanje leka Co-Irda sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Co-Irda se može uzeti sa hranom ili nezavisno od uzimanja hrane.

S obzirom na to da lek Co-Irda sadrži hidrohlortiazid, ukoliko konzumirate alkohol za vreme uzimanja ovog leka, možete osetiti pojačanu vrtoglavicu, naročito pri ustajanju iz sedećeg položaja.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Lekar će Vas savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Co-Irda pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i u isto vreme će savetovati da pređete na neku drugu alternativnu terapiju. Ne preporučuje se primena leka Co-Irda u ranoj trudnoći, a tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće ne smete uzimati ovaj lek jer može dovesti do ozbiljnih poremećaja u razvoju ploda.

Dojenje

Obavestite Vašeg lekara ako dojite ili planirate dojenje. Lek Co-Irda se ne preporučuje majkama koje doje pri čemu Vam Vaš lekar može propisati drugi lek, naročito ukoliko je Vaša beba novorođenče ili je rođena preveremeno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Malo je verovatno da lek Co-Irda utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Ipak, tokom terapije povišenog krvnog pritiska, povremeno se mogu javiti vrtoglavica ili umor. Ako osetite ove simptome, posavetujte se sa lekarom pre nego što upravljate vozilom ili rukujete mašinama.

Lek Co-Irda sadrži laktozu

Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Co-Irda sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno smatra se da je suštinski "bez natrijuma".

3. Kako se uzima lek Co-Irda

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Co-Irda, 150 mg/12,5 mg, film tablete

Uobičajena doza je jedna ili dve tablete dnevno.

Co-Irda, 300 mg/12,5 mg, film tablete

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.

Co-Irda, 300 mg/25 mg, film tablete

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.

Lek Co-Irda će Vam propisati lekar u slučaju da prethodna terapija nije dovela do odgovarajućeg sniženja povišenog krvnog pritiska. Lekar će Vas uputiti kako da pređete sa prethodne terapije na lek Co-Irda.

Način primene

Oralna upotreba. Tablete treba progutati sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. jedna čaša vode).

Lek Co-Irda možete uzeti uz obrok ili nezavisno od obroka. Pokušajte da dnevnu dozu leka uzimate približno u isto vreme svakoga dana. Važno je da lek Co-Irda uzimate sve dok Vam lekar ne kaže drugačije.

Maksimalno dejstvo na sniženje krvnog pritiska se postiže 6-8 nedelja nakon početka terapije.

Ako ste uzeli više leka Co-Irda nego što treba

Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što je propisano, odmah se obratite lekaru.

Deca ne smeju uzimati lek Co-Irda

Lek Co-Irda se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Co-Irda

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Co-Irda, uzmite sledeću dozu leka u za to predviđeno, uobičajeno, vreme sledećeg dana. Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Neka od neželjenih dejstava mogu biti ozbiljna i zahtevati nadzor lekara.

Za vreme uzimanja leka Co-Irda, retko su zabeležene alergijske reakcije (osip, koprivnjača), kao i lokalizovani otok lica, usana i/ili jezika kod pacijenata koji su uzimali irbesartan.

U slučaju da primetite neki od navedenih simptoma, ili otežano dišete, odmah prestanite sa uzimanjem leka i obavestite Vašeg lekara.

Učestalost dole navedenih neželjenih dejstava definisana je na sledeći način:

Često: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Povremeno: mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

Neželjena dejstva zabeležena u toku kliničkih studija kod pacijenata lečenih kombinacijom ibersartan/hidrohlortiazid:

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

- mučnina/povraćanje
- poremećaj mokrenja
- umor
- vrtoglavica (i pri ustajanju iz sedećeg ili ležećeg položaja)
- laboratorijski testovi krvi mogu pokazati povećane vrednosti enzima koji učestvuju u mišićnoj i srčanoj aktivnosti (kreatin kinaze) ili povećanje koncentracije parametara funkcije bubrega (azot u krvi, kreatinin).

Ako Vam neko od navedenih neželjenih dejstava stvara tegobe, obratite se svom lekaru.

Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

- proliv
- nizak krvni pritisak
- gubitak svesti

- ubrzan rad srca
- iznenadni naleti crvenila lica
- otoci
- seksualna disfunkcija (poremećaj)
- laboratorijski testovi krvi mogu pokazati smanjene koncentracije kalijuma i natrijuma u krvi

Ako Vam neko od navedenih neželjenih dejstava stvara tegobe, obratite se svom lekaru.

Neželjena dejstva zabeležena od početka primene kombinacije irbesartan/hidrohlortiazid

Učestalost ovih neželjenih dejstava je nepoznata i to su: glavobolja, zujanje u ušima, kašalj, poremećaj čula ukusa, loše varenje, bol u zglobovima i mišićima, poremećena funkcija jetre i smanjena funkcija bubrega, povećana koncentracija kalijuma u krvi i alergijske reakcije poput ospe, koprivnjače, otoka lica, usana, usta, jezika ili grla.

Prijavljeni su i povremeni slučajevi žutice (žuta prebojenost kože i/ili beonjača).

Kao i kod svih lekova koji su kombinacija dve aktivne supstance, ne može se isključiti pojava neželjenih dejstava povezanih sa svakom pojedinačnom aktivnom supstancom ponaosob.

Neželjena dejstva koja su povezana sa primenom irbesartana

Pored neželjenih dejstava koja su već navedena, takođe je zapažen i bol u grudima, teške alergijske reakcije (anafilaktički šok), smanjen broj crvenih krvnih ćelija (anemija – simptomi mogu biti praćeni umorom, glavoboljom, nedostatkom vazduha tokom vežbanja, vrtoglavicu i bled izgled), smanjenje broja krvnih pločica (krvne ćelije neophodne za zgrušavanje krvi) i male koncentracije šećera u krvi.

Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): intestinalni angioedem: oticanje u crevima praćeno simptomima kao što su bol u stomaku, mučnina, povraćanje i proliv.

Neželjena dejstva koja su povezana sa primenom hidrohlortiazida

Gubitak apetita, iritacija želuca, grčevi u stomaku, konstipacija (otežano pražnjenje creva), žutica (žuta prebojenost kože i/ili beonjača), zapaljenje pankreasa (gušterače) praćeno teškim bolom gornjeg dela stomaka sa mučninom i povraćanjem, poremećaji spavanja, depresija, zamućen vid, , smanjen broj belih krvnih zrnaca koji može uzrokovati česte infekcije, groznice (povišene telesne temperature), smanjenje broja krvnih pločica (odgovornih za zgrušavanje krvi), smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija) praćen umorom, glavoboljom, otežanim disanjem pri naprezanju, vrtoglavicom i bledilom, oboljenje bubrega, plućna oboljenja uključujući zapaljenje pluća i nagomilavanje tečnosti u plućima, preosetljivost kože na sunčeve zrake, zapaljenje krvnih sudova, kožne bolesti praćene perutanjem kože po celom telu, kožni lupus eritematosus (osip koji se može javiti na licu, vratu i temenu), alergijske reakcije, slabost i grčevi mišića, ubrzan srčani rad, smanjen krvni pritisak nakon promene položaja tela, otok pljuvačnih žlezda, povećanje koncentracije šećera u krvi, pojava šećera u mokraći, povećanje vrednosti masnoća u krvi, velika koncentracija mokraćne kiseline u krvi koja može izazvati giht.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): akutni respiratorni distres (praćen simptomima koji uključuju otežano disanje, povišenu telesnu temperaturu, umor, stanje konfuzije).

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): kancer (rak) kože i usana (nemelanomski kancer kože), oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog pritiska (mogući znakovi nakupljanja tečnosti u sloju oka u kojem su smešteni krvni sudovi (efuzija horoidee) ili akutnog glaukoma zatvorenog ugla).

Poznato je da neželjena dejstva usled primene hidrohlortiazida mogu postati učestalija sa primenom visokih doza hidrohlortiazida.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
vebsajt: www.alims.gov.rs
i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Co-Irda

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Co-Irda posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon "Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Co-Irda

- Aktivne supstance su: irbesartan i hidrohlortiazid

Jedna tableta leka Co-Irda, 150 mg/12,5 mg, sadrži 150 mg irbesartana (u obliku irbesartan-hidrohlorida) i 12,5 mg hidrohlortiazida.

Jedna tableta leka Co-Irda, 300 mg/12,5 mg, sadrži 300 mg irbesartana (u obliku irbesartan-hidrohlorida) i 12,5 mg hidrohlortiazida.

Jedna tableta leka Co-Irda, 300 mg/25 mg, sadrži 300 mg irbesartana (u obliku irbesartan-hidrohlorida) i 25 mg hidrohlortiazida.

- Pomoćne supstance:

Co-Irda, 150 mg/12,5 mg, film tablete:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat i celuloza, prašak; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat

Film (obloga) tablete: Opadry Pink OY-34948: hipromeloza 2910; makrogol 400; titan-dioksid; gvožđe (III)-oksid, crveni

Co-Irda, 300 mg/12,5 mg, film tablete:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat i celuloza, prašak; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat

Film (obloga) tablete: Opadry Pink OY-34948: hipromeloza 2910; makrogol 400; titan-dioksid; gvožđe (III)-oksid, crveni

Co-Irda, 300 mg/25 mg, film tablete:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat i celuloza, prašak; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat

Film (obloga) tablete: Opadry II Pink: laktoza, monohidrat, hipromeloza 2910; makrogol 400; titan-dioksid; gvožđe (III)-oksid, crveni, FD&C Blue#2 Indigo Carmine Alu. Lac i gvožđe (III)-oksid, crni.

Kako izgleda lek Co-Irda i sadržaj pakovanja

Co-Irda, 150 mg/12,5 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete ružičaste boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Co-Irda, 300 mg/12,5 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete ružičaste boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Co-Irda, 300 mg/25 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete ljubičasto-ružičaste boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je beli neprovidan PVC/PE/PVdC/Al blister sa 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS BEOGRAD (VRAČAR),
Brane Crnčevića 5, Beograd

Proizvođač:

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.,
Sancaklar Mh. Eski Akcakoca Cad. No. 299,
Duzce, Turska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) izdavanje.

Broj i datum dozvole:

Co-Irda, 150 mg/12,5 mg, film tablete: 000461647 2023 od 05.10.2026.

Co-Irda, 300 mg/12,5 mg, film tablete: 000461509 2023 od 05.10.2026.

Co-Irda, 300 mg/25 mg, film tablete: 000461510 2023 od 05.10.2026.