UPUTSTVO ZA LEK

Oktenidin Klosterfrau, 2,6 mg, lozenge
oktenidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Oktenidin Klosterfrau i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oktenidin Klosterfrau
3. Kako se uzima lek Oktenidin Klosterfrau
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Oktenidin Klosterfrau
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Oktenidin Klosterfrau i čemu je namenjen

Lek Oktenidin Klosterfrau sadrži aktivnu supstancu oktenidin-dihidrohlorid. Spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici i deluje tako što uništava ćelijske funkcije patogena (bakterija, virusa, gljivica).

Lek Oktenidin Klosterfrau se koristi za kratkotrajno dodatno lečenje zapaljenja sluzokože usne duplje i grla koje je praćeno tipičnim simptomima kao što su bol, crvenilo i otok.

Lek Oktenidin Klosterfrau je indikovan za upotrebu kod odraslih osoba i adolescenata uzrasta od 12 godina i više.
Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 4 dana, morate se obratiti Vašem lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oktenidin Klosterfrau

Lek Oktenidin Klosterfrau ne smete uzimati
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na oktenidin-dihidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Oktenidin Klosterfrau.

Lek je namenjen samo za kratkotrajnu upotrebu.
Ne koristite ovaj lek duže od 4 dana.

Deca
Bezbednost i efikasnost leka Oktenidin Klosterfrau kod dece od 0 do 11 godina još uvek nisu utvrđene.

Drugi lekovi i lek Oktenidin Klosterfrau
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu sprovedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća
Trudnice treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe leka Oktenidin Klosterfrau.

Dojenje
Nema dovoljno informacija o izlučivanju oktenidin hidrohlorida u majčino mleko.
Rizik za odojče ne može se u potpunosti isključiti. Zbog toga, lek Oktenidin Klosterfrau ne treba koristiti tokom perioda dojenja.

Plodnost

Nisu sprovedena ispitivanja za procenu uticaja leka na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Oktenidin Klosterfrau sadrži izomalt (E 953).
Jedna lozenga sadrži 2,57 g izomalta kao zamene za šećer, što odgovara približno 6 kcal (26 kJ). To treba uzeti u obzir kod pacijenata sa šećernom bolešću. Izomalt može imati blago laksativno dejstvo.

Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete ovaj lek.

3. Kako se uzima lek Oktenidin Klosterfrau

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:
Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i više treba polako da otapaju jednu lozengu svaka 2-3 sata. Maksimalna dnevna doza je 6 lozengi.

Način primene leka:
Lozenge treba aktivno i neprekidno sisati u ustima. Lozenga treba da se pokreće u ustima, dok se rastvori u potpunosti.
Lek Oktenidin Klosterfrau ne treba koristiti duže od 4 dana. Ukoliko je proteklo manje od 100 dana od prethodne primene lozengi sa oktenidinom, nije preporučljiva ponovna primena.

Neželjena dejstva se mogu smanjiti primenom najmanje doze kojom se postiže efekat tokom najkraćeg perioda potrebnog za olakšanje simptoma.

Ako ste uzeli više leka Oktenidin Klosterfrau nego što treba
U malo verovatnom slučaju predoziranja, opisana neželjena dejstva mogu biti pojačana. U tom slučaju, obratite se Vašem lekaru za lečenje simptoma predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Oktenidin Klosterfrau
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
- Poremećaj čula ukusa (disgeuzija).

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
- Bol u stomaku, dijareja, mučnina, suva usta, povraćanje, dispepsija, epigastrična nelagoda.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- Iritacija sluzokože usne duplje i želuca
- Promena boje jezika.
- Alergijske reakcije.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Oktenidin Klosterfrau

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Oktenidin Klosterfrau posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati blister u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Oktenidin Klosterfrau

- Aktivna supstanca je oktenidin-dihidrohlorid. Jedna lozenga sadrži 2,6 mg oktenidin-dihidrohlorida.
- Pomoćne supstance su: izomalt (E 953), vinska kiselina, aroma za ublažavanje gorkog ukusa (sadrži propilenglikol, ekstrakt kafe i 4-(2,2,3-trimetilciklopentil)buternu kiselinu), ulje zvezdastog anisa, ulje peperminta, sukraloza (E 955).

Kako izgleda lek Oktenidin Klosterfrau i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago providne lozenge boje slonovače, prečnika oko 19 mm.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC/alu blister, koji sadrži 8, 10 ili 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze jedan blister sa 12 lozengi (ukupno 12 lozengi) ili 2 blistra sa 8 lozengi (ukupno 16 lozengi), ili dva blistera sa 10 lozengi (ukupno 20 lozengi) ili dva blistera sa 12 lozengi (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRAD
Bore Stankovića 2, Beograd

Proizvođač
KLOSTERFRAU BERLIN GMBH, Motzener Strasse 41, Marienfelde, Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Septembar, 2026.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
Oktenidin Klosterfrau, 2,6 mg, lozenge, 12 lozengi: 000461526 2023 od 23.09.2026.
Oktenidin Klosterfrau, 2,6 mg, lozenge, 16 lozengi: 000461743 2023 od 23.09.2026.
Oktenidin Klosterfrau, 2,6 mg, lozenge, 20 lozengi: 000461744 2023 od 23.09.2026.
Oktenidin Klosterfrau, 2,6 mg, lozenge, 24 lozengi: 000461745 2023 od 23.09.2026.