

UPUTSTVO ZA LEK

Oldon[®], 250 mg/250 mg /65 mg, tablete
acetilsalicilna kiselina/paracetamol/kofein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana u slučaju migrene ili 4 dana u slučaju glavobolje, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Oldon i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oldon
3. Kako se uzima lek Oldon
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Oldon
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Oldon i čemu je namenjen

Lek Oldon sadrži tri aktivne supstance: acetilsalicilnu kiselinu, paracetamol, i kofein.

- Acetilsalicilna kiselina i paracetamol smanjuju bol i povišenu telesnu temperaturu, a acetilsalicilna kiselina takođe smanjuje i zapaljenje.
- Kofein je blagi stimulans i pojačava dejstvo acetilsalicilne kiseline i paracetamola.

Lek Oldon se koristi kod odraslih za akutno lečenje glavobolje i migrenoznih napada (sa simptomima poput glavobolje, mučnine, osetljivosti na svetlost i zvuk i funkcionalne onesposobljenosti) sa ili bez aure.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oldon

Lek Oldon ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu, paracetamol, kofein ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);
- ukoliko ste nekada imali alergijsku reakciju na druge lekove koji se koriste za lečenje bola, zapaljenja ili povišene telesne temperature, kao što su acetilsalicilna kiselina i salicilati, ili bilo koje druge lekove poznate kao NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), kao što su diklofenak ili ibuprofen; reakcije mogu uključivati astmu, zviždanje u grudima ili kratak dah: osip na koži ili koprivnjaču; oticanje lica ili jezika; curenje iz nosa; ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
- ukoliko imate čir na želucu ili crevu, ili ako imate peptički ulkus u istoriji bolesti;
- ukoliko ste primetili krv u stolici ili crnu stolicu (simptomi gastrointestinalnog krvarenja ili perforacije);
- ukoliko ste hemofilicar ili patite od drugih bolesti krvi;
- ukoliko imate ozbiljne probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima;
- ukoliko uzimate više od 15 mg metotreksata nedeljno (videti odeljak „Drugi lekovi i lek Oldon”);
- ukoliko ste u poslednja 3 meseca trudnoće (videti odeljak „Trudnoća, dojenje i plodnost“).

Upozorenja i mere opreza

Lek Oldon sadrži paracetamol. Nemojte uzimati više od preporučene doze jer to može ozbiljno oštetiti Vašu jetru.

Acetilsalicilna kiselina može izazvati krvarenje. Morate se obratiti lekaru ukoliko se pojavi bilo kakvo neuobičajeno krvarenje.

U nastavku su razlozi zbog kojih lek Oldon možda nije prikladan za Vas. Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Oldon ukoliko:

- Vam ranije nije postavljena dijagnoza migrene, jer je potrebno isključiti potencijalno ozbiljna stanja koja se odnose na mozak ili nerve pre upotrebe ovog leka;
- imate migrenu koja je toliko jaka da zahteva mirovanje ili glavobolju koja se razlikuje od Vaše uobičajene migrene ili ukoliko povraćate tokom migrenske glavobolje;
- ste dobili glavobolje nakon ili uzrokovane povredom glave, naporom, kašljem ili savijanjem;
- imate hronične glavobolje (15 ili više dana mesečno u periodu dužem od 3 meseca) ili ako ste dobili prvu glavobolju nakon 50. godine;
- imate probleme sa jetrom ili bubrezima, imate manjak kilograma ili ste neuhranjeni ili redovno pijete alkohol; možda ćete morati potpuno da izbegavate korišćenje ovog leka ili da ograničite količinu paracetamola koju uzimate;
- patite od naslednog stanja koje se naziva nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze koja utiče na crvena krvna zrnca i može izazvati anemiju, žuticu ili uvećanje slezine kada ste izloženi određenoj hrani, lekovima kao što su neki antiinflamatorni lekovi (npr. acetilsalicilna kiselina) ili drugim bolestima;

- ste nekada imali gastrointestinalne probleme kao što su čir na želucu, krvarenje ili crna stolica; ako ste imali nelagodnost u stomaku ili gorušicu nakon uzimanja lekova protiv bolova ili antiinflamatornih lekova u prošlosti;
- patite od poremećaja krvarenja ili abnormalnog vaginalnog krvarenja, osim Vašeg menstrualnog krvarenja (npr. neuobičajeno obilne i produžene menstruacije);
- ste nedavno bili podvrgnuti hirurškoj intervenciji (uključujući i manje, kao što je stomatološka operacija) ili ćete se podvrgnuti operaciji u narednih 7 dana;
- imate bronhijalnu astmu, polensku kijavicu, polipe u nosu, hroničnu respiratornu bolest pluća ili razvijate alergijske simptome (npr. reakcija na koži, svrab, koprivnjača);
- imate giht, dijabetes, hipertireozu, aritmiju, nekontrolisanu hipertenziju, oštećenu funkciju bubrega ili jetre;
- imate problema sa alkoholom (videti odeljak „Uzimanje leka Oldon sa hranom i pićima“);
- već uzimate druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol, ili druge lekove, jer neki mogu ometati dejstvo leka Oldon i izazvati neželjena dejstva (videti „Drugi lekovi i Oldon“);
- ste u riziku od dehidracije (npr. zbog povraćanja, dijareje ili pre ili posle velike operacije); ste mlađi od 18 godina; postoji moguća povezanost između acetilsalicilne kiseline i Rejevog sindroma kada se daje deci i adolescentima; Rejev sindrom je retka bolest koja pogađa mozak i jetru i može biti sa smrtnim ishodom; iz tog razloga, lek Oldon ne treba da se daje deci ili adolescentima mladim od 18 godina osim ako to nije izričito odredio lekar;
- imate teške bolesti, uključujući teško oštećenje funkcije bubrega ili sepsu (kada bakterije i njihovi toksini cirkulišu krvotokom dovodeći do oštećenja organa), ili ste pothranjeni, hronični teški konzument alkohola ili ako takođe koristite flukloksacilin (antibiotik). Ozbiljno stanje koje se zove metabolička acidoza (poremećaj tečnosti i krvi) je bila prijavljivana kod pacijenata koji su koristili paracetamol u uobičajenim dozama duži vremenski period ili kada je paracetamol korišćen sa flukloksacilinom. Znaci metaboličke acidoze mogu uključivati: ozbiljne poteškoće sa disanjem, sa dubokim, ubrzanim disanjem, pospanost, mučninu i povraćanje.

Druga upozorenja

Kao i kod bilo koje druge vrste lekova protiv bolova u terapiji glavobolje, prečesto uzimanje leka Oldon (više od 10 dana mesečno) sa istovremenim hroničnim glavoboljama (15 ili više dana mesečno), u periodu dužem od 3 meseca, može pogoršati Vaše glavobolje ili migrenu. Ukoliko smatrate da bi to mogao biti slučaj, obratite se Vašem lekaru za savet. Možda ćete morati da prestanete da uzimate lek Oldon da biste rešili problem.

Lek Oldon može ublažiti simptome infekcije (npr. glavobolju, visoku temperaturu) i prema tome može otežati otkrivanje infekcije. Ukoliko se ne osećate dobro i morate da posetite lekara, obavezno napomenite da uzimate lek Oldon. Lek Oldon može uticati na rezultate laboratorijskih testova. Ukoliko bude potrebno da uradite analize krvi, urina ili druge laboratorijske testove, ne zaboravite da napomenete Vašem lekaru da uzimate lek Oldon.

Drugi lekovi i lek Oldon

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Posebno, obavestite Vašeg lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- bilo koji drugi lek koji sadrži paracetamol, acetilsalicilnu kiselinu ili bilo koji drugi lek za ublažavanje bolova/smanjenje temperature;
- lekovi koji se koriste za sprečavanje preteranog zgrušavanja krvi (tzv. „razređivači krvi“) kao što su oralni antikoagulansi (npr. varfarin), heparin, trombolitici (npr. streptokinaza) ili drugi antiagregacioni lekovi (tiklopidin, klopidoogrel, cilostazol);
- kortikosteroidi (koriste se za ublažavanje zapaljenja);
- barbiturati i benzodiazepini (za lečenje anksioznosti i nesanice);
- litijum, selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ili fluvoksamin (za lečenje depresije);

- derivati sulfonilureje i insulin (za lečenje dijabetesa);
- metotreksat (za lečenje nekih vrsta raka, artritisa ili psorijaze);
- neki lekovi koji se koriste za lečenje infekcija (npr. rifampicin, izoniazid, hloramfenikol, ciprofloksacin ili pipemidinska kiselina);
- levotiroksin (za lečenje hipotireoze);
- metoklopramid (za lečenje mučnine i povraćanja);
- lekovi za epilepsiju;
- lekovi za povišen krvni pritisak i srčanu slabost;
- diuretici (za povećanje stvaranja urina i izlučivanje viška tečnosti);
- lekovi za giht;
- oralni kontraceptivi;
- zidovudin (za lečenje HIV infekcije);
- lekovi za terapiju sporog pražnjenja želuca kao što je propantelin;
- klopazapin (za lečenje šizofrenije);
- simpatomimetici (lekovi za podizanje niskog krvnog pritiska ili za lečenje zamućenosti nosa);
- lekovi za sprečavanje ili ublažavanje simptoma alergije;
- teofilin (za terapiju astme);
- terbinafin (za lečenje gljivičnih infekcija);
- cimetidin (za lečenje gorušice i peptičkih ulkusa);
- disulfiram (za lečenje zavisnosti od alkohola);
- nikotin (koristi se za odvikavanje od pušenja);
- holestiramin (za lečenje visokog nivoa holesterola);
- flukloksacilin (antibiotik), usled ozbiljnog rizika od poremećaja tečnosti i krvi (koji se zove metabolička acidoza) koji se mora hitno lečiti.

Uzimanje leka Oldon sa hranom i pićima

- **Alkohol**

Ukoliko konzumirate 3 ili više alkoholnih pića svakog dana, posavetujte se sa Vašim lekarom da li treba da uzimate ovaj lek ili druge lekove protiv bolova/za smanjenje povišene telesne temperature. Paracetamol i acetilsalicilna kiselina mogu izazvati oštećenje jetre i krvarenje u želucu.

- **Kofein**

Preporučena doza ovog leka sadrži kofeina otprilike koliko i jedna šoljica kafe. Ograničite unos lekova, hrane ili pića koji sadrže kofein dok uzimate ovaj lek jer previše kofeina može izazvati nervozu, razdražljivost, nesanicu i povremeno ubrzan rad srca.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ako nastavite ili započnete terapiju lekom Oldon tokom trudnoće po uputstvu lekara, onda koristite Oldon prema preporuci lekara i nemojte koristiti veću dozu od preporučene.

Trudnoća

Trudnoća - poslednji trimestar

Nemojte uzimati ovaj lek ako ste u poslednja 3 meseca trudnoće jer sadržaj acetilsalicilne kiseline može da naškodi Vašem nerođenom detetu ili da izazove probleme pri porođaju. Može izazvati probleme sa bubrezima i srcem kod Vaše nerođene bebe. To može uticati na Vašu i bebinu sklonost krvarenju i uzrokovati da porođaj bude kasnije ili duži od očekivanog.

Trudnoća - prvi i drugi trimester

Ne bi trebalo da uzimate lek Oldon tokom prvih 6 meseci trudnoće osim ako je to apsolutno neophodno i to savetuje Vaš lekar. Ako Vam je potreban tretman tokom ovog perioda ili dok pokušavate da zatrudnite, treba koristiti najnižu dozu u najkraćem mogućem periodu. Ako se uzima duže od nekoliko dana od 20. nedelje trudnoće nadalje, lek Oldon može da izazove probleme sa bubrezima kod Vaše nerođene bebe što može dovesti do niskog nivoa amniotske tečnosti koja okružuje bebu (oligohidramnion) ili sužavanja krvnog suda (*ductus arteriosus*) u srcu bebe. Ako Vam je potrebno lečenje duže od nekoliko dana, Vaš lekar može preporučiti dodatno praćenje.

Dojenje

Nemojte koristiti lek Oldon ukoliko dojite, jer može biti štetan za Vaše odojče. Pre upotrebe bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Plodnost

Lek Oldon pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova koji mogu štetno da utiču na plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan po prestanku uzimanja leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije poznato da primena leka Oldon utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Ukoliko primetite neželjene efekte kao što su vrtoglavica ili pospanost, ne bi trebalo da upravljate vozilima ili rukujete mašinama. Recite to Vašem lekaru što je pre moguće.

3. Kako se uzima lek Oldon

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli (18 godina i stariji)

- Za lečenje glavobolje

Uzmite 1 tabletu sa čašom vode kada se pojavi glavobolja. Ako je potrebno, možete uzeti još jednu tabletu 4 do 6 sati kasnije.

U slučaju jačeg bola uzmite 2 tablete sa čašom vode kada se pojavi glavobolja. Ako je potrebno, možete uzeti još 2 tablete 4 do 6 sati kasnije.

Nemojte koristiti lek Oldon za tretman glavobolje duže od 4 dana bez konsultacije sa Vašim lekarom.

- Za lečenje migrene

Uzmite 2 tablete sa čašom vode kada se pojave simptomi migrene ili aura migrene. Ako je potrebno, možete uzeti još 2 tablete, sa 4 do 6 sati između doza.

Ako ne osetite olakšanja od migrene u roku od 2 sata od prve doze od 2 tablete leka Oldon, trebalo bi da potražite savet lekara.

Nemojte koristiti lek Oldon za migrenu duže od 3 dana bez konsultacije sa Vašim lekarom.

I za lečenje glavobolje, i za lečenje migrene, ne smete prekoračiti ukupnu količinu od 6 tableta u periodu od 24 sata. Ovo odgovara dozi od 1500 mg acetilsalicilne kiseline, 1500 mg paracetamola i 390 mg kofeina. Produžena upotreba, osim pod medicinskim nadzorom, može biti štetna.

Stariji pacijenti:

Ne postoje posebne preporuke za doziranje. Ukoliko imate malu telesnu težinu, trebalo bi da potražite savet lekara ili farmaceuta.

Pacijenti sa problemima sa jetrom ili bubrežima

Trebalo bi da kažete Vašem lekaru ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrežima. Vaš lekar će možda morati da prilagodi interval doziranja ili trajanje lečenja. Nemojte uzimati lek Oldon ukoliko patite od ozbiljnih problema sa jetrom ili bubrežima.

Primena kod dece i adolescenata:

Lek Oldon ne treba da se daje deci i adolescentima mlađim od 18 godina (videti odeljak “Upozorenja i mere opreza”).

Ako ste uzeli više leka Oldon nego što treba

Ove tablete sadrže acetilsalicilnu kiselinu, paracetamol i kofein. Nemojte uzimati više od preporučene doze i ne uzimajte bilo koje druge lekove koji mogu da sadrže ove aktivne supstance ili bilo koje druge lekove koji se koriste za lečenje bola, zapaljenja ili povišene telesne temperature (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) dok koristite lek Oldon.

Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili idite u najbližu bolnicu čim shvatite da ste uzeli više leka Oldon nego što treba. Što skoriji medicinski nadzor je neophodan, zbog mogućeg rizika od nepovratnog oštećenja jetre zbog dejstva paracetamola. Nemojte čekati da se pojave simptomi jer predoziranje možda u početku neće izazvati nikakve primetne simptome.

Ako se pojave simptomi predoziranja, to mogu biti za:

- acetilsalicilnu kiselinu: vrtoglavica, zujanje u ušima, gluvoća, znojenje, hiperventilacija, povišena telesna temperatura, mučnina, povraćanje, glavobolja, konfuzija ili nemir, cirkulatorni kolaps ili zastoj disanja (respiratorna insuficijencija);
- paracetamol: prvi simptomi koji se mogu pojaviti su mučnina, povraćanje, nedostatak apetita, bledilo, pospanost, znojenje, a kasnije i bol u stomaku;
- kofein: anksioznost, nervoza, nemir, nesanica, uzbuđenje, trzanje mišića, konfuzija, konvulzije, hiperglikemija, tahikardija ili srčana aritmija.

Čak i ako se ovi simptomi ne pojave ili ako se povuku, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Oldon

Uzmite dozu leka čim se setite, ali nikada nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Ne uzimajte više od 6 tableta u periodu od 24 sata.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Oldon i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko imate bilo koje od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava:

- alergijske reakcije sa oticanjem lica, usana, usta, jezika ili grla; ovo može izazvati poteškoće sa gutanjem, zviždanje u grudima, otežano disanje i osećaj stezanja u grudima (znaci astme); takođe možete imati osip ili svrab i doživeti nesvesticu;
- crvenilo kože, plikovi na usnama, očima ili ustima, ljuštenje kože, rane, afte;
- krvarenje u želucu ili crevima, čir na želucu ili crevima, koji može biti praćen jakim bolom u stomaku, krvavom ili crnom stolicom ili povraćanjem krvi; kao i kod svih lekova protiv bolova i povišene telesne temperature, ovo se može desiti u bilo kom trenutku tokom lečenja, bez prethodne istorije i može biti sa smrtnim ishodom; ovo neželjeno dejstvo je posebno ozbiljno kod starijih osoba;
- žuta boja kože ili očiju (znaci zatajenja jetre);
- omaglica ili vrtoglavica (znaci niskog krvnog pritiska);
- nepravilan rad srca;
- ukoliko ste imali probleme sa disanjem prilikom primene acetilsalicilne kiseline ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova i imate sličnu reakciju sa ovim lekom;
- neobjašnjiva pojava modrica ili krvarenja;
- povećanje broja krvarenja iz nosa ili modrica;
- otok ili zadržavanje vode;
- zujanje u ušima ili privremeni gubitak sluha;
- promene u ponašanju, mučnina i povraćanje (ovo može biti znak Rejevog sindroma).

U nastavku teksta su prijavljena neželjena dejstva u 16 kliničkih ispitivanja sprovedenih sa tabletama paracetamola/acetilsalicilne kiseline/kofeina na preko 4800 ispitanika. Recite Vašem lekaru ako primetite bilo koje od navedenih ostalih neželjenih dejstava.

Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- nervoza, vrtoglavica;
- mučnina, nelagodnost u stomaku.

Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- nesanica, drhtanje, utrnulost, glavobolja;
- suva usta, dijareja, povraćanje;
- umor, osećaj nervoze;
- povećan broj otkucaja srca.

Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- bol u grlu, otežano gutanje, utrnulost ili peckanje oko usta, povećano stvaranje pljuvačke;
- smanjen apetit, promenjen ukus;
- anksioznost, euforično raspoloženje, napetost;
- poremećaj pažnje, gubitak pamćenja, izmenjena koordinacija;
- osećaj bola u obrazima i čelu;
- bol u oku, poremećaj vida;
- naleti vrućine, problemi sa perifernim krvnim sudovima (npr. u rukama ili nogama);
- krvarenje iz nosa, sporo i plitko disanje, curenje iz nosa;
- podrigivanje, nadimanje;
- prekomerno znojenje, svrab, osip koji svrbi, povećana osetljivost kože;
- ukočenost mišića, kostiju ili zglobova; bol u vratu, bol u leđima, grčevi mišića;
- slabost, nelagodnost u grudima.

Neželjena dejstva koja su navedena u nastavku teksta su takođe prijavljena nakon stavljanja tableta paracetamola/ acetilsalicilne kiseline/ kofeina na tržište. Generalno, učestalost reakcija prilikom postmarketinškog praćenja se ne može precizno odrediti, tako da su ova neželjena dejstva navedena sa nepoznatom učestalošću:

- nemir, opšte loše ili neuobičajeno osećanje;
- somnolencija, migrena;
- crvenilo kože, osip; veoma retko su prijavljivani slučajevi ozbiljnih reakcija na koži;
- lupanje srca, nedostatak daha, iznenadno otežano disanje i osećaj stezanja u grudima sa zviždanjem ili kašljem (astma);
- bol u stomaku, nelagodnost u stomaku nakon jela;
- povećane vrednosti enzima jetre;
- otok i iritacija unutar nosa;
- problemi sa bubrezima;
- ozbiljno stanje koje može da poveća kiselost krvi (naziva se metabolička acidoza) kod pacijenata sa teškom bolešću koji su koristili paracetamol (videti odeljak 2).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
vebsajt: www.alims.gov.rs
i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Oldon

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Oldon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”, i na unutrašnjem pakovanju nakon („EXP“). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Oldon

Aktivne supstance su: acetilsalicilna kiselina, paracetamol i kofein.

Jedna tableta sadrži 250 mg acetilsalicilne kiseline, 250 mg paracetamola i 65 mg kofeina.

Pomoćne supstance su: hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizirani (kukuruzni); stearinska kiselina.

Kako izgleda lek Oldon i sadržaj pakovanja

Bele, duguljaste tablete (17,5 x 7,5 mm).

Unutrašnje pakovanje je perforirani Alu//PVC/PVdC blister sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister (ukupno 10 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

ZDRAVLJE AD LESKOVAC,
Vlajkova 199, Leskovac

Proizvođač:

DR. PFLEGER ARZNEIMITTEL GMBH,
Dr.- Robert-Pfleger-Strasse 12, Bamberg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

000749680 2024 od 18.03.2026.