UPUTSTVO ZA LEK

RIVAROX®, 10 mg, film tablete
rivaroksaban

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.>
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek RIVAROX i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RIVAROX
3. Kako se uzima lek RIVAROX
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek RIVAROX
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek RIVAROX i čemu je namenjen

Lek RIVAROX sadrži aktivnu supstancu rivaroksaban i koristi se kod odraslih osoba za:
- sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka u venama posle operacije kojom se ugrađuje veštački kuk ili koleno. Ovaj lek Vam je propisao Vaš lekar, jer postoji povećan rizik za stvaranje krvnih ugrušaka posle operacije.
- lečenje krvnih ugrušaka u venama nogu (tromboza dubokih vena) i u krvnim sudovima pluća (plućna embolija) i sprečavanje ponovnog nastanka krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu i/ili pluća.

Lek RIVAROX pripada grupi lekova koji se zovu antitrombotička sredstva (antikoagulansi). On deluje tako što blokira faktor zgrušavanja (koagulacije) krvi (faktor Xa) i time smanjuje sklonost krvi ka stvaranju ugrušaka.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RIVAROX

Lek RIVAROX ne smete uzimati:
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na rivaroksaban ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),
- ukoliko obilno krvarite,
- ako imate bolest ili stanje nekog organa u organizmu, koje povećava rizik od ozbiljnog krvarenja (npr. čir na želucu, povreda ili krvarenje u mozgu, nedavna hirurška intervencija na mozgu ili očima),
- ako uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (na primer varfarin, dabigatran, apiksaban ili heparin) osim kod promene antikoagulantnog lečenja ili kod dobijanja heparina kroz venski ili arterijski put da bi se održao otvorenim,
- ukoliko imate oboljenje jetre koje povećava rizik od krvarenja,
- ukoliko ste trudni ili dojite.

Ne smete uzimati lek RIVAROX i obavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas.

Upozorenja i mere opreza

Pre nego što počnete da uzimate lek RIVAROX, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Kada uzimate lek RIVAROX, posebno obratite pažnju:
- ukoliko imate povećan rizik od krvarenja što bi mogao biti slučaj u situacijama poput:
  - umerenog ili teškog oboljenja bubrega, jer funkcija Vaših bubrega može uticati na količinu leka koja deluje u Vašem organizmu,
  - ako uzimate druge lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (npr. varfarin, dabigatran, apiksaban ili heparin), kod promene antikoagulantne terapije ili dok dobijate heparin u venski ili arterijski kateter da bi se održao otvorenim (vidite odeljak „Drugi lekovi i lek RIVAROX “),
  - poremećaja krvarenja,,
  - veoma visokog krvnog pritiska koji nije pod kontrolom lekovima,
  - oboljenja želuca ili creva koja mogu da izazovu krvarenje, npr. zapaljenje creva ili želuca ili zapaljenje ezofagusa (jednjaka) npr. usled gastroezofagusne refluksne bolesti (bolest kod koje želudačna kiselina dolazi u kontakt sa jednjakom) ili tumori locirani u želucu, crevima, urinarnom ili genitalnom sistemu,
  - problema sa krvnim sudovima na očnom dnu (retinopatija),
  - oboljenja pluća pri kojem su bronhije proširene i ispunjene gnojem (bronhiektazija), ili u slučaju prethodnog krvarenja iz pluća.
- ako imate veštački srčani zalistak,
- ako znate da imate oboljenje koji se naziva antifosfolipidni sindrom (poremećaj imunskog sistema koji povećava rizik od zgrušavanja krvi) obavestite lekara, koji će proceniti da li je neophodno promeniti terapiju,
- ako Vaš lekar utvrdi da imate nestabilan krvni pritisak ili ukoliko je planirana operacija ili neka druga hirurška intervencija za ukljanjanje krvnog ugruška iz pluća.

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara pre nego što uzmete lek RIVAROX.
Vaš lekar će odlučiti da li treba da uzimate lek RIVAROX i da li treba da budete pod posebnim medicinskim nadzorom.

Ukoliko treba da se operišete:
- veoma je važno da lek RIVAROX, pre i posle operacije, uzimate u tačno određeno vreme, koje je odredio Vaš lekar.
- Ukoliko operacija kojoj se podvrgavate uključuje uvođenje katetera ili davanje injekcije u kičmeni stub (npr. za epiduralnu ili spinalnu anesteziju ili za smanjenje bola):
  - veoma je važno da lek RIVAROX uzmete u tačno određeno u vreme koje Vam je Vaš lekar odredio,
  - odmah se obratite Vašem lekaru, ukoliko osetite utrnulost ili slabost nogu ili probleme u funkciji creva ili mokraćne bešike po prestanku anestezije, jer je tada neophodno preduzeti hitne mere.

Deca i adolescenti
Lek RIVAROX se **ne preporučuje osobama mlađim od 18 godina**. Nema dovoljno podataka o njegovoj upotrebi kod dece i adolescenata.

Drugi lekovi i lek RIVAROX
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
- Ukoliko uzimate:
  - neke lekove za lečenje gljivične infekcije (npr. flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), osim ako se oni nanose samo na kožu,
  - ketokonazol tablete (koriste se u terapiji Kušingovog sindroma - kada organizam stvara veće količine hormona kortizola),
  - neke lekove za lečenje bakterijskih infekcija (npr. klaritromicin, eritromicin),
  - neke antivirusne lekove za lečenje HIV/AIDS (npr. ritonavir),
  - neke lekove koji smanjuju zgrušavanje krvi (npr. enoksaparin, klopidogrel ili antagoniste vitamina K poput varfarina i acenokumarola),
  - lekove za lečenje zapaljenja ili za ublažavanje bolova (npr. naproksen ili acetilsalicilna kiselina),
  - dronedaron, lek za terapiju poremećaja srčanog ritma,
  - neke lekove za lečenje depresije (selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) i inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI)).

Ukoliko se bilo šta od navedenog u nastavku odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara pre nego što počnete da uzimate lek RIVAROX, pošto mu dejstvo može biti pojačano. Vaš lekar će odlučiti da li treba da se lečite ovim lekom i da li treba da budete pod posebnim medicinskim nadzorom. Ako Vaš lekar misli da kod Vas postoji povećan rizik za pojavu čireva na želucu ili crevima, može Vam takođe propisati terapiju za sprečavanje nastanka čira.

- Ukoliko uzimate:
  - neke lekove za lečenje epilepsije (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital),
  - kantarion (*Hypericum perforatum*), biljni proizvod za lečenje depresije,
  - rifampicin, antibiotik.

Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara pre nego što počnete da uzimate lek RIVAROX, pošto mu dejstvo može biti oslabljeno. Vaš lekar će odlučiti da li treba da se lečite lekom RIVAROX i da li treba da budete pod posebnim medicinskim nadzorom.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ukoliko ste trudni ili dojite nemojte uzimati lek RIVAROX. Ukoliko postoji mogućnost da zatrudnite, koristite pouzdana kontraceptivna sredstva dok uzimate lek RIVAROX. Ukoliko zatrudnite dok uzimate ovaj lek, odmah obavestite o tome Vašeg lekara, koji će odlučiti o Vašem daljem lečenju.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek RIVAROX može uzrokovati vrtoglavicu (često neželjeno dejstvo) ili nesvesticu (povremeno neželjeno dejstvo) (videti odeljak 4 „Moguća neželjena dejstva“). Nemojte da upravljate vozilima, vozite bicikl niti da rukujete bilo kakvim alatima ili mašinama ukoliko se kod Vas jave ovi simptomi.

Lek RIVAROX sadrži laktozu
Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek RIVAROX

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Koliko tableta uzeti
- Za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka posle operacije zamene kuka ili kolena.

  Preporučena doza je jedna tableta leka RIVAROX u dozi od 10 mg jednom dnevno.

- Za lečenje krvnih ugrušaka u venama nogu i krvnih ugrušaka u krvnim sudovima pluća i sprečavanje ponovnog nastanka krvnih ugrušaka.

  Posle najmanje 6 meseci od početka lečenja krvnih ugrušaka, preporučena doza je ili jedna tableta u dozi od 10 mg jednom dnevno ili jedna tableta u dozi od 20 mg jednom dnevno. Vaš lekar Vam je propisao lek RIVAROX u dozi od 10 mg jednom dnevno.

Progutajte tabletu, najbolje sa vodom.
Lek RIVAROX se može uzimati sa ili bez hrane.
Ako imate poteškoća sa gutanjem cele tablete, obratite se svom lekaru kako biste se posavetovali o drugim načinima primene leka RIVAROX.
Tableta se može usitniti i pomešati sa vodom ili kašom od jabuke neposredno pre primene.
Ukoliko je potrebno, lekar Vam može primeniti usitnjenu tabletu leka RIVAROX i putem želudačne sonde.

Kada se uzima lek RIVAROX
Uzimajte po jednu tabletu svakog dana sve dok Vam lekar ne kaže da više ne uzimate lek RIVAROX.
Pokušajte da uzimate lek RIVAROX u isto vreme svakog dana da biste lakše zapamtili kada treba da uzmete lek.
Vaš lekar će odlučiti koliko dugo će trajati lečenje.

Za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka u venama posle operacije zamene kuka ili kolena:
Prvu tabletu uzmite 6-10 sati posle operacije.
Ukoliko ste imali operaciju zamene (ugradnje) kuka, obično ćete uzimati tablete 5 nedelja.
Ukoliko ste imali operaciju zamene (ugradnje) kolena, obično ćete uzimati tablete 2 nedelje.

Ako ste uzeli više leka RIVAROX nego što treba
Obavestite odmah Vašeg lekara ukoliko ste uzeli previše tableta leka RIVAROX. Uzimanje prevelike doze leka RIVAROX povećava rizik od krvarenja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek RIVAROX
Ukoliko ste propustili dozu, uzmite je čim se setite. Uzmite sledeću tabletu narednog dana, a zatim nastavite da normalno uzimate tabletu jednom dnevno u uobičajeno vreme.
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek RIVAROX
Ne smete prestati da uzimate lek RIVAROX, ukoliko prethodno o tome niste porazgovarali sa Vašim lekarom, pošto lek RIVAROX sprečava razvoj ozbiljnog poremećaja.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Kao i drugi slični lekovi koji sprečavaju nastanak krvnih ugrušaka, lek RIVAROX može izazvati krvarenja koja mogu biti životno ugrožavajuća. Obilno krvarenje može dovesti do naglog pada krvnog pritiska (šoka). U nekim slučajevima, ova krvarenja ne moraju biti vidljiva.

Odmah obavestite svog lekara ako se javi neko od sledećih neželjenih dejstava:

Znaci krvarenja
- krvarenje u mozgu ili unutar - lobanje (simptomi uključuju glavobolju, slabost jedne strane tela, povraćanje, epileptične napade, smanjeno stanje svesti i ukočenost vrata. U pitanju je ozbiljno zdravstveno stanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć!),
- dugotrajno ili obilno krvarenje,
- neuobičajena slabost, umor, bledilo, vrtoglavica, glavobolja, pojava otoka iz neobjašnjivog razloga, nedostatak vazduha, bol u grudima ili angina pektoris, što mogu biti znaci krvarenja.
Vaš lekar može odlučiti da budete pod posebnim medicinskim nadzorom ili da promeni Vašu terapiju.

Znaci teške reakcije na koži:
- intenzivan osip na koži koji se širi, plikovi ili oštećenja (lezije) na sluzokoži, npr. u ustima ili očima (*Stevens-Johns*-on sindrom/ Toksična epidermalna nekroliza),
- reakcija na lek u vidu osipa na koži, povišene telesne temperature, zapaljenja unutrašnjih organa, hematoloških poremećaja i sistemske bolesti (DRESS sindrom).
Ova neželjena dejstva prema učestalosti pripadaju grupi veoma retkih neželjenih dejstava (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

Znaci teške alergijske reakcije:
- oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla; otežano gutanje; koprivnjača i otežano disanje; nagli pad krvnog pritiska.
Teške neželjene reakcije prema učestalosti pripadaju grupi veoma retkih neželjenih dejstava (anafilaktička reakcija, uključujući anafilaktički šok; mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) i povremeno (angioedem i alergijski edem; mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

Lista svih mogućih neželjenih dejstava:

Česta neželjena dejstva *(mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek*):
- smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca što može dovesti do bledila kože i izazvati slabost ili nedostatak vazduha,
- krvarenje u želucu ili crevima, urogenitalno krvarenje (uključujući krv u mokraći i obilno menstrualno krvarenje), krvarenje iz nosa, krvarenje desni,
- krvarenje u oku (uključujući krvarenje iz beonjača),
- krvarenje u tkiva ili telesne šupljine (hematom, modrice),

- iskašljavanje krvi,
- krvarenje iz kože ili potkožno krvarenje,
- krvarenje nakon operacije,
- curenje krvi ili tečnosti iz hiruške rane,
- otok ekstremiteta (ruku i nogu),
- bol u ekstremitetima (rukama i nogama),
- oštećenje funkcije bubrega (može se utvrditi na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja koje uradi Vaš lekar),
- povišena telesna temperatura,
- bol u stomaku, otežano varenje, mučnina ili povraćanje, otežano pražnjenje creva, proliv,
- nizak krvni pritisak (simptomi mogu biti vrtoglavica ili nesvestica prilikom ustajanja),
- osećaj opšteg smanjenja snage i energije (slabost, umor), glavobolja, vrtoglavica,
- osip, svrab kože,
- laboratorijske analize krvi mogu pokazati povećanje vrednosti nekih enzima jetre.

Povremena neželjena dejstva *(mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek*):
- krvarenje u mozgu ili unutar lobanje (vidite u prethodnom tekstu „Znaci krvarenja“),
- krvarenje u zglobu koje izaziva bol i otok,
- trombocitopenija (smanjen broj trombocita, ćelija koje pomažu zgrušavanje krvi),
- alergijske reakcije, uključujući alergijske reakcije na koži,
- poremećaj funkcija jetre (može se utvrditi na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja koje uradi Vaš lekar),
- laboratorijske analize krvi mogu pokazati povećanje vrednosti bilirubina, nekih pankreasnih enzima ili enzima jetre ili broja trombocita,
- nesvestica,
- opšte loše stanje,
- ubrzan rad srca,
- suvoća usta,
- koprivnjača.

Retka neželjena dejstva *(mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek*):
- krvarenje u mišiću,
- holestaza (smanjen protok žuči), hepatitis uključujući hepatocelularno oštećenje (zapaljenje jetre uključujući oštećenje ćelija jetre),
- žuta prebojenost kože i beonjača (žutica),
- lokalizovani otok,
- nakupljanje krvi (podliv - hematom) u preponama koji nastaje kao komplikacija hirurške intervencije na srcu kada se kateter postavlja u arteriju noge (pseudoaneurizma).

Veoma retka neželjena dejstva *(mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek*):
- nakupljanje eozinofila, vrste belih krvnih zrnaca, koje izaziva zapaljenje pluća (eozinofilna pneumonija).

Nepoznata učestalost *(ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)*
- slabost bubrega nakon teškog krvarenja,
- krvarenje u bubregu, ponekad uz prisustvo krvi u urinu, koje dovodi do poremećaja rada bubrega (nefropatija povezana sa primenom antikoagulanasa),
- povećan pritisak unutar mišića nogu ili ruku nakon krvarenja, što dovodi do bola, otoka, promenjenih senzacija, utrnulosti ili paralize (kompartment sindrom nakon krvarenja).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek RIVAROX

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek RIVAROX posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek RIVAROX

Jedna film tableta sadrži 10 mg rivaroksabana.

Pomoćne supstance:
Jezgro film tablete: celuloza, mikrokristalna (tip 101); laktoza, monohidrat; hipromeloza (E5) 2910; natrijum-laurilsulfat; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: hipromeloza+makrogol (hipromeloza 2910, makrogol 400, makrogol 8000); titan-dioksid
(E171); gvožđje (III)-oksid, crveni (E172).

Kako izgleda lek RIVAROX i sadržaj pakovanja
Okrugle, bikonveksne film tablete svetlo-ružičaste boje, sa utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani.

Blister sadrži 10 film tableta i nalazi se u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i proizvođač
GALENIKA A.D. BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) izdavanje.

Broj i datum dozvole:

000901517 2026 od 21.09.2026.

Kartica sa upozorenjima za pacijenta
RIVAROX® 10 mg film tablete
RIVAROX® 15 mg film tablete
RIVAROX® 20 mg film tablete

Odaberite propisanu dozu

- Ovu karticu stalno imajte kod sebe.
- Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije.

Šta treba da znam o leku RIVAROX?
- Lek RIVAROX razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Lek RIVAROX morate uzimati tačno onako kako Vam je propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, nikad ne preskačite dozu.
- Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka RIVAROX, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste donedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek RIVAROX.
- Obavestite svog lekara o tome da uzimate lek RIVAROX pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet od svog lekara?
Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je lek RIVAROX, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte počinjati sa uzimanjem leka RIVAROX ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.
Odmah obavestite svog lekara ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su sledeći:
- bol,
- otok ili nelagodnost,
- glavobolja, vrtoglavica ili slabost,
- neuobičajena pojava modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, krvarenja iz posekotina kojima treba mnogo vremena da prestanu,
- menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično,
- krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica,
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe.

Kako da uzimam lek RIVAROX?
Da bi se obezbedila optimalna zaštita:
- RIVAROX 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje.
- RIVAROX 15 mg se mora uzimati sa hranom.
- RIVAROX 20 mg se mora uzimati sa hranom.

PRIMAM antikoagulantnu terapiju lekom RIVAROX (rivaroksaban)

_____
Ime

_____
Adresa

_____
Datum rođenja

_____
Telesna masa

_____
Drugi lekovi/stanja
_____
_____
_____
_____

U hitnom slučaju obavestite:

_____
Ime lekara
_____
Telefon lekara

Pečat lekara

Podaci o pacijentima (lični podaci pacijenata)
nisu dostupni kompaniji Galenika a.d. Beograd

Takođe obavestite:

_____
Ime
_____
Telefon
_____
Srodstvo

Informacija za zdravstvene radnike:
♦ INR vrednosti ne treba da se koriste, jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti leka RIVAROX.