# UPUTSTVO ZA LEK

**Maymetsi®, 50 mg/850 mg, film tablete**
**Maymetsi®, 50 mg/1000 mg, film tablete**

sitagliptin/metformin

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.**
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

**U ovom uputstvu pročitaćete:**


1. Šta je lek Maymetsi i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maymetsi
3. Kako se uzima lek Maymetsi
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Maymetsi
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

## 1. Šta je lek Maymetsi i čemu je namenjen

Lek Maymetsi sadrži dve različite aktivne supstance, a to su sitagliptin i metformin:
- sitagliptin pripada grupi lekova po imenu DPP-4 inhibitori (inhibitori dipeptidil-peptidaze-4)
- metformin pripada grupi lekova po imenu bigvanidini.

Oni zajedničkim dejstvom kontrolišu koncentraciju šećera u krvi kod odraslih pacijenata sa oblikom dijabetesa (šećerna bolest) koji se zove „dijabetes melitus tip 2“. Ovaj lek pomaže u povećanju koncentracije insulina posle jela i snižava količinu šećera koju stvara Vaš organizam.

Lek Maymetsi uz dijetu i fizičku aktivnost pomaže da Vam se smanji koncentracija šećera u krvi. Ovaj lek se može koristiti sam ili sa nekim drugim lekovima za terapiju šećerne bolesti (insulin, derivati sulfoniluree ili glitazoni).

**Šta je dijabetes tipa 2**
Dijabetes tipa 2 predstavlja stanje u kome Vaš organizam ne proizvodi dovoljno insulina i/ili insulin koji proizvede Vaš organizam ne deluje kako bi trebalo. Vaš organizam može da proizvodi previše šećera. Kada se to desi, šećer (glukoza) se nagomilava u krvi. Ukoliko ovo stanje traje duže, može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su bolesti srca, bolesti bubrega, slepilo ili amputacija.

## 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maymetsi

**Lek Maymetsi ne smete uzimati:**
- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na metformin, sitagliptin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Maymetsi (navedene u odeljku 6),
- ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega,
- ukoliko imate šećernu bolest koja nije pod kontrolom, sa teškom hiperglikemijom (visoka koncentracija glukoze u krvi), mučninom, povraćanjem, dijarejom, naglim gubitkom telesne mase, laktoacidozom (vidite „Rizik od laktoacidoze“ u nastavku teksta) ili ketoacidozom. Ketoacidoza je stanje u kome se supstance pod nazivom ketoni nakupljaju u krvi, što može da dovede do dijabetesne prekome. Simptomi uključuju bol u stomaku, ubrzano i duboko disanje, pospanost ili Vaš dah može da dobije neobičan, voćni miris.
- ukoliko imate tešku infekciju ili ste dehidrirani,
- ukoliko treba da idete na snimanje rendgenom pri čemu će Vam ubrizgati kontrastno sredstvo; Moraćete da prestanete da uzimate lek Maymetsi u vreme snimanja i dva ili nekoliko dana posle snimanja, ako Vam je tako rekao lekar, u zavisnosti od toga kako Vam rade bubrezi.
- ukoliko ste nedavno imali srčani udar ili ukoliko imate ozbiljne probleme sa cirkulacijom, kao što je „šok“ ili teškoće u disanju,
- ukoliko imate probleme sa radom jetre,
- ukoliko prekomerno konzumirate alkohol (bilo svakog dana ili povremeno),
- ukoliko dojite.

Nemojte uzimati lek Maymetsi ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas i razgovarajte sa svojim lekarom o drugim terapijama za šećernu bolest. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Maymetsi.

**Upozorenja i mere opreza**
Kod pacijenata koji su uzimali kombinaciju leka sitagliptin/metformin zabeleženi su slučajevi zapaljenja pankreasa (pankreatitis) (vidite odeljak 4).

Ukoliko Vam se pojave plikovi po koži, to može biti znak bolesti koja se naziva bulozni pemfigoid. Vaš lekar će možda tražiti od Vas da prestanete sa uzimanjem leka Maymetsi.

**<u>Rizik od laktoacidoze</u>**
Primena leka Maymetsi može da izazove veoma retku, ali veoma ozbiljnu neželjenu reakciju koja se zove laktoacidoza, posebno u slučaju kada postoji problem u radu bubrega. Rizik od razvijanja

laktoacidoze je povećan i kod nekontrolisanog dijabetesa, ozbiljnih infekcija, produženog gladovanja ili uzimanja alkohola, dehidratacije (dodatne informacije vidite u nastavku teksta), kada postoji problem u radu jetre ili u slučaju bilo kog zdravstvenog stanja kada deo tela ima smanjeno snabdevanje kiseonikom (kao što je akutna teška bolest srca).
Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom u vezi daljih instrukcija.

Odmah se posavetujte sa svojim lekarom za dalja uputstva ako:
- bolujete od genetski naslednih bolesti koje utiču na mitohondrije (komponente unutar ćelija koje proizvode energiju) kao što su MELAS sindrom (mitohondrijska encefalopatija, miopatija, laktoacidoza i epizode slične moždanom udaru) ili sindroma dijabetesa i gluvoće naslednog po majci (MIDD);
- imate bilo koji od navedenih simptoma nakon početka primene metformina: epileptični napad, smanjenje kognitivnih sposobnosti, poteškoće sa pokretima tela, simptome koji ukazuju na oštećenje nerava (npr. bol ili utrnulost), migrenu i gluvoću.

**Prestanite sa uzimanjem leka Maymetsi na kratko vreme ukoliko imate stanje koje je udruženo sa dehidratacijom** (značajnim gubitkom telesnih tečnosti), kao što je teško povraćanje, dijareja, povišena telesna temperatura, izloženost toploti ili ukoliko uzimate manje tečnosti nego što je potrebno. Razgovarajte sa svojim lekarom u vezi daljih instrukcija.

**Prestanite sa uzimanjem leka Maymetsi i odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu, ukoliko imate neke od simptoma laktoacidoze,** jer ovo stanje može dovesti do kome.
Simptomi laktoacidoze uključuju:
- povraćanje,
- bol u stomaku (abdominalni bol),
- grčeve u mišićima,
- malaksalost sa izraženim zamaranjem,
- otežano disanje,
- smanjenje telesne temperature i ubrzan rad srca.

Laktoacidoza je urgentno stanje i mora se lečiti u bolnici.

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Maymetsi:
- ukoliko imate ili ste ikada imali oboljenje pankreasa (kao što je pankreatitis),
- ukoliko imate ili ste imali kamen u žuči, ako ste alkoholičar ili imate veoma velike vrednosti triglicerida (vrsta masnoća) u krvi; Ova zdravstvena stanja mogu povećati Vaše šanse da dobijete pankreatitis ili da ga dobijete ponovo (vidite odeljak 4).
- ukoliko imate dijabetes tip 1. On se naziva insulin zavisni dijabetes.
- ukoliko imate ili ste imali alergijsku reakciju na sitagliptin, metformin, njihovu kombinaciju ili na lek Maymetsi (vidite odeljak 4),
- ukoliko zajedno sa lekom Maymetsi uzimate derivate sulfoniluree ili insulin, lekove protiv dijabetesa, može se javiti smanjena koncentracija šećera u krvi (hipoglikemija). Lekar Vam može smanjiti dozu derivata sulfoniluree ili insulina.

Ukoliko bi trebalo da imate ozbiljnu hiruršku intervenciju, morate da prestanete da uzimate lek Maymetsi za vreme i nekoliko dana posle nje. Vaš lekar će odlučiti kada morate da prestane da uzimate i kada možete ponovo da počnete sa uzimanjem leka Maymetsi.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Maymetsi.

Za vreme terapije lekom Maymetsi, lekar će Vam proveravati funkciju bubrega, najmanje jednom godišnje ili češće ako ste starija osoba ili već imate oštećenu funkciju bubrega.

**Deca i adolescenti**

Deca i adolescenti uzrasta ispod 18 godina ne smeju da koriste ovaj lek. Ovaj lek nije efikasan kod dece i adolescenata uzrasta od 10 do 17 godina. Nije poznato da li je primena ovog leka bezbedna i efikasna kod dece uzrasta ispod 10 godina.

**Drugi lekovi i lek Maymetsi**
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

Ukoliko je potrebno da primite injekciju kontrastnog sredstva koje sadrži jod, za potrebe snimanja rendgenom ili skenerom, moraćete da prestanete da uzimate lek Maymetsi pre primanja injekcije. Vaš lekar će odlučiti kada ćete da prekinete, a kada da nastavite terapiju lekom Maymetsi.

Možda će biti potrebna češća kontrola koncentracije glukoze u krvi, kao i bubrežne funkcije ili će Vaš lekar morati da prilagodi doziranje leka Maymetsi.

Ovo je posebno značajno kada su u pitanju sledeći lekovi:
- lekovi (koji se uzimaju tako što se progutaju (oralno), udisanjem (inhalatorno) ili putem injekcija) koji se koriste za lečenje oboljenja koja obuhvataju zapaljenja, kao što su astma ili artritis (kortikosteroidi),
- lekovi koji povećavaju stvaranje mokraće (diuretici),
- lekovi koji se koriste u terapiji bola i zapaljenja (NSAIL, COX-2 inhibitori, kao što su ibuprofen i celekoksib),
- određeni lekovi koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska (ACE inhibitori i antagonisti angiotenzin II receptora),
- specifični lekovi za lečenje bronhijalne astme (β-simpatomimetici),
- kontrastna sredstva na bazi joda ili lekovi koji sadrže alkohol,
- određeni lekovi koji se koriste za lečenje problema sa želucem, kao što je cimetidin,
- ranolazin, lek koji se koristi u terapiji angine,
- dolutegravir, lek koji se koristi u terapiji HIV infekcije,
- vandetanib, lek koji se u koristi u terapiji karcinoma štitaste žlezde (medularni tireoidni karcinom),
- digoksin (lek koji se koristi u terapiji nepravilnog rada srca i drugih srčanih problema). Ukoliko uzimate lek Maymetsi, možda će biti neophodna kontrola koncentracije digoksina u krvi.

**Uzimanje leka Maymetsi sa alkoholom**
Izbegavati prekomeran unos alkohola za vreme terapije lekom Maymetsi, jer alkohol povećava rizik za dobijanje laktoacidoze (vidite deo „Upozorenja i mere opreza“).

**Trudnoća i dojenje**
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet, pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne treba da uzimate ovaj lek u toku trudnoće. Ako dojite ne smete uzimati lek Maymetsi.
Vidite u odeljku 2 „Lek Maymetsi ne smete uzimati”.

**Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama**
Ovaj lek nema uticaj ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, pri uzimanju sitagliptina mogu se pojaviti vrtoglavica i pospanost, što može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.

Uzimanjem ovog leka u kombinaciji sa lekovima koji se nazivaju derivati sulfoniluree ili insulinom može doći do hipoglikemije koja može uticati na Vaše sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama ili prilikom rada bez sigurnog oslonca.
**Lek Maymetsi sadrži natrijum**
Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, odnosno suštinski je „bez natrijuma“.

## 3. Kako se uzima lek Maymetsi

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

- Preporučena doza je:
  jedna tableta dva puta dnevno, oralno (na usta);
  uz obrok da bi se smanjila mogućnost pojave stomačnih tegoba.
- Vaš lekar će možda povećati dozu leka da bi kontrolisao Vaš šećer u krvi.
- Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš lekar može da Vam smanji dozu leka.

U toku terapije ovim lekom treba da nastavite dijetu i vodite računa da Vam unos ugljenih hidrata bude jednako raspoređen u toku dana.

Sam lek Maymetsi verovatno neće izazvati neuobičajeno smanjenu koncentraciju šećera u krvi (hipoglikemiju). Smanjena koncentracija šećera u krvi se može javiti kada se ovaj lek koristi sa lekom na bazi derivata sulfoniluree ili insulinom, pa lekar može da Vam smanji dozu derivata sulfoniluree ili insulina.

**Ako ste uzeli više leka Maymetsi nego što treba**
Ukoliko uzmete više od propisane doze ovog leka, odmah se obratite lekaru. Idite u bolnicu ako Vam se jave simptomi laktoacidoze kao što su: osećaj hladnoće ili nelagodnosti, jaka mučnina ili povraćanje, bol u stomaku, neobjašnjiv gubitak telesne mase, grčevi u mišićima ili ubrzano disanje (vidite „Upozorenja i mere opreza“).

**Ako ste zaboravili da uzmete lek Maymetsi**
Ako propustite dozu, uzmite je čim se setite. Ukoliko se setite tek kada je vreme za sledeću dozu, preskočite tu propuštenu dozu i vratite se na redovni raspored uzimanja leka. Ne uzimajte duplu dozu ovog leka da bi nadoknadili propuštenu dozu.

**Ako naglo prestanete da uzimate lek Maymetsi**
Nastavite da uzimate ovaj lek sve dok Vam lekar propisuje, da biste i dalje mogli da kontrolišete koncentraciju šećera u krvi. Ne treba da prestanete sa uzimanjem ovog leka pre nego što se posavetujete sa svojim lekarom. Ukoliko prestanete da uzimate lek Maymetsi, može ponovo da Vam poraste koncentracija šećera u krvi.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

## 4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

PRESTANITE sa uzimanjem leka Maymetsi i odmah se obratite lekaru ukoliko primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:
- jak i uporan bol u abdomenu (predeo stomaka), koji može da se proširi na leđa, sa mučninom ili bez mučnine i povraćanja, zato što ovo stanje može biti znak zapaljenja pankreasa (pankreatitisa).

Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) kod pacijenata koji uzimaju ovaj lek može da se razvije veoma ozbiljna neželjena reakcija - laktoacidoza (vidite „Upozorenja i mere opreza“). Ako se ovo dogodi morate da prestanete sa uzimanjem leka Maymetsi i **odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi**, jer laktoacidoza može da dovede do kome.

Prekinite sa uzimanjem ovog leka i odmah se obratite svom lekaru ukoliko dobijete ozbiljnu alergijsku reakciju (učestalost nije poznata), uključujući osip, koprivnjaču, plikove na koži/ljuštenje kože,

oticanje lica, usana, jezika i grla koje može da uzrokuje otežano disanje ili gutanje. Lekar može da Vam propiše lek za lečenje ove alergijske reakcije, kao i neki drugi lek za lečenje šećerne bolesti.

Kod nekih pacijenata koji su uzimali metformin pojavila su se sledeća neželjena dejstva nakon uvođenja terapije sitagliptinom:
Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): niska koncentracija šećera u krvi, mučnina, nadutost u stomaku, povraćanje.
Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): bol u stomaku, dijareja, zatvor, pospanost.

Kod nekih pacijenata, prilikom započinjanja istovremene terapije sitagliptinom i metforminom, pojavili su se dijareja, mučnina, nadutost u stomaku, otežano pražnjenje creva, bol u stomaku ili povraćanje (učestalost je česta ).

Kod nekih pacijenata, tokom uzimanja ovog leka zajedno sa derivatima sulfoniluree, na primer sa glimepiridom, pojavila su se sledeća neželjena dejstva:
Veoma često (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek ): smanjena koncentracija šećera u krvi.
Često: konstipacija (otežano pražnjenje creva).

Kod nekih pacijenata, tokom uzimanja ovog leka zajedno sa pioglitazonom, pojavila su se sledeća neželjena dejstva:
Često: oticanje šaka ili nogu.

Kod nekih pacijenata, tokom uzimanja ovog leka zajedno sa insulinom, pojavila su se sledeća neželjena dejstva:
Veoma često: smanjena koncentracija šećera u krvi.
Povremeno: suva usta, glavobolja.

Sledeća neželjena dejstva zabeležena su kod nekih pacijenata tokom kliničkih ispitivanja kada su uzimali sitagliptin sam (jedan od lekova koji su u sastavu leka Maymetsi) ili nakon stavljanja leka u promet tokom uzimanja kombinacije sitagliptin/ metformin, ili u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje dijabetesa:
Često: smanjena koncentracija šećera u krvi, glavobolja, infekcija gornjeg respiratornog trakta, zapušen nos ili curenje iz nosa i bolno grlo, osteoartritis, bol u rukama ili nogama.
Povremeno: vrtoglavica, otežano pražnjenje creva, svrab.
Retko: smanjen broj trombocita.
Nepoznata učestalost: problemi sa bubrezima (koji u nekim slučajevima zahtevaju dijalizu); povraćanje; bol u zglobovima; bol u mišićima; bol u leđima; intersticijalna bolest pluća, bulozni pemfigoid (podrazumeva promene na koži).

Kod nekih pacijenata zabeležena su sledeća neželjena dejstva tokom uzimanja samog metformina:
Veoma često: mučnina, povraćanje, dijareja, bol u stomaku i gubitak apetita. Ovi simptomi mogu da se pojave kada počnete da uzimate metformin i obično nestaju sami od sebe.
Često: metalni ukus u ustima, smanjena ili niska koncentracija vitamina B12 u krvi (simptomi mogu da uključuju izražen umor, bol i crvenilo jezika (glositis), trnjenje i bockanje (parestezija) ili bledu ili žutu kožu). Vaš lekar može sprovesti određene testove kako bi utvrdio uzrok Vaših simptoma, jer neki od njih mogu biti uzrokovani šećernom bolešću ili drugim zdravstvenim problemima koji nisu povezani.

Veoma retko: hepatitis (problem sa Vašom jetrom), koprivnjača, crvenilo kože (osip) ili svrab kože.

<u>Prijavljivanje neželjenih reakcija</u>

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmukolikovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

## 5. Kako čuvati lek Maymetsi

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Nemojte koristiti lek Maymetsi posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

*OPA/Alu/PVC//Alu blister:*
Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

*PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Alu blister:*
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

## 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

**Šta sadrži lek Maymetsi**
- Aktivne supstance su sitagliptin i metformin-hidrohlorid.
  Jedna film tableta sadrži 50 mg sitagliptina i 850 mg metformin-hidrohlorida.
  Jedna film tableta sadrži 50 mg sitagliptina i 1000 mg metformin-hidrohlorida.
- Pomoćne supstance u jezgru tablete su povidon K30; celuloza, mikrokristalna; manitol; natrijum-laurilsulfat i magnezijum-stearat. Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su hipromeloza; titan-dioksid; talk; propilenglikol i gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).

**Kako izgleda lek Lek Maymetsi i sadržaj pakovanja**
Lek Maymetsi, 50 mg/850 mg film tablete: ružičaste, ovalne, bikonveksne, film tablete sa oznakom C4 na jednoj strani tablete (dimenzije tablete: oko 20x11 mm).
Lek Maymetsi, 50 mg/1000 mg film tablete: tamnoružičaste, ovalne, bikonveksne, film tablete sa oznakom C3 na jednoj strani tablete (dimenzije tablete 21x11 mm).

*OPA/Alu/PVC//Alu blister:*
Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/Alu/PVC//Alu) sa 14 film tableta, obeležen ili neobeležen sa danima u nedelji (kalendarsko pakovanje).
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 4 blistera (ukupno 56 film tableta) od po 14 film tableta i Uputstvom za lek.

*PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Alu blister:*
Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Alu) sa 14 film tableta, obeležen ili neobeležen sa danima u nedelji (kalendarsko pakovanje).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 4 blistera (ukupno 56 film tableta) od po 14 film tableta i Uputstvom za lek.

**Nosilac dozvole**
KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**
Oktobar, 2026.

**Režim izdavanja leka:**
Lek se izdaje uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) izdavanje.

**Broj i datum dozvole:**
Maymetsi, film tablete, 56 x 50 mg/850 mg: 001705697 2026 od 19.10.2026.
Maymetsi, film tablete, 56 x 50 mg/1000 mg: 001705963 2026 od 19.10.2026.