

UPUTSTVO ZA LEK

Ticagrex[®], 90 mg, film-tablete
tikagrelor

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Ticagrex i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ticagrex
3. Kako se uzima lek Ticagrex
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Ticagrex
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Ticagrex i čemu je namenjen

Lek Ticagrex sadrži aktivnu supstancu koja se naziva tikagrelor. On pripada grupi lekova koji se nazivaju antitrombocitni lekovi.

Kada se lek Ticagrex koristi

Lek Ticagrex, se propisuje kod odraslih pacijenata u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom (još jednim antitrombocitnim lekom). Ovaj lek Vam je propisan zbog toga što ste imali:

- srčani udar, ili
- nestabilnu anginu (angina ili bol u grudima koji nisu pod dobrom kontrolom).

Lek Ticagrex smanjuje verovatnoću za ponovnu pojavu narednog srčanog ili moždanog udara ili smrti od bolesti koje su u vezi sa Vašim srcem ili krvnim sudovima.

Kako lek Ticagrex deluje

Lek Ticagrex deluje na ćelije koje se nazivaju „krvne pločice” (trombociti). Ove veoma male krvne ćelije pomažu da se zaustavi krvarenje tako što se nakupljaju kako bi začepile sitne otvore na krvnim sudovima koji su isečeni ili oštećeni.

Međutim, trombociti takođe mogu da stvore krvne ugruške u obolelim krvnim sudovima srca i mozga. To može da bude veoma opasno iz sledećih razloga:

- ugrušak može da zaustavi dotok krvi u potpunosti – to može da izazove srčani udar (infarkt miokarda) ili moždani udar, ili
- ugrušak može delimično da blokira krvne sudove koji vode ka srcu, a to smanjuje protok krvi do srca i može da izazove bol u grudima koji se vraća s vremena na vreme (što se naziva „nestabilna angina”).

Lek Ticagrex pomaže da se spreči nakupljanje trombocita. Time se smanjuje verovatnoća za formiranje krvnog ugruška koji može da smanji protok krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ticagrex

Lek Ticagrex ne smete uzimati ukoliko:

- ste alergični (preosetljivi) na tikagrelor ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);
- trenutno imate krvarenje;
- ste imali moždani udar izazvan krvarenjem u mozgu;
- imate teško oboljenje jetre;
- uzimate bilo koji od navedenih lekova u nastavku:
 - ketokonazol (lek koji se propisuje za lečenje gljivičnih infekcija),
 - klaritromicin (lek koji se propisuje za lečenje bakterijskih infekcija),
 - nefazodon (antidepresiv),
 - ritonavir i atazanavir (lekovi koji se propisuju za lečenje HIV infekcije i AIDS-a (SIDA)).

Nemojte uzimati lek Ticagrex ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Ticagrex ukoliko:

- imate povećani rizik od krvarenja zbog:
 - nedavne teške povrede,
 - nedavne hirurške intervencije (uključujući i stomatološke, obavestite svog stomatologa pre intervencije da ste na terapiji ovim lekom),

- toga što imate neko stanje koje utiče na zgrušavanje krvi,
- nedavnog krvarenja iz želuca ili creva (kao što su čir na želucu ili polipi na debelom crevu),
- treba da se podvrgnete hirurškom zahvatu (uključujući i stomatološki) u bilo koje vreme dok ste na terapiji lekom Ticagrex. Ovo je potrebno zbog povećanog rizika od krvarenja. Vaš lekar će možda proceniti da je potrebno da prekinete sa uzimanjem ovog leka 5 dana pre hirurške intervencije,
- je brzina otkucaja Vašeg srca neuobičajeno mala (obično manja od 60 otkucaja u minuti), a nemate ugrađen uređaj za stimulaciju ritma Vašeg srca (pejsmejker),
- imate astmu ili drugi problem sa plućima ili poteškoće sa disanjem,
- se kod Vas javi bilo koji oblik nepravilnog disanja kao što je ubrzano disanje, usporeno disanje ili kratke pauze u disanju. Vaš lekar će odlučiti da li Vam je potrebno dodatno ispitivanje,
- ste ikada imali probleme sa jetrom ili ste prethodno imali neko oboljenje koje je moglo da utiče na jetru,
- ste radili analizu krvi koja je pokazala da su koncentracije mokraćne kiseline veće od uobičajenih vrednosti.

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.

Upotreba leka Ticagrex istovremeno sa heparinom:

- ukoliko Vaš lekar posumnja na redak poremećaj trombocita uzrokovan heparinom, možda će mu trebati uzorak Vaše krvi za dijagnostičke testove. Važno je da obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Ticagrex sa heparinom, jer lek Ticagrex može uticati na rezultate dijagnostičkog testa.

Deca i adolescenti

Lek Ticagrex se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lekovi i lek Ticagrex

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. To je potrebno zato što lek Ticagrex može da utiče na način na koji neki lekovi deluju ili neki lekovi mogu da utiču na lek Ticagrex.

Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

- rosuvastatin (lek koji se propisuje za lečenje povećanih vrednosti holesterola),
- više od 40 mg dnevno simvastatina ili lovastatina (lekovi koji se propisuju za lečenje povećanih vrednosti holesterola),
- rifampicin (antibiotik),
- fenitoin, karbamazepin i fenobarbital (lekovi koji se propisuju za kontrolu epileptičnih napada),
- digoksin (lek koji se propisuje za lečenje srčane insuficijencije),
- ciklosporin (lek koji se propisuje kod transplantacije organa a ima funkciju da smanji imunski odgovor kod odbacivanja organa),
- hinidin i diltiazem (lekovi koji se propisuju za lečenje poremećaja srčanog ritma),
- beta-blokatori i verapamil (lekovi koji se propisuju za lečenje visokog krvnog pritiska),
- morfin i drugi opiodi (lekovi koji se propisuju za lečenje jakog bola).

Posebno recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od sledećih lekova koji povećavaju rizik od krvarenja:

- „oralni antikoagulansi” često se nazivaju i „lekovi protiv zgrušavanja krvi” u koje spada i varfarin,
- nesteroidni antiinflamatorni lekovi (skraćeno NSAIL) koji se često uzimaju kao lekovi protiv bolova, kao što su ibuprofen i naproksen,
- selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (skraćeno SSRI) koji se uzimaju kao antidepresivi kao što su paroksetin, sertralin i citalopram,

- drugi lekovi kao što su ketokonazol (lekovi koji se propisuju za lečenje gljivičnih infekcija), klaritromicin (propisuje se za lečenje bakterijskih infekcija), nefazodon (antidepresiv), ritonavir i atazanavir (propisuje se za lečenje HIV infekcije i AIDS-a (SIDA)), cisaprid (lek koji se propisuje za lečenje gorušice), ergot alkaloidi (lekovi koji se propisuju za lečenje migrene i glavobolje).

Takođe recite svom lekaru da uzimate lek Ticagrex, jer možete biti izloženi većem riziku od krvarenja ukoliko Vam lekar propiše fibrinolitike, koji se često nazivaju lekovima „koji rastvaraju krvni ugrušak“, kao što su streptokinaza ili alteplaza.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upotreba leka Ticagrex se ne preporučuje ukoliko ste trudni ili ukoliko biste mogli da zatrudnite. Tokom terapije ovim lekom žene treba da koriste odgovarajuće metode kontracepcije kako bi izbegle trudnoću.

Konsultujte se sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Ticagrex ukoliko dojite. Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o koristima i rizicima uzimanja leka Ticagrex tokom ovog perioda.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije verovatno da lek Ticagrex utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Ukoliko osećate vrtoglavicu ili zbunjenost dok uzimate ovaj lek, budite oprezni tokom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

3. Kako se uzima lek Ticagrex

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Koliko leka treba uzeti

- Uobičajena početna doza je dve tablete u isto vreme (udarna doza od 180 mg). Ovu dozu ćete obično dobiti u bolnici.
- Posle ove početne doze, uobičajena doza je jedna tableta od 90 mg dva puta na dan, tokom 12 meseci, osim ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže drugačije.
- Ovaj lek uzimajte otprilike u isto vreme svakoga dana (npr. jednu tabletu ujutru i jednu tabletu uveče).

Uzimanje leka Ticagrex sa drugim lekovima koji sprečavaju zgrušavanje krvi

Vaš lekar će Vam takođe obično reći da uzimate i acetilsalicilnu kiselinu. To je supstanca koja je prisutna u mnogim lekovima koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi. Vaš lekar će Vam reći koliko ovog leka treba da uzimate (obično između 75-150 mg na dan).

Kako treba uzimati lek Ticagrex

Tabletu možete da uzmete sa hranom ili bez nje.

Ukoliko ne možete da progutate tablete možete ih smrviti i pomešati sa vodom na sledeći način:

- Smrvite tabletu (tablete) do finog praška.
- Sipajte prašak u pola čaše vode.
- Promešajte i popijte odmah.
- Kako biste bili sigurni da nema zaostalog leka, isperite praznu čašu sa još pola čaše vode i popijte.

Ako ste uzeli više leka Ticagrex nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ticagrex nego što Vam lekar propisao, posavetujte se sa lekarom ili odmah idite u bolnicu. Pakovanje leka ponesite sa sobom. Možete biti izloženi povećanom riziku od krvarenja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Ticagrex

- Ukoliko ste zaboravili da uzmete neku dozu, samo uzmite svoju narednu dozu u uobičajeno vreme.
- Nemojte uzimati dvostruku dozu (dve doze u isto vreme) da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ticagrex

Nemojte prekidati uzimanje leka Ticagrex bez prethodnog razgovora sa Vašim lekarom. Ovaj lek uzimate redovno i onoliko dugo koliko Vam ga Vaš lekar propisuje. Ukoliko prestanete da uzimate lek Ticagrex to može da poveća verovatnoću javljanja još jednog srčanog ili moždanog udara ili smrti usled bolesti koje su u vezi sa Vašim srcem ili krvnim sudovima.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Lek Ticagrex utiče na zgrušavanje krvi, zbog toga je većina neželjenih događaja povezana sa krvarenjem. Do krvarenja može doći u bilo kom delu tela. Neka krvarenja su česta (poput stvaranja modrica ili krvarenja iz nosa). Teško krvarenje je povremeno, ali može biti opasno po život.

Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite bilo šta od navedenog – možda Vam je potrebno hitno

medicinsko lečenje:

- **Krvarenje u mozgu ili unutar lobanje je povremeno neželjeno dejstvo, a može da uzrokuje znake moždanog udara kao što su:**
 - iznenadna utrnulost ili slabost ruke, noge ili lica, posebno ukoliko je samo sa jedne strane tela,
 - iznenadna zbunjenost (stanje konfuzije), otežan govor ili razumevanje drugih,
 - iznenadno otežan hod ili gubitak ravnoteže ili koordinacije,
 - iznenadna vrtoglavica ili teška glavobolja nepoznatog uzroka.
- **Znaci krvarenja kao što su:**
 - teško krvarenje ili krvarenje koje ne možete kontrolisati,
 - neočekivano ili dugotrajno krvarenje,
 - promena boje urina u roze, crvenu ili smeđu boju,
 - povraćanje crvene krvi ili sadržaj koji ste povratili izgleda kao „talog mlevene kafe”,
 - crvena ili crna stolica (izgleda kao katran),
 - iskašljavanje ili povraćanje krvnih ugrušaka.
- **Nesvestica (sinkopa)**
 - privremeni kratkotrajni gubitak svesti zbog iznenadnog smanjenja dotoka krvi u mozak (često).
- **Znaci problema zgrušavanja krvi zvani „Trombotična trombocitopenijska purpura“ kao što su:**

- Groznica-povišena telesna temperatura ili purpurne tačke (zване „purpura”) na koži ili u ustima, sa ili bez žute prebojenosti kože, sluzokože ili beonjača očiju (žutica), stanje neobjašnjivog teškog umora ili zbunjenosti (stanje konfuzije).

Porazgovarajte sa svojim lekarom ukoliko primetite bilo šta od sledećeg:

- **Osećaj kratkog daha—ovo je veoma često neželjeno dejstvo.** Razlog tome može da bude posledica bolesti srca ili drugih uzroka ili može da predstavlja neželjeno dejstvo leka Ticagrex. Nedostatak daha povezan sa uzimanjem leka Ticagrex je generalno blag i karakteriše se kao iznenadna glad za vazduhom koja se obično javlja u mirovanju i može se javiti u prvim nedeljama lečenja i kod mnogih može spontano nestati. Ukoliko primetite da se Vaš kratak dah pogoršava ili traje duže vreme, recite to svom lekaru. Vaš lekar će odlučiti da li Vam je potrebna terapija ili dodatni pregledi.

Druga moguća neželjena dejstva

Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

- velika koncentracija mokraćne kiseline u Vašoj krvi (dijagnostikuje se laboratorijskim analizama krvi),
- krvarenje uzrokovano poremećajima krvi.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

- modrice,
- glavobolja,
- osećaj vrtoglavice ili osećaj da se soba okreće,
- proliv ili otežano varenje,
- mučnina,
- otežano pražnjenje creva (konstipacija),
- osip,
- svrab,
- jak bol i oticanje zglobova – ovo su znaci gihta,
- osećaj vrtoglavice ili ošamućenosti ili zamagljen vid – ovo su znaci niskog krvnog pritiska,
- krvarenje iz nosa,
- krvarenje nakon hirurške intervencije ili usled posekotina (na primer tokom brijanja) i u slučaju rana kada su krvarenja veća u odnosu na očekivana,
- krvarenje iz sluzokože želuca (čira),
- krvarenje desni.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

- alergijske reakcije – osip, svrab, otok lica ili otok usana/jezika mogu biti znaci alergijske reakcije,
- zbunjenost (stanje konfuzije),
- smetnje vida uzrokovane prisustvom krvi u Vašem oku,
- vaginalno krvarenje koje je obilnije ili se događa izvan normalnog menstrualnog ciklusa,
- krvarenje u zglobovima i mišićima koje uzrokuje bolno oticanje,
- krv u uhu,
- unutrašnje krvarenje, koje može uzrokovati vrtoglavicu ili ošamućenost.

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

- neuobičajeno usporen puls (broj otkucaja obično ispod 60 otkucaja u minutu).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Ticagrex

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Ticagrex posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon („Važi do: ”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Ticagrex

- Aktivna supstanca je tikagrelor.
Jedna film tableta sadrži 90 mg tikagrelora.
- Pomoćne supstance su:
Jezgro tablete: manitol, kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat, hidroksipropilceluloza, karmeloza-kalcijum, magnezijum-stearat.
Film (obloga) tablete: Opadry® Yellow 03F82964: hipromeloza (E464), titan-dioksid (E171), talk (E553b), gvožđe (III)-oksid, žuti (E172), makrogol 8000 (E1521).

Kako izgleda lek Ticagrex i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne, žute filmom obložene tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC//Al blister sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 60 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM A.D. VRŠAC,
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) izdavanje.

Broj i datum dozvole:

001968567 2025 od 10.03.2026.