

UPUTSTVO ZA LEK

Vinceva[®], 10 mg, tablete

vinpocetin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva
3. Kako se uzima lek Vinceva
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Vinceva
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen

Lek Vinceva sadrži aktivnu supstancu vinpocetin.

Lek Vinceva se koristi za terapiju psihičkih ili neuroloških simptoma izazvanih poremećajem moždane cirkulacije.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva

Lek Vinceva ne smete uzimati:

- Ukoliko ste alergični na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, navedenih u odeljku 6.
- Ukoliko ste trudni ili dojite.
- Ako ste imali skoro krvarenje u mozgu, ili patite od povećanog krvnog pritiska u mozgu.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Vinceva.

Obavezno obavestite Vašeg lekara o bilo kojim drugim stanjima koja imate (posebno ako imate problem sa srcem, ukoliko znate da imate promene na elektrokardiogramu (EKG), kao što je produženi QT interval.

Ako se pojavi osip na koži, svrab, otežano disanje, otečeno lice, odmah se obratite lekaru jer ste osetljivi na lek.

Deca i adolescenti

Lek Vinceva ne treba primenjivati kod dece usled nedostatka bitnih kliničkih podataka.

Drugi lekovi i Vinceva

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate lek, skoro ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koji lek, uključujući i one lekove, koji se dobijaju bez recepta.

Lek Vinceva može uticati na dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak (kao što su organski nitrati), lekova za regulisanje poremećaja srčanog ritma, lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao i lekova koji utiču na centralni nervni sistem.

Lek Vinceva može pojačati dejstvo metil-dopa (leka koji snižava krvni pritisak), pa se savetuje redovna kontrola krvnog pritiska od strane lekara.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, ili dojite, mislite da bi ste mogli da budete trudni, ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru pre uzimanja leka Vinceva.

Ne uzimajte lek Vinceva u periodu trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Vinceva može uticati na upravljanje vozilima i mašinama. Lek Vinceva može da izazove vrtoglavicu ili slabost usled pada krvnog pritiska, pa se ne savetuje upravljanje motornim vozilima i mašinama dok lekar ne odobri.

Lek Vinceva sadrži laktozu

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Vinceva

Uvek uzimajte ovaj lek tačno po uputstvu Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.

Ukoliko Vaš lekar ne propiše drugačije, uobičajena dnevna doza je 3 puta dnevno po 1 tabletu leka Vinceva (30 mg dnevna doza).

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih osoba, kao ni kod pacijenata sa oboljenjima bubrega ili jetre.

Deca i adolescenti

Lek Vinceva se ne koristi kod dece i adolescenata mladih od 18 godina.

Za oralnu upotrebu. Tablete uzimati posle jela.

Ako ste uzeli više leka Vinceva nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vinceva nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili se javite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Vinceva

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite Vašu sledeću dozu u uobičajeno vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Vinceva

Ne prestajte sa uzimanjem leka Vinceva bez konsultacije sa lekarom, čak i kada se bolje osećate.

Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe leka, konsultujte Vašeg lekara.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): glavobolja, vrtoglavica, sniženje krvnog pritiska, suva usta, mučnina, nelagodnost u stomaku, povišenje vrednosti holesterola u krvi.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjenje broja belih krvnih zrnaca i krvnih pločica, smanjenje apetita, anoreksija, šećerna bolest, poremećaj sna, nemir, uznemirenost, pospanost, vrtoglavica, poremećaj čula mirisa i/ili ukusa, mentalna i fizička otupelost (stupor), smanjena funkcija mišića jedne polovine tela, gubitak pamćenja, otok optičkog diska (papiloedem), poremećaj sluha, zujanje u ušima (tinitus), infarkt miokarda, bol i stezanje u predelu srca (angina pectoris), ubrzan ili usporen srčani rad (puls), osećaj jakog lupanja srca, poremećaj srčanog ritma, povišen krvni pritisak, naleti crvenila, zapaljenje vena uzrokovano ugruškom (tromboflebitis), bol u trbuhu, otežano pražnjenje creva, proliv, povraćanje, crvenilo kože, povećano znojenje, svrab, koprivnjača, osip, hronična iscrpljenost, osećaj vrućine, promene u enzimima jetre, povišenje triglicerida (masti) u krvi, promene na EKG-u, smanjen/povećan broj eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca).

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): anemija, preosetljivost, euforija, depresija, drhtavica, grčevi, crvenilo vežnjače, poremećaj rada srca, poremećaj srčanog ritma poreklom iz pretkomora, iznenadne promene u vrednostima krvnog pritiska, otežano gutanje, zapaljenje sluznice usta (stomatitis), zapaljenje kože (dermatitis), nelagodnost u grudima, sniženje temperature, aglutinacija crvenih krvnih zrnaca, povećanje/sniženje broja belih krvnih zrnaca,

sniženje broja crvenih krvnih zrnaca, sniženje broja određenog tipa belih krvnih zrnaca (granulocita), skraćeno trombinskog vremena, povećanje telesne mase.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Vinceva

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Čuvajte na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Ne upotrebljavajte ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Vinceva

Aktivna supstanca je vinpocetin. Jedna tableta sadrži 10 mg vinpocetina.

Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, povidon, krospovidon, magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Vinceva i sadržaj pakovanja

Bele do skoro bele tablete, cilindričnog oblika, sa utisnutom oznakom "I" na obe strane, bez mirisa.

Unutrašnje pakovanje je PVC/aluminijumski blister sa 30 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 1 blister (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: RHEI LIFE DOO, Beogradskog Bataljona 4, Beograd-Čukarica

Proizvođač: UŽDAROJI AKCINE BENDROVE

ACONITUM, Litvanija, Biruliškiu k.,

Kauno r. sav., Inovaciju g. 4

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept za višekratno (obnovljivo) izdavanje

Broj i datum dozvole:

002006865 2025 od 18.03.2026.