

UPUTSTVO ZA LEK

Acenokumarol UNION, 4 mg, tablete
acenokumarol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek Acenokumarol UNION i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Acenokumarol UNION
3. Kako se uzima lek Acenokumarol UNION
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Acenokumarol UNION
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Acenokumarol UNION i čemu je namenjen

Lek Acenokumarol UNION sadrži aktivnu supstancu acenokumarol i pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulansi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi).

Lek Acenokumarol UNION se koristi za lečenje i prevenciju bolesti izazvanih stvaranjem krvnih ugrušaka u krvnim sudovima (kao što je npr. tromboza dubokih vena).

Lek Acenokumarol UNION ne rastvara ugruške krvi koji su se već oformili već sprečava njihovo povećanje, što bi uzrokovalo ozbiljnije probleme.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Acenokumarol UNION

Pažljivo pratite savet Vašeg lekara, jer se može razlikovati od opštih informacija koje sadrži ovo Uputstvo za lek.

Lek Acenokumarol UNION ne smete uzimati:

- Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na acenokumarol, na neki drugi lek koji ste uzeli u cilju sprečavanja zgrušavanja krvi ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)
- Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite (videti odeljak “Trudnoća, dojenje i plodnost”)
- Ukoliko ste alkoholičar
- Ukoliko imate neku mentalnu bolest, na primer šizofreniju ili demenciju
- Ukoliko ste nedavno bili podvrgnuti ili ćete uskoro biti podvrgnuti operaciji na kičmi, mozgu, očima ili bilo kojoj drugoj većoj operaciji
- Ukoliko ste imali moždani udar usled izliva krvi u mozak
- Ukoliko bolujete od izrazito visokog krvnog pritiska
- Ukoliko imate čir na želucu, ili bilo koje krvarenje u crevima
- Ukoliko imate krv u mokraći ili iskašljavate krv
- Ukoliko imate bilo koji poremećaj krvarenja, probleme sa krvarenjem ili neuobičajenu pojavu modrica
- Ukoliko osetite oštar bol u središnjem delu ili na levoj strani grudnog koša koji može biti praćen kratkim dahom (ovo mogu biti znaci nakupljanja tečnosti ili zapaljenja oko srca koji se naziva perikarditis) ili ako imate simptome slične gripu, šumove u srcu, osip i bol u grudima (ovo mogu biti znaci infekcije unutrašnjeg sloja srca tzv. endokarditis)
- Ukoliko imate **teško** oboljenje jetre ili bubrega

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na vas ili u nešto niste sigurni, pre primene leka Acenokumarol UNION, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Acenokumarol UNION ukoliko:

- bolujete od kancera (raka)
- imate infekciju ili zapaljenje (praćeno oticanjem)
- imate poremećaj koji utiče na resorpciju hrane iz želuca i/ili creva
- imate srčanu slabost (koja uzrokuje oticanje i otežano disanje) – ovo može smanjiti protok krvi u jetri što bi zauzvrat smanjilo zgrušavanje krvi
- imate probleme sa jetrom – ovo može smanjiti zgrušavanje krvi
- imate probleme sa bubrezima – to može dovesti do nagomilavanja proizvoda razgradnje leka Acenokumarol UNION
- imate pojačan rad (hiperaktivnost) štitaste žlezde
- ste starije životne dobi
- imate oboljenje krvi, kao što je nedostatak proteina C ili proteina S – usled čega krvarite duže nego uobičajeno, nakon posekotine ili povrede

- imate veći rizik od krvarenja, na primer ako imate:
 - istoriju promenljivih rezultata testova krvi za internacionalni normalizovani odnos (INR)
 - čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili ste ga nekada imali
 - visok krvni pritisak
 - problemi sa cirkulacijom krvi u mozgu (cerebrovaskularna bolest)
 - anemija
 - nedavna rana ili povreda
 - ako ste uzimali neki od dole navedenih lekova ili ste uzimali lek Acenokumarol UNION tokom dugog vremenskog perioda

U toku terapije lekom Acenokumarol UNION **ne sme** se primenjivati injekcija u mišić.

Ukoliko je potrebno da primite injekciju u kičmu, ili kao deo ispitivanja skenerom ili rendgenom, ili je potrebno da budete podvrgnuti manjoj hirurškoj intervenciji, uključujući i operaciju zuba, obavezno se prethodno posavetujte oko lečenja sa Vašim lekarom.

Ukoliko doživite nezgodu u toku upotrebe leka Acenokumarol UNION, postoji mogućnost da ćete krvariti duže nego uobičajeno. Lekar ili osoblje bolnice odmah moraju biti obavešteni da uzimate lek Acenokumarol UNION.

Kalcifilaksa, stanje u kojem se kalcijum nakuplja u krvnim sudovima kože, ponekad se dešava kada pacijenti uzimaju lekove za razređivanje krvi, uključujući lek Acenokumarol UNION. Ovo je retko, ali izaziva bolne kvržice na koži ili čireve koji mogu dovesti do ozbiljne infekcije i smrti. To se obično dešava samo ako osoba ima tešku bolest bubrega, ili ako već ima poremećaj u nivoima kalcijuma, albumina, fosfata ili određenih proteina u krvi.

Stariji pacijenti

Pacijenti starosti 65 godina i više mogu biti osetljiviji na dejstvo ovog leka i potrebno je češće kontrolisati ove pacijente. Takođe može biti neophodno smanjenje doza.

Deca i adolescenti

Iskustvo primene ovog leka kod dece i adolescenata je ograničeno i potrebno je češće kontrolisati ove pacijente (videti odeljak 3).

U toku terapije lekom Acenokumarol UNION izbegavajte konzumiranje soka od brusnice ili preparata na bazi brusnice (videti odeljak „Uzimanje leka Acenokumarol UNION sa hranom, pićima i alkoholom”).

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na vas ili u nešto niste sigurni, pre upotrebe leka Acenokumarol UNION, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Drugi lekovi i lek Acenokumarol UNION

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta. Ovo posebno uključuje sledeće lekove navedene u nastavku teksta, koji mogu uticati na dejstvo leka Acenokumarol UNION.

Lekovi koji povećavaju dejstvo leka Acenokumarol UNION:

- Heparin (uključujući sintetički oblik pod nazivom heparin male molekulske mase) – sprečava zgrušavanje krvi u terapiji duboke venske tromboze, krvnih ugrušaka ili nakon operacije.
- Antibiotici (npr. klindamicin)
- Salicilna kiselina i njeni derivati (npr. acetilsalicilna kiselina, aminosalicilna kiselina, diflunisal) (lekovi koji se upotrebljavaju u terapiji bola).
- Lekovi koji zaustavljaju agregaciju trombocita – krvnih pločica (koje su uključene u proces zgrušavanja krvi) (npr. dipiridamol, klopidogrel, tiklopidin)
- Fenilbutazon ili drugi derivati pirazolona (npr. sulfipirazon), drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi (koriste se za smanjenje bola, povišene telesne temperature i zapaljenja), uključujući one koji

ciljaju na specifičan molekul koji se zove COX-2, npr. celekoksib, metilprednizolon (ponekad se ubrizgava u venu u velikoj dozi za lečenje raznih inflamatornih ili alergijskih stanja).

Kada se lek Acenokumarol UNION, propisuje u kombinaciji sa ovim lekovima, potreban je učestaliji nadzor pacijenta, uključujući i redovne laboratorijske analize krvi.

Ostali lekovi koji mogu da povećaju aktivnost leka Acenokumarol UNION:

- alopurinol ili sulfinpirazon – za lečenje gihta i smanjenje vrednosti mokraćne kiseline
- anabolički steroidi – koriste se kao supstituciona terapija
- androgeni kao što je testosteron i mesterolon - koriste se kao supstituciona terapija
- antiaritmici kao što su amjodaron i hinidin - lekovi u terapiji nepravilnog rada srca
- antibiotici (npr. eritromicin, klaritromicin, tetraciklini, neomicin, hloramfenikol, amoksicilin, amoksicilin + klavulanska kiselina, neki cefalosporini, neki fluorohinoloni kao što su ciprofloksacin, norfloksacin, ofloksacin) – lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija
- viloksazin i selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina kao što su citalopram, fluoksetin, sertralin i paroksetin – koriste se u terapiji anksioznosti i depresije
- paracetamol – lek u terapiji bola
- sulfonamidi kao što je kotrimoksazol – u lečenju infekcija
- derivati sulfoniluree kao što su tolbutamid, hlorpropamid i glibenklamid – lekovi u terapiji šećerne bolesti
- tiroidni hormoni kao što je levotiroksin ili dekstro-tiroksin – u terapiji smanjene aktivnosti štitaste žlezde
- statini kao što su simvastatin, atorvastatin i fluvastatin – koriste se za snižavanje nivoa holesterola u krvi
- antineoplastici kao što je 5-fluorouracil – u terapiji raka dojke, organa za varenje i kože
- H₂ antagonisti kao što su cimetidin ili ranitidin – koriste se u lečenju čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu
- klofibrat i slični lekovi (npr. fenofibrat, gemfibrozil) – koriste se za snižavanje visokog nivoa holesterola

- disulfiram – u lečenju zavisnosti od alkohola (alkoholizam)
- etakrinska kiselina – protiv zadržavanja tečnosti u organizmu ili visokog krvnog pritiska
- glukagon – u lečenju niskog nivoa šećera u krvi
- derivati imidazola (npr. metronidazol, i čak i kada se primenjuje lokalno kao što su ekonazol, mikonazol, ketokonazol i flukonazol) – lekovi koji se koriste protiv infekcija
- tramadol – snažan analgetik (lek protiv bolova)
- tamoksifen – u terapiji raka dojke i neplodnosti
- inhibitori protonske pumpe (npr. omeprazol) – koriste se u lečenju refluksa kiseline, čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu
- aktivatori plazminogena (npr. urokinaza, streptokinaza i alteplaza), inhibitori trombina (npr. argatroben) - lekovi koji se koriste za razgrađivanje krvnih ugrušaka kod srčanog udara
- prokinetici (npr. cisaprid) – kod otežanog varenja
- antacidi (npr. magnezijum-hidroksid) – lekovi koji se koriste za neutralizaciju viška hlorovodonične kiseline u želucu
- glukozamin – u terapiji osteoartritisa.

Lekovi koji mogu da umanje dejstvo leka Acenokumarol UNION:

- aminoglutetimid – koristi se u terapiji kancera ili Kušingovog sindroma
- merkaptopurin – koristi se u terapiji kancera ili autoimunskih bolesti (vrsta bolesti kod koje imunski sistem napada sopstvene ćelije)
- inhibitori proteaze kao što su ritonavir ili nelfinavir – koriste se u lečenju HIV infekcije
- azatioprin – kod transplantacije organa, hroničnih inflamatornih i autoimunskih bolesti
- barbiturati (kao što je natrijum-amital i fenobarbital) i karbamazepin – lekovi za lečenje epilepsije ili protiv nesаницe

- vitamin E
- lekovi koji povećavaju aktivnost nekih enzima jetre (CYP2C9, CYP2C19 ili CYP3A4) - posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni da li neki od vaših lekova ima ovakvo dejstvo
- oralni kontraceptivi (sadrže kombinaciju etinilestradiola i npr. levonorgestrela, gestodena ili norgestimata) – za sprečavanje začeća
- rifampicin – lek koji se koristi u terapiji infekcije
- tiazidni diuretici (npr. bendroflumetiazid ili metolazon) – lekovi protiv zadržavanja tečnosti u organizmu i visokog krvnog pritiska
- kortikosteroidi kao što je prednizolon – lekovi za lečenje zapaljenskih bolesti creva, artritisa i nekih kožnih stanja
- kantarion – za lečenje depresije
- holestiramin – lek koji se koristi za snižavanje visokog nivoa holesterola
- grizeofulvin – za lečenje gljivičnih infekcija
- antineoplastici (npr. azatioprin, 6-merkaptopurin)
- vitamin K (povećanje unosa vitamina K može da smanji dejstvo acenokumarola)
- semaglutid (lek koji se koristi za snižavanje nivoa šećera u krvi).

Lekovi koji mogu da povećaju ili umanje dejstvo leka Acenokumarol UNION:

- inhibitori proteaze (npr. indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir) – koriste se u lečenju HIV infekcijemetilprednizolon, kortikosteroid koji se koristi u lečenju različitih zapaljenskih stanja.

Uticao leka Acenokumarol UNION na druge lekove:

- lek Acenokumarol UNION može povećati rizik od nastanka toksičnosti hidantoinskih derivata kao što je fenitoin – lek koji se koristi u lečenju epilepsije
- lek Acenokumarol UNION može pojačati hipoglikemijsko dejstvo antidijabetika kao što su glibenklamid ili glimepirid.

Uzimanje leka Acenokumarol UNION sa hranom, pićima i alkoholom

Zbog mogućeg uticaja alkohola na dejstvo leka Acenokumarol UNION budite oprezni i pre konzumiranja alkoholnih pića konsultujte se sa Vašim lekarom.

Izbegavajte konzumiranje soka od brusnice ili bilo kojih drugih proizvoda od brusnice, kao što su kapsule ili koncentri jer mogu izazvati utisak da ne dobijate odgovarajuću količinu acenokumarola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lek Acenokumarol UNION ne smete uzimati u periodu trudnoće. Lek Acenokumarol UNION, kao i drugi antikoagulansi, može ozbiljno naškoditi Vašem detetu. Obavestite svog lekara ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. Vaš lekar ukazaće Vam na moguće rizike primene leka Acenokumarol UNION u periodu trudnoće.

Odluku da dojdite prilikom primene leka Acenokumarol UNION pažljivo razmotrite sa svojim lekarom. Vama i Vašem detetu biće neophodne laboratorijske analize krvi ukoliko dojdite u toku primene ovog leka. Kao preventivu, Vaš lekar bi trebalo da propiše vitamin K Vašem detetu kako bi se sprečilo razređivanje krvi kod deteta.

Nema dostupnih podataka o uticaju leka Acenokumarol UNION na Vašu plodnost.

Ukoliko ste u reproduktivnom periodu, Vaš lekar će zatražiti da uradite test trudnoće kako bi se potvrdilo odsustvo trudnoće pre primene leka Acenokumarol UNION. Takođe se od Vas može zahtevati da koristite kontraceptivne mere prilikom primene leka Acenokumarol UNION.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Acenokumarol UNION nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Acenokumarol UNION sadrži laktozu, monohidrat

Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete ovaj lek..

3. Kako se uzima lek Acenokumarol UNION

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Acenokumarol UNION treba uzimati u pojedinačnoj dozi svakog dana u isto vreme. Tablete progutajte sa dovoljno vode.

Vaš lekar će zatražiti redovne analize krvi u toku lečenja, da bi proverio koliko se brzo vaša krv zgrušava. Na osnovu toga, lekar će Vam odrediti odgovarajuću dozu leka.

Doza leka Acenokumarol UNION razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i od dana do dana.

Sledeće informacije mogu poslužiti kao vodič za doziranje:

Odrasli i stariji pacijenti:

Uobičajena početna doza je između 2 mg/dan i 4 mg/dan, bez primene udarne doze. Lečenje se takođe može započeti udarnom dozom, od obično 6 mg prvog dana, a zatim se terapija nastavlja sa dozom od 4 mg drugog dana.

Starijim pacijentima, pacijentima sa oboljenjem jetre ili teškom srčanom slabošću ili pothranjenim pacijentima može biti potrebno smanjenje doze.

Primena kod dece i adolescenata:

Iskustvo primene oralnih antikoagulanasa, uključujući lek Acenokumarol UNION, kod dece i adolescenata je ograničeno. Preporučuje se češće testiranje krvi da bi se proverilo kako lek deluje.

Uvek obavestite Vašeg lekara, stomatologa ili farmaceuta da koristite lek Acenokumarol UNION.

Napomena: Acenokumarol UNION tableta se može deliti na pola i na četvrtine.

Ako ste uzeli više leka Acenokumarol UNION nego što treba

Ukoliko slučajno uzmete više tableta ili neko drugi uzme Vaš lek, odmah obavestite svog lekara ili pozovite najbližu ambulantu ili urgentni centar. Simptomi predoziranja se razlikuju od pacijenta do pacijenta. Mogu se javiti u roku od 1 do 5 dana nakon uzimanja leka i uključuju: krvarenje iz nosa, krvarenje desni, povraćanje ili iskašljavanje krvi, krv u urinu, krvava ili crna katranasta stolica, genitalno krvarenje, obilno menstrualno krvarenje, velike modrice ili krvarenje u zglobovima koje izaziva zatezanje, oticanje i bol. Može doći do ubrzanja Vaših otkucaja srca, do pada krvnog pritiska zbog čega ćete osećati vrtoglavicu, i vaša koža može izgledati bleđa, hladna i znojava. Možete osetiti mučninu, povraćanje, dijareju i bolove u stomaku.

Možda će biti neophodno uraditi laboratorijske analize krvi u cilju praćenja Vašeg stanja i možda će biti neophodno odgovarajuće lečenje. Ponesite kutiju leka kako bi pokazali lekaru koji ste lek uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Acenokumarol UNION

Ne brinite. Ukoliko zaboravite da uzmete dozu leka, uzmete propuštenu dozu čim se setite, osim ako je vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu leka. Zatim nastavite prema uobičajenom rasporedu doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Acenokumarol UNION

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

U slučaju pojave nekog od sledećih neželjenih dejstava, obratite se svom lekaru:

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- krvarenje:
 - krvarenje desni, neobjašnjiva pojava modrica i krvarenje iz nosa, obilne menstruacije, obilno krvarenje posekotina i rana
 - unutrašnje krvarenje iz raznih organa: želudac, creva, žučna kesa (bol u stomaku, povraćanje krvi, krvava ili crna katranasta stolica), urinarni trakt (bol u leđima, krv u urinu), mozak (vrtoglavica, jaka glavobolja, slabost u ruci ili nozi, zamagljen vid), i oči (vidljiva lokva krvi)

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- alergijske reakcije u obliku kožnog osipa, zapaljenja, svraba, koprivnjače i pojave povišene telesne temperature
- gubitak apetita
- mučnina ili povraćanje
- neuobičajeno opadanje kose.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis) može biti praćeno pojavom modrica ili krvarenja ispod kože
- nekroza kože (odumiranje tkiva) sa stvaranjem plikova na koži sa ili bez ožiljaka, obično u predelu butina, zadnjice ili grudi. Ovo stanje je obično povezano sa urođenim nedostatkom nekih proteina u krvi
- oštećenje jetre može biti praćeno pojavom žutice, bola u stomaku, otokom i umorom.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- Bolni osip na koži. Lek Acenokumarol UNION može izazvati retko, ali ozbiljno stanje kože koje se naziva kalcifilaksa koja može početi sa bolnim osipom po koži ali može dovesti i do drugih ozbiljnih komplikacija. Ova neželjena reakcija se češće pojavljuje kod pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega ili imaju poremećaj u nivoima kalcijuma, albumina, fosfata ili određenih proteina u krvi. Smanjen broj crvenih krvnih ćelija ili smanjena vrednost hemoglobina (anemija).
- Krvarenje u bubrezima, ponekad uz prisustvo krvi u urinu, što može dovesti do oštećenja funkcije bubrega (nefropatija povezana sa antikoagulansima).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Acenokumarol UNION

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Acenokumarol UNION posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon "Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Acenokumarol UNION

- Aktivna supstanca leka je acenokumarol.
Jedna tableta sadrži 4 mg acenokumarola.
- Pomoćne supstance su celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; kopovidon; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Acenokumarol UNION i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne tablete, bele boje, sa pod pravim uglom ukrštenim podeonim linijama sa jedne strane tablete. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

UNION–MEDIC D.O.O. NOVI SAD,
Arhimandrita Jovana Rajića 2, Novi Sad, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2025.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

003421419 2024 od 22.08.2025.