

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin[®] plus C forte, 800 mg/480 mg, šumeće tablete
acetilsalicilna kiselina/askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana u slučaju povišene telesne temperature ili 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Aspirin plus C forte i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte
3. Kako se uzima lek Aspirin plus C forte
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Aspirin plus C forte
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin plus C forte i čemu je namenjen

Lek Aspirin plus C forte sadrži:

- acetilsalicilnu kiselinu, koja smanjuje bol i snižava povišenu telesnu temperaturu;
- askorbinsku kiselinu, poznatu kao vitamin C.

Lek Aspirin plus C forte se koristi:

- za ublažavanje simptoma blagog do umerenog bola, kao što su glavobolja, zubobolja ili menstrualni bol;
- kod obične prehlade ili stanja sličnih gripu za ublažavanje simptoma bola ili povišene telesne temperature.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte

Lek Aspirin plus C forte ne smete uzimati:

- ako ste mlađi od 16 godina;
- ako ste alergični (preosetljivi) na:
 - acetilsalicilnu kiselinu, askorbinsku kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6) ili
 - druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) (lekovi koji se koriste protiv zapaljenja, protiv bolova i koji snižavaju povišenu telesnu temperaturu);
- ako imate povećan broj mastocita (postojeća mastocitoza) (poremećaj imunskog sistema). Upotreba acetilsalicilne kiseline može izazvati ozbiljne reakcije preosetljivosti (uključujući cirkulatorni šok praćen crvenilom, niskim krvnim pritiskom, ubrzanim radom srca i povraćanjem);
- ako ste ranije imali astmu izazvanu upotrebom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova (posebno NSAIL);
- ako ste u trećem trimestru trudnoće (ako ste trudni više od 24 nedelje);
- ako imate čir na želucu/dvanaestopalačnom crevu (peptički ulkus);
- ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja (hemoragijska stanja);
- ako imate teško smanjenje funkcije jetre ili bubrega;
- ako imate teško i nekontrolisano smanjenje funkcije srca;
- ako ste lečeni lekom metotreksat u dozama od 15 mg nedeljno ili većim;
- ako uzimate lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi (oralni antikoagulansi) i ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima;
- ako imate ili ste nekad imali kamen u bubregu (nefrolitijaza);
- ako imate povećano izlučivanje oksalata urinom (hiperoksalurija);
- ako imate oboljenje u kome se u telu nakuplja previše gvožđa (hemohromatoza).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte:

- ako uzimate bilo koji drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, da biste izbegli rizik od predoziranja;
- ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze lekova protiv bolova. Ne povećavajte dozu već se obratite za savet lekaru ili farmaceutu;
- ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinaciju više različitih lekova protiv bolova. Ovo može dovesti do dugotrajnog oštećenja funkcije bubrega, sa rizikom od smanjene funkcije bubrega;
- ako ste ranije imali čir ili krvarenje u želucu ili crevima, ili zapaljenje želuca (gastritis);
- ako uzimate lekove koji razređuju krv i sprečavanju zgrušavanje krvi (antikoagulansi);
- **odmah prestanite da uzimate lek Aspirin plus C forte i obavestite svog lekara ukoliko Vam se javi krvarenje u želucu ili crevima.** Znaci krvarenja su krvarenje u ustima, krv u stolici i crna prebojenost stolice;
- ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega, ili imate problema sa srcem ili cirkulacijom kao što su bubrežna vaskularna oboljenja, srčana slabost, velike hirurške intervencije ili velika krvarenja.

Uzimanje acetilsalicilne kiseline može dodatno da smanji funkciju bubrega, sve do akutne slabosti bubrega. Ne uzimajte lek Aspirin plus C forte ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega ili nekontrolisanu funkciju srca;

- ako imate smanjenu funkciju jetre.

Ne uzimajte lek Aspirin plus C forte ukoliko imate ozbiljno oštećenje funkcije jetre;

- ako imate obilna menstrualna krvarenja (obim i trajanje menstruacije može se povećati);
- ako morate na operaciju

Acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja; čak i u malim dozama ili ako je acetilsalicilna kiselina uzeta nekoliko dana pre operacije. Obavestite Vašeg lekara, hirurga, anesteziologa, stomatologa ukoliko idete čak i na manju operaciju (npr. vađenje zuba);

- acetilsalicilna kiselina sprečava izlučivanje mokraćne kiseline. Ukoliko već imate smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, možete dobiti napad gihta (bolovi u zglobovima);
- ako imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD): (nasledno oboljenje koje zahvata crvena krvna zrnca) jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize (razaranje crvenih krvnih zrnaca). Upotreba acetilsalicilne kiseline mora biti pod medicinskim nadzorom;
- ako imate poremećaj u iskorišćavanju gvožđa (talasemija, sideroblastična anemija);
- ako imate astmu

Nemojte uzimati ovaj lek ako imate astmu izazvanu upotrebom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova (naročito NSAIL). Acetilsalicilna kiselina može da izazove grčeve bronhijalnih mišića, napad astme ili druge reakcije preosetljivosti. Faktori rizika su:

- ako ste ranije imali astmu,
- polenska kijavica,
- otok sluzokože nosa (polipi u nosu), dugotrajna (hronična) bolest disajnih puteva ili
- alergijske reakcije, kao što su reakcije kože (npr. svrab, koprivnjača);

- ne preporučuje se primena ovog leka tokom dojenja.

Prilikom uzimanja acetilsalicilne kiseline prijavljene su ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uključivati bol u grudima, pa čak i srčani udar (Kunisov sindrom) (videti odeljak 4). Kada primetite bol u grudima uz alergijske reakcije (kao što su osip na koži, otežano disanje), odmah potražite medicinsku pomoć.

Deca i adolescenti

Rejev sindrom, veoma retka bolest povezana sa neurološkim oštećenjima i oštećenjima funkcije jetre može biti sa smrtnim ishodom. Pojavljuje se kod dece i adolescenata sa znakovima virusnih infekcija (posebno gripa i ovčijih boginja), kada se koristi acetilsalicilna kiselina. Zbog toga

- se acetilsalicilna kiselina kod dece i adolescenta mlađih od 16 godina ne sme primenjivati, osim nakon procene lekara,
- ako se pojave vrtoglavica ili poremećaj svesti, neuobičajeno ponašanje ili povraćanje, prekinite lečenje i odmah obavestite lekara.

Primenu salicilata treba izbegavati i do 6 nedelja nakon vakcinacije protiv malih boginja.

Drugi lekovi i lek Aspirin plus C forte

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Ne uzimajte lek Aspirin plus C forte ako uzimate sledeće lekove:

- **metotreksat u dozama od 15 mg nedeljno ili većim:** lek koji se koristi za lečenje teških zapaljenja zglobova, karcinoma i psorijaze (kožna bolest). Povećana toksičnost metotreksata;
- **lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi** (oralni antikoagulansi) i ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima. Povećan rizik od krvarenja.

Razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

Uzimanje leka Aspirin plus C forte se ne preporučuje u kombinaciji sa:

- **lekovima koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi** (oralni antikoagulansi) i bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima.
Povećan rizik od krvarenja;
- **klopidogrelom** (osim odobrene indikacije za ovu kombinaciju) i **tiklopidinom**: lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi.
Povećan rizik od krvarenja;
- **nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL)** (lekovi koji se koriste protiv zapaljenja, protiv bolova i koji snižavaju povišenu telesnu temperaturu).
Povećan rizik od krvarenja i pojave čira na želucu ili crevima;
- **heparinom** u terapijskim dozama (npr. za sprečavanje nastanka zgrušavanja krvi) ili kod pacijenata mlađih od 65 godina, bez obzira na dozu heparina.
Povećan rizik od krvarenja. Treba uzeti drugi lek protiv bolova ili za snižavanje povišene telesne temperature;
- **benzbromaronom, probenecidom**: lekovi koji se koriste za lečenje gihta koji povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline.
Dejstvo ovih lekova je smanjeno.

Lek Aspirin plus C forte treba uzimati uz oprez u kombinaciji sa:

- **metotreksatom u dozama manjim od 15 mg nedeljno**
Povećana toksičnost metotreksata. Potrebno je pažljivo praćenje kod pacijenta sa smanjenom funkcijom bubrega, kao i kod starijih pacijenta. Videti i prethodno navedeno u delu „Drugi lekovi i lek Aspirin plus C forte“;
- **lekovima koji povećavaju izlučivanje vode (diuretici)** i lekovima koji se koriste **za lečenje visokog krvnog pritiska** i drugih **srčanih bolesti** (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori kao što je kaptopril), antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan).
Kod dehidriranih pacijenata se može javiti brz gubitak funkcije bubrega. Dodatno, može se smanjiti dejstvo snižavanja krvnog pritiska;
- **klopidogrelom (osim odobrene indikacije za ovu kombinaciju)**: lek koji se koristi za sprečavanje zgrušavanja krvi.
Povećan rizik od krvarenja;
- **lekovima koji imaju ograničeno dejstvo na želudac ili creva, lekovima koji se koriste za uklanjanje viška želudačne kiseline i želudačnih tegoba koje su njome izazvane (antacidi), ili aktivnim ugljem**, lek koji se koristi kod proliva i akutnih trovanja.
Uzmite ove lekove najmanje 2 sata pre upotrebe leka Aspirin plus C forte;
- **heparinima** u terapijskim dozama (npr. za sprečavanje nastanka zgrušavanja krvi) kod pacijenata mlađih od 65 godina.
Povećan rizik od krvarenja;
- **lekovima koji razgrađuju krvne ugruške (trombolitici)**, kao što je streptokinaza.
Povećan rizik od krvarenja;
- **lekovima koji sadrže kortizon ili supstance slične kortizonu (glukokortikoidi)** osim hidrokortizona kao supstitucione terapije.
Povećan rizik od krvarenja;
- **selektivnim inhibitorima ponovnog preuzimanja serotonina**, kao što su **citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin**: lekovi koji se koriste za lečenje depresije.
Povećan rizik od krvarenja;
- **digoksinom**: lek koji se koristi za lečenje srčane slabosti ili nepravilnog rada srca.
Povećana vrednost digoksina u krvi. Preporučuje se da lekar prati vrednost digoksina u krvi i ako je potrebno, da prilagodi dozu;
- **lekovima koji se koriste za lečenje šećerne bolesti (antidijabetici)**, kao što su **insulin ili derivatima sulfoniluree**.
Preporučuje se praćenje vrednosti šećera u krvi;

- **valproinskom kiselinom:** lek koji se koristi za lečenje epilepsije. Povećana toksičnost valproinske kiseline.

Treba obratiti pažnju kada se Lek Aspirin plus C forte uzima u kombinaciji sa:

- **deferasiroksom, deferoksaminom:** lekovi koji se koriste za uklanjanje viška gvožđa iz organizma. Deferasiroks: povećan rizik od krvarenja i stvaranje čira na želucu ili crevima. Upotreba deferoksamina i askorbinske kiseline može povećati toksičnost gvožđa na tkiva, pogotovu na srcu;
- **gvoždem i aluminijumom:** povećanje resorpcije pri primeni askorbinske kiseline. Ovo treba uzeti u obzir ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega, koristite supstitucionu terapiju gvoždem ili uzimate antacide koji sadrže aluminijum;
- **laboratorijski testovi**
Obavestite svog lekara da uzimate lek Aspirin plus C forte. Acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina u velikim dozama mogu uticati na neke laboratorijske testove, kao što su okultna (skrivena) krvarenja u stolici, funkcionalni testovi jetre. Vitamin C može da utiče na laboratorijske testove, kao što su test glukoze, kreatinina, karbamazepina, mokraćne kiseline u urinu, serum. Vitamin C može da ometa testove kojima se određuje vrednost glukoze u urinu i krvi, što može da dovede do netačnih rezultata merenja, iako vitamin C nema uticaja na koncentraciju glukoze u krvi.

Uzimanje leka Aspirin plus C forte sa alkoholom

Izbegavajte konzumiranje alkohola dok uzimate lek Aspirin plus C forte.

Neka neželjena dejstva, kao ona što se dešavaju u gastrointestinalnom traktu ili produženo vreme krvarenja su verovatnija kada se alkohol uzima zajedno sa lekom Aspirin plus C forte.

Lek Aspirin plus C forte sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži 474 mg natrijuma u jednoj šumećoj tableti. To odgovara 23,7% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrijuma za odraslu osobu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća – poslednji trimestar

Ne smete uzimati ovaj lek ako ste u poslednja 3 meseca trudnoće (posle 24. nedelje trudnoće), jer može da naškodi Vama ili Vašem nerođenom detetu ili da izazove probleme pri porođaju. Takođe, ovaj lek može izazvati probleme sa bubrezima i srcem kod Vaše nerođene bebe. Ovaj lek može uticati na sklonost ka krvarenju kod Vas i Vaše bebe i uzrokovati da porođaj bude odložen ili traje duže od očekivanog.

Trudnoća – prvi i drugi trimestar

Ne uzimajte ovaj lek tokom prvog i drugog tromesečja trudnoće (prvih 24 nedelja trudnoće), osim ako to nije apsolutno neophodno i preporučeno od strane Vašeg lekara. Ukoliko Vam je potrebna terapija u ovom periodu, ili dok pokušavate da da zatrudnite, treba koristiti najmanju dozu u najkraćem mogućem periodu. Ako uzimate ovaj lek duže od nekoliko dana u periodu od 20. nedelje trudnoće i nadalje, to može izazvati probleme sa bubrezima kod Vaše nerođene bebe, što može dovesti do smanjene količine amnionske tečnosti koja okružuje Vašu bebu (oligohidramnion) ili do sužavanja krvnog suda (*ductus arteriosus*) u srcu Vaše bebe. Ako Vam je potrebno lečenje duže od nekoliko dana, Vaš lekar može preporučiti dodatno praćenje.

Ukoliko ste uzimali ovaj lek tokom trudnoće, potrebno je da se odmah obratite svom lekaru.

Dojenje

Lečenje lekom Aspirin plus C forte se ne preporučuje tokom dojenja jer prolazi u majčino mleko.

Plodnost

Ovaj lek pripada grupi lekova (NSAIL) koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj uticaj nestaje nakon prestanka uzimanja leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ovaj lek može povremeno da izazove glavobolju ili vrtoglavicu. Nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama ukoliko imate ove simptome.

3. Kako se uzima lek Aspirin plus C forte

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za oralnu upotrebu. Pre upotrebe, šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode. Šumeću tabletu ne treba uzimati na prazan stomak kako bi se smanjila iritacija želuca.

Preporučena doza:

Odrasli i adolescenti (uzrasta od 16 godina i stariji)

- pojedinačna doza: 1 šumeća tableta
Pojedinačna doza se može ponoviti nakon perioda od najmanje 4 sata ukoliko je potrebno.
- maksimalna dnevna doza: 3 šumeće tablete

Stariji pacijenti (uzrasta od 65 godina i stariji) i pacijenti sa malom telesnom masom

Potrebno je uzeti najmanju moguću dozu zbog mogućnosti pojave dodatnih poremećaja. Videti takođe odeljak 2. „Lek Aspirin plus C forte ne smete uzimati” i „Upozorenja i mere opreza”.

Pacijenti sa smanjenom funkcijom jetre ili bubrega ili sa problemima u cirkulaciji

Preporučuje se smanjenje doze ili produženje vremenskog intervala između doza kod pacijenata sa:

- blago do umereno smanjenom funkcijom jetre ili bubrega;
- problemima u cirkulaciji, kao što su srčana slabost i velika krvarenja.

Nemojte uzimati lek Aspirin plus C forte ako imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega, jetre ili nekontrolisanu srčanu funkciju. Vidite odeljak 2. „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte”.

Nemojte uzimati ovaj lek duže od 3 dana u slučaju povišene telesne temperature, ili 3 do 4 dana u slučaju bola, osim ako Vam lekar tako ne savetuje.

Ako ste uzeli više leka Aspirin plus C forte nego što treba

Prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru ako sumnjate na predoziranje ovim lekom.

Simptomi predoziranja se mogu ispoljiti kao:

- zujanje u ušima, poremećaj sluha;
- znojenje;
- mučnina, povraćanje, proliv;
- glavobolja;
- vrtoglavica;
- nagli gubitak funkcije bubrega.

Kod dece, predoziranje može biti sa smrtnim ishodom već pri pojedinačnoj u dozi od 100 mg/kg acetilsalicilne kiseline.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin plus C forte

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Aspirin plus C forte i odmah se obratite lekaru, ili najbližoj bolnici, ukoliko primetite:

- oticanje lica, jezika i grla koje izaziva ozbiljne teškoće pri disanju, koji mogu biti znaci ozbiljne alergijske reakcije (angioedem);
- bol u želucu, crnu prebojenost stolice, povraćanje krvi, povraćanje sadržaja tamno braon boje (liči na talog kafe), koji mogu biti znaci krvarenja u želucu ili crevima

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- poremećaji želuca i creva, kao što su gorušica, proliv, mučnina, povraćanje, problemi sa varenjem.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- bol u želucu, crevima i u trbuhu;
- koprivnjača (urtikarija), osip, svrab (pruritus).

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje i čir organa za varenje (zapaljenje i čir na jednjaku, želucu ili crevima). Ove reakcije ne moraju dovesti do krvarenja i mogu se javiti kod upotrebe bilo koje doze acetilsalicilne kiseline, bez obzira na prisustvo upozoravajućih simptoma ili prethodno prisustvo ozbiljnih događaja u organima za varenje;
- reakcije preosetljivosti kao što su simptomi poput napada astme, zapušen nos ili curenje iz nosa.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- skrivena ili vidljiva krvarenja iz želuca ili creva (povraćanje krvi, crna prebojenost stolice, itd.) koja mogu dovesti do anemije usled nedostatka gvožđa. Rizik od krvarenja zavisi od doze;
- čirevi i perforacije želuca ili creva;
- smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, što može dovesti do napada gihta kod pacijenata koji već imaju smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline.

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

- povećane vrednosti enzima jetre (transaminaze), smanjena funkcija jetre;
- oštećenje funkcije jetre, uglavnom ćelija jetre;
- smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija) usled krvarenja;
- smanjen broj i destrukcija crvenih krvnih zrnaca kod pacijenata sa teškim nedostatkom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze;
- smanjenje broja ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi (trombocitopenija);
- smanjena vrednost šećera u krvi (hipoglikemija);
- reakcije kože;
- reakcije preosetljivosti, ozbiljne alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije).

Reakcije preosetljivosti mogu se ispoljiti na koži, disajnim putevima, cirkulaciji, želucu i crevima, pogotovu kod pacijenata sa astmom. Simptomi uključuju:

- otok tkiva usled povećane količine tečnosti,
- pad krvnog pritiska,
- zviždanje u grudima, nedostatak daha,
- poremećaje u radu srca i disanju,
- alergijske reakcije koje mogu izazvati životno ugrožavajuće stanje šoka,
- osip, koprivnjaču, svrab, ozbiljne alergijske reakcije koje uključuju otok lica ili grla,
- simptome astme, zapaljenje sluzokože nosa što može dovesti do kihanja, curenja iz nosa ili zapušen nos;

- akutna ishemija miokarda (bolno stanje srca uzrokovano nedostatkom dotoka krvi u srce) sa ili bez infarkta miokarda (srčanog udara), koja se javlja kao deo alergijske reakcije (Kunisov sindrom);
- krvarenje ili produženo vreme krvarenja, kao što je krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože, krvarenje u urinarnim i genitalnim organima.
Rizik od krvarenja postoji i od 4 do 8 dana nakon prestanka uzimanja leka Aspirin plus C forte. Može dovesti do povećanog rizika od krvarenja prilikom operacija. Krvarenje u glavi, želucu ili crevima se takođe može javiti. Krvarenje u glavi može biti sa smrtnim ishodom, pogotovu kod upotrebe leka kod starijih pacijenata;
- ozbiljna krvarenja, krvarenje u mozgu, pogotovu kod pacijenata sa nekontrolisanim visokim krvnim pritiskom i/ili kod pacijenata koji koriste lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi (antikoagulansi). U pojedinim slučajevima, ovo može biti životno ugrožavajuće;
- tečnost u plućima (nekardiogeni plućni edem) usled hronične primene i reakcije preosetljivosti acetilsalicilne kiseline;
- smanjena funkcija bubrega, brz gubitak funkcije bubrega, formiranje kamena u bubregu usled upotrebe askorbinske kiseline;
- glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubitka sluha, zujanje u ušima, koji mogu biti simptomi predoziranja;
- Rejev sindrom (poremećaj svesti ili neuobičajeno ponašanje, ili povraćanje) (vidite odeljak 2. „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte“);
- suženje tankog creva (tzv. intestinalna dijafragmalna bolest) (naročito pri dugotrajnoj upotrebi).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Aspirin plus C forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin plus C forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin plus C forte

Aktivne supstance su acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina.
Jedna šumeća tableta sadrži 800 mg acetilsalicilne kiseline i 480 mg askorbinske kiseline.

Pomoćne supstance su:

natrijum-hidrogenkarbonat (modifikovan); limunska kiselina; povidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda lek Aspirin plus C forte i sadržaj pakovanja

Šumeća tableta.

Bela do skoro bela, tableta sa utisnutom oznakom proizvođača („Bayer krst“) u krugu sa jedne strane.

Unutrašnje pakovanje je četvoroslojni strip (papir/PE/aluminijum/jonomer) koji sadrži dve šumeće tablete.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 strip pakovanja sa po dve šumeće tablete (ukupno 10 šumećih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač:

BAYER BITTERFELD GMBH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

003782997 2025 od 07.07.2026.