

UPUTSTVO ZA LEK

Canephron® , obložene tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Canephron i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canephron
3. Kako se uzima lek Canephron
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Canephron
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Canephron i čemu je namenjen

Lek Canephron je tradicionalni biljni lek koji se koristi:

- kao pomoćna i dodatna terapija kod blažih tegoba (kao što su učestalo mokrenje, peckanje prilikom mokrenja i pojačan nagon za mokrenje) izazvanih zapaljenjskim oboljenjima donjih partija mokraćnih puteva,
- kao sredstvo koje pomaže ispiranje mokraćnih puteva u cilju smanjenja taloženja peska iz bubrega.

Lek Canephron je tradicionalni biljni lek koji se upotrebljava u navedenim indikacijama isključivo na osnovu dugogodišnjeg iskustva u primeni.

Obratite se lekaru ukoliko su simptomi i dalje prisutni tokom primene ovog leka ili ukoliko vam se javi neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canephron

Lek Canephron ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance, na druge biljke iz porodice *Apiaceae* (*Umbelliferae*, kao što su na primer: anis, mirođija), anetol (komponentu esencijalnih ulja) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),
- ukoliko imate ili ste imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu,
- u slučaju edema usled narušene funkcije srca ili bubrega, odnosno ukoliko Vam je lekar savetovao smanjen unos tečnosti.

Upozorenja i mere opreza

Odmah se obratite svom lekaru ukoliko se tokom primene leka Canephron pojave povišena telesna temperatura, bol u donjem delu stomaka, grčevi, krv u mokraći, nelagodnost prilikom mokrenja i akutna urinarna retencija (zadržavanje mokraće).

Deca

Nema dovoljno podataka o primeni ovog leka kod dece mlađe od 12 godina.

Poremećaji urinarnog trakta kod dece zahtevaju posebnu medicinsku pažnju (odgovarajuću dijagnostiku, lečenje i praćenje od strane lekara).

Stoga se ne savetuje njegova primena kod dece mlađe od 12 godina.

Drugi lekovi i Canephron

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nisu poznate interakcije sa drugim lekovima. Nisu sprovedena klinička ispitivanja interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Canephron se može primenjivati u toku trudnoće, ukoliko lekar proceni da je to neophodno.

Nije poznato da li se lek Canephron ili njegove aktivne supstance/metaboliti izlučuju u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po novorođenče/odojče. Lek Canephron ne treba koristiti tokom dojenja.

Nema dostupnih podataka o uticaju leka Canephron na plodnost kod ljudi.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju primene leka Canephron na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Canephron sadrži šećere glukozu, laktozu i saharozu.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Canephron

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Odrasli i deca starija od 12 godina

Uzmite 1 obloženu tabletu, 3 puta dnevno.

Nema dovoljno podataka za specifične preporuke za doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre.

Deca

Lek Canephron ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.

Način primene

Uzmite jednu obloženu tabletu leka Canephron, 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče). Obloženu tabletu leka Canephron progutajte celu, bez žvakanja, sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. uz čašu vode).

Preporučuje se povećan unos tečnosti tokom terapije lekom Canephron.

Trajanje terapije

Ukoliko se simptomi pogoršaju ili se ne povuku u roku od 3 dana, obratite se Vašem lekaru ili kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Lek nije namenjen za primenu duže od 2 nedelje bez prethodnog saveta lekara.

Ako ste uzeli više leka Canephron nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Canephron od preporučene, konsultujte Vašeg lekara. On će Vas posavetovati o eventualnim merama koje bi trebalo preduzeti. Neželjena dejstva koja su navedena u ovom uputstvu u tom slučaju mogu biti izraženija.

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja do sada.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Canephron

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Canephron

Prestanak uzimanja leka Canephron obično nije štetan.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
gastrointestinalne tegobe (npr. mučnina, povraćanje, proliv).

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Hipersenzitivnost/alergijske reakcije (npr. osip, svrab, edem lica).

U slučaju pojave nekog neželjenog dejstva, prekinite sa primenom leka i odmah se obratite Vašem lekaru. Lekar će proceniti ozbiljnost neželjenog dejstva i odlučiti o eventualno potrebnim daljim merama.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Canephron

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Canephron posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Canephron

- Aktivne supstance su:

36 mg praška herbe kičice (*Centaurium erythraea* Rafn s.l. (syn. *Centaurium umbellatum* Gilib.; *Erythraea centaurium* Pers.), 36 mg praška korena seleni (*Levisticum officinale* W.D.J.Koch) i 36 mg praška lista ružmarina (*Rosmarinus officinalis* L.).

- Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; skrob, kukuruzni; povidon K 25; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film (obloga) tablete: kalcijum-karbonat; ricinusovo ulje, prečišćeno; gvožđe-(III)-oksid (E172); dekstrin; glukoza sirup; montanglikol vosak; povidon K 30; saharoza; šelak; riboflavin (E101); talk; titan-dioksid (E171).

Kako izgleda lek Canephron i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne obložene tablete narandžaste boje glatkih površina. Obložena tableta je prečnika 10,2 – 10,6 mm.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC/aluminijumski blister sa 15 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 30 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
AICORE CONSUMER DOO
Cara Lazara 5-7
Beograd – Stari Grad

Proizvođač

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
Neumarkt I.d.opf., Bavaria
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

004364389 2025 59010 007 000 515 021 04 002 od 31.07.2026.