

UPUTSTVO ZA LEK

DEMOLOX, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

esomeprazol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primati ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.
- Ovaj lek je propisan samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je lek DEMOLOX i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što primite lek DEMOLOX
3. Kako se primenjuje lek DEMOLOX
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek DEMOLOX
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek DEMOLOX i čemu je namenjen

Lek DEMOLOX sadrži aktivnu supstancu koja se zove esomeprazol. On pripada grupi lekova koji se zovu „inhibitori protonske pumpe“. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koju luči Vaš želudac. Lek DEMOLOX se primenjuje za kratkotrajno lečenje određenih bolesti, kada niste u stanju da uzmete odgovarajuću terapiju oralnim putem.

Kod odraslih pacijenata se propisuje za lečenje:

- „Gastro-ezofagealne refluksne bolesti“ (GERB). To je stanje kada se kiselina iz želuca vraća u jednjak (cevasti organ digestivnog trakta) i tako izaziva bol, zapaljenje i gorušicu;
- Čireva na želucu izazvanih lekovima koji se nazivaju NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi). Lek DEMOLOX može da se propisuje za sprečavanje stvaranja čira na želucu ukoliko već uzimate neki lek iz grupe NSAIL;
- Prevencija ponovnog krvarenja nakon terapijske endoskopije primenjene radi zaustavljanja akutnog krvarenja čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.

Kod dece i adolescenata (uzrasta od 1 do 18 godina) se propisuje za lečenje:

- „Gastro-ezofagealne refluksne bolesti“ (GERB). To je stanje kada se kiselina iz želuca vraća u jednjak i tako izaziva bol, zapaljenje i gorušicu.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek DEMOLOX

Lek DEMOLOX ne smete primati:

- Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na esomeprazol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.);
- Ukoliko ste alergični na bilo koji drugi lek iz grupe inhibitora protonske pumpe (npr. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol);
- Ukoliko uzimate lek koji sadrži nelfinavir (koristi se u terapiji HIV infekcije);

Lek DEMOLOX ne smete da primite ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, pre nego što primite ovaj lek, razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek DEMOLOX:

- Ukoliko imate teške probleme sa jetrom;
- Ukoliko imate teške probleme sa bubrezima;
- Ukoliko ste u prošlosti imali reakcije na koži nakon primene terapije nekim lekom sličnim leku DEMOLOX koji utiče na smanjenje lučenja želudačne kiseline;
- Ukoliko u skorije vreme treba da se podvrgnete specifičnim laboratorijskim analizama krvi (hromogranin A)

Lek DEMOLOX može da prikrije simptome drugih bolesti. **Prema tome, ukoliko Vam se dogode neki od dole navedenih simptoma pre nego što primite ili nakon što primite lek DEMOLOX, odmah to recite svom lekaru:**

- Naglo gubite telesnu masu bez jasnog razloga i imate poteškoća sa gutanjem,
- Boli Vas želudac ili imate loše varenje,
- Počinjete da povraćate hranu ili krv,
- Imate crne stolice (sa sadržajem krvi).

Primena inhibitora protonske pumpe, kao što je i lek DEMOLOX, naročito tokom perioda dužeg od 1 godine, može dovesti do blagog povećanja rizika od preloma kuka, zgloba ruke ili kičme. Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate osteoporozu ili ukoliko uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).

Osip i kožni simptomi

Ukoliko primetite pojavu osipa na koži, posebno na delovima izloženim suncu, obavestite odmah o tome svog lekara, zbog toga što ćete možda morati da prekinete lečenje lekom DEMOLOX. Takođe, obavestite svog lekara ukoliko primetite bilo kakve druge simptome bola, kao što je bol u zglobovima.

Ozbiljne reakcije na koži su prijavljene kod pacijenata koji su primali esomeprazol (videti takođe odeljak 4). Osip može uključivati čireve u ustima, nosu, polnim organima i konjunktivitis (crvene i otečene oči). Ovi ozbiljni osipi na koži se često javljaju nakon simptoma sličnih gripu, kao što su temperatura, glavobolja, bol u telu. Osip može da zahvati velike površine tela sa pojavom plikova i ljušćenja kože.

Ukoliko u bilo kom trenutku tokom terapije (čak i nakon nekoliko nedelja) dobijete osip ili bilo koji od pomenutih simptoma na koži, prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah se obratite svom lekaru.

Drugi lekovi i lek DEMOLOX

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo uključuje i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta. Ovo je zbog toga što lek DEMOLOX može da utiče na način na koji deluju drugi lekovi, a drugi lekovi mogu da deluju na lek DEMOLOX.

Ne smete primiti lek DEMOLOX, ukoliko uzimate lek koji sadrži nelfinavir (lek koji se propisuje u terapiji HIV infekcije).

Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- Atazanavir (lek koji se propisuje u terapiji HIV infekcije);
- Klopidoogrel (lek koji se propisuje za prevenciju zgrušavanja krvi);
- Ketokonazol, itrakonazol ili vorikonazol (lekovi koji se propisuju za lečenje infekcija izazvanih gljivicama);
- Erlotinib (lek koji se propisuje za lečenje kancera (raka)).
- Citalopram, imipramin ili klomipramin (lekovi koji se propisuju za lečenje depresije).
- Diazepam (lek koji se propisuje za lečenje anksioznosti, opuštanje mišića i kod epilepsije).
- Fenitoin (lek koji se propisuje u terapiji epilepsije). Ukoliko uzimate fenitoin, Vaš lekar će morati da Vas kontroliše kada započinjete i kada prestajete da uzimate DEMOLOX.
- Lekove koji se koriste za razređivanje krvi, kao što je varfarin. Vaš lekar će morati da Vas kontroliše kada započinjete i kada prestajete da uzimate DEMOLOX.
- Cilostazol (lek koji se propisuje za lečenje „intermitentne klaudikacije“ bol u nogama prilikom hodanja, izazvan nedovoljnim dotokom krvi).
- Cisaprid (lek koji se propisuje u terapiji lošeg varenja i gorušice).
- Digoksin (lek koji se propisuje u terapiji bolesti srca).
- Metotreksat (hemioterapijski lek koji se u velikim dozama propisuje za lečenje kancera (raka))-ukoliko primete veliku dozu metotreksata, Vaš lekar može privremeno obustaviti terapiju lekom DEMOLOX.
- Takrolimus (lek koji se propisuje prilikom transplantacije organa).
- Rifampicin (lek koji se propisuje za lečenje tuberkuloze).
- Kantarion (*Hypericum perforatum*) (propisuje se za lečenje depresije).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Vaš lekar će odlučiti da li tokom ovog perioda može da Vam propiše lek DEMOLOX.

Nije poznato da li se lek DEMOLOX izlučuje u majčino mleko. Prema tome, ukoliko dojite, ne treba da primete lek DEMOLOX.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Mala je verovatnoća da će lek DEMOLOX da utiče na Vašu sposobnost za upravljanje vozilima i rukovanje mašinama. Međutim, neželjene reakcije kao što su vrtoglavica i zamagljen vid mogu povremeno da se jave (vidite odeljak 4). Ukoliko se kod Vas ispolje ove neželjene reakcije, nemojte da upravljate vozilima niti da rukujete mašinama.

Lek DEMOLOX sadrži natrijum-edetat i natrijum hidroksid.

Jedna bočica sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma“.

3. Kako se primenjuje lek DEMOLOX

Lek DEMOLOX može da se primenjuje kod dece i adolescenata uzrasta od 1 do 18 godina i odraslih, uključujući i starije osobe.

Primena kod odraslih osoba

- Lek DEMOLOX će Vam propisati lekar koji će odlučiti koliko doza ovog leka Vam je leka potrebno.
- Uobičajena doza iznosi 20 mg ili 40 mg jednom dnevno.
- Ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre, maksimalna doza je 20 mg na dan (GERB).
- Ovaj lek se primenjuje injekcijom ili infuzijom u venu. Primena leka traje najduže 30 minuta.
- Uobičajena doza u prevenciji ponovnog krvarenja čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu je 80 mg, primenjena tokom 30 minuta u obliku intravenske infuzije, nakon čega se primenjuje kontinuirana infuzija u dozi od 8 mg/sat tokom 3 dana. Ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre, kontinuirana infuzija u dozi od 4 mg/sat primenjena tokom 3 dana može biti dovoljna, u ovoj indikaciji.

Primena kod deca i adolescenata (uzrasta od 1 do 18 godina)

- Lek DEMOLOX će primeniti lekar koji će odlučiti kolika doza ovog leka Vam je potrebna.
- Uobičajena doza za decu uzrasta od 1 do 11 godina iznosi 10 mg ili 20 mg jednom dnevno.
- Uobičajena doza za decu uzrasta od 12 do 18 godina iznosi 20 mg ili 40 mg jednom dnevno.
- Ovaj lek se primenjuje injekcijom ili infuzijom u venu. Primena leka traje najduže 30 minuta.

Ukoliko ste primili više leka DEMOLOX nego što treba

Ukoliko mislite da ste primili previše leka DEMOLOX, odmah se obratite svom lekaru.

Ukoliko ste zaboravili da primite lek DEMOLOX

Ovaj lek ćete primiti u zdravstvenoj ustanovi i primeniće Vam ga zdravstveni radnik, tako da ne postoji mogućnost da doza propisanog leka bude zaboravljena.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek.

Ukoliko primetite bilo koje od sledećih težih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka DEMOLOX i odmah se obratite Vašem lekaru:

- Žuta prebojenost kože, tamna mokraća i umor što mogu biti simptomi problema sa jetrom. Ova neželjena dejstva su retka i javljaju se kod manje od 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek.
- Iznenadno zviždanje u plućima pri disanju, otok usana, jezika i grla, ili celog tela, osip, gubitak svesti ili otežano gutanje (teška alergijska reakcija). Ova neželjena dejstva su retka i javljaju se kod manje od 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek.
- Iznenadna pojava teškog osipa ili crvenila na koži sa plikovima ili ljuštenjem kože, može se javiti čak i nakon

više nedelja nakon započinjanja lečenja. Kožni osipi mogu prerasti u ozbiljna, raširena oštećenja kože (ljušćenje epidermisa i površinskih sluzokoža) sa životno ugrožavajućim posledicama. Takođe, se mogu javiti i jaki plikovi i krvarenje u ustima, očima, usnama, nosu i genitalijama. Ovo bi mogli da budu simptomi multiformnog eritema ili *Stevens-Johnson*-ovog sindroma ili toksične epidermalne nekrolize ili reakcija na lek sa povećanjem jedne vrste belih krvnih ćelija (eozinofila) i sistemskim simptomima. Ova neželjena dejstva su veoma retka i javljaju se kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek.

- Rasprostranjen osip, groznica-visoka telesna temperature i uvećani limfni čvorovi (*DRESS* sindrom ili sindrom preosetljivosti na lekove), javljaju se veoma retko, kod više od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek.

U ostala neželjena dejstva se ubrajaju:

Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

- glavobolja,
- dejstva na želudac ili creva: dijareja, bol u stomaku, otežano pražnjenje creva, nadimanje (vetrovi),
- pojava mučnine ili povraćanja,
- reakcija na mestu primene,
- pojava benignih polipa u želucu.

Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

- otok stopala i skočnih zglobova,
- poremećaj spavanja (nesanica),
- vrtoglavica, osećaj peckanja "trnjenje", pospanost,
- vertigo,
- problemi sa vidom, kao što je zamagljen vid,
- suva usta,
- promene vrednosti laboratorijskih parametara krvi koji ukazuju na funkciju jetre,
- osip na koži, koprivnjača i svrab po koži,
- prelomi kuka, zglobova ruke ili kičme (ukoliko se lek DEMOLOX primenjuje u velikim dozama i tokom dužeg vremenskog perioda).

Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

- problemi sa krvlju kao što su smanjeni broj belih krvnih zrnaca ili krvnih pločica (trombocita). Ovo može da se manifestuje malaksalošću, stvaranjem modrica i većom verovatnoćom nastanka infekcija,
- smanjenje koncentracije natrijuma u krvi. Ovo može da izazove malaksalost, mučninu (povraćanje) i grčeve,
- osećaj uznemirenosti, zbunjenosti ili depresije,
- izmenjeno čulo ukusa,
- iznenadna pojava šištanja u plućima, gubitak daha (kratak dah) (bronhospazam),
- zapaljenje sluzokože usta,
- infekcija izazvana gljivicama koja može da zahvati creva,
- problemi sa jetrom, uključujući žuticu, koja se manifestuje žutom prebojenošću kože, sluzokože, tamnim urinom i umorom,
- opadanje kose (alopecija),
- osip na koži pri izlaganju suncu,
- bol u zglobovima (artralgija) ili mišićima (mijalgija),
- opšti osećaj slabosti i nedostatak energije,
- pojačano znojenje.

Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

- promene u krvnoj slici uključujući agranulocitozu (nedostatak belih krvnih zrnaca),
- agresivnost,
- kada vidite, osećate ili čujete stvari koje ne postoje (halucinacije),
- teški problemi sa jetrom koji dovode do slabosti jetre i zapaljenja mozga,

- nagla pojava teškog osipa na koži ili plikova ili ljušćenja kože što može biti udruženo sa groznicom-povišeno, telesnom temperaturom i bolom u zglobovima (multiformni eritem, *Stevens-Johnson*-ov sindrom toksična epidermalna nekroliza, reakcija na lek sa povećanjem jedne vrste belih krvnih ćelija (eozinofila) i sistemskim simptomima),
- mišićna slabost,
- teži problemi sa bubrezima,
- povećanje dojki kod muškaraca.

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti iz raspoloživih podataka):

- Ukoliko primete lek DEMOLOX duže od tri meseca može doći do pada koncentracije magnezijuma u krvi, što može da dovede do slabosti, spontanog grčenja mišića, dezorijentacije, grčeva (konvulzija), vrtoglavice i ubrzanja srčanog ritma. Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite svom lekaru. Mala koncentracija magnezijuma u krvi može dovesti i do smanjenja koncentracije kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš lekar se može odlučiti da sprovodi redovne analize krvi kako bi pratio koncentraciju magnezijuma u krvi,
 - Zapaljenje creva, koje dovodi do dijareje (proliva),
 - Osip, uz moguće bolove u zglobovima.

Lek DEMOLOX u veoma retkim slučajevima može da utiče na bela krvna zrnca i dovede do oslabljenog imuniteta. Ukoliko imate infekciju sa simptomima kao što su povišena telesna temperatura i teško oslabljeno opšte stanje organizma, ili povišenu temperaturu sa simptomima lokalne infekcije kao što je bol u vratu, grlu ili ustima, ili imate otežano mokrenje, morate se posavetovati sa lekarom što pre, kako bi se nedostatak nedostatak belih krvnih zrnaca (agranulocitoza) isključio laboratorijskom analizom krvi. Veoma je važno da ovom prilikom date sve informacije o leku koji primete.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 Nacionalni centar za farmakovigilancu
 Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
 Republika Srbija
 website: www.alims.gov.rs
 e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek DEMOLOX

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek DEMOLOX posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji ili etiketi bočice nakon "Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Bočice se mogu čuvati pri jakoj veštačkoj svetlosti van kutije do 24 sata.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja

Stabilnost nakon rekonstitucije: lek DEMOLOX, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, nakon rekonstitucije je stabilan u roku od 12 sati na 30±2°C (R.H. 65 ±5%) kada je zaštićen od svetlosti i tokom 6 sati na 30±2°C (R.H. 65 ±5%) pod jakim veštačkim svetlom, kada se rastvori u 5 ml NaCl 0,9%.

Stabilnost nakon razblaživanja: lek DEMOLOX, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju nakon rekonstitucije sa 5 ml NaCl 0,9%, i razblaživanja do 50 ml i 100 ml NaCl 0,9% da bi se dobila koncentracija esomeprazola 0,8 mg/ml i 0,4mg/ml i stabilni su 12 sati na temperaturi do 30°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor nakon rekonstitucije/razblaženja treba upotrebiti odmah.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek DEMOLOX

Aktivna supstanca je esomeprazol-natrijum.

Jedna bočica praška za rastvor za injekciju/infuziju sadrži 42,5 mg esomeprazol-natrijuma, što odgovara 40 mg esomeprazola.

Pomoćne supstance su dinatrijum-edetat i natrijum-hidroksid.

Kako izgleda lek DEMOLOX i sadržaj pakovanja

Prašak za rastvor za injekcije/infuziju.

Porozni kolač ili prašak, bele do skoro bele boje.

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena bočica (tip I) zatvorena čepom od brombutil gume preko kojeg se nalazi aluminijumski zatvarač sa plastičnim *flip-off* poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

LICENTIS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bežanijskih Ilegalaca 18b, Beograd – Novi Beograd

Proizvođač:

DEMO SA PHARMACEUTICAL INDUSTRY,

21st km National Road Athens-Lamia, Krioneri-Attiki, Grčka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2026.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz ograničeni lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

004533559 2025 od 17.08.2026

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Lek DEMOLOX sadrži 40 mg esomeprazola u obliku natrijumove soli. Jedna bočica sadrži još i dinatrijum-edetat i natrijum-hidroksid (< 1 mmol natrijuma).

Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Ukoliko za pojedinačnu dozu nije potreban ceo rekonstituisani sadržaj bočice, neiskorišćeni rastvor treba baciti.

Za dodatne informacije o preporučenim dozama i uslovima čuvanja, pogledati odeljke u nastavku.

Priprema i primena rekonstituisanog rastvora

Rekonstituisani rastvor za injekciju ili infuziju je bistar i bezbojan do veoma blago žute boje. Pre upotrebe treba vizuelno proveriti da li rastvor sadrži čestice i da li je došlo do promene boje. Sme se koristiti samo bistar rastvor.

Hemijska i fizička stabilnost tokom upotrebe dokazana je tokom 12 sati na temperaturi od 30 ± 2 °C. Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor treba upotrebiti odmah.

Esomeprazol – rastvor za injekciju

Za pripremu rastvora za injekciju:

Injekcija 40 mg

Rastvor za injekciju (8 mg/ml) priprema se dodavanjem 5 ml 0,9% rastvora natrijum-hlorida za intravensku upotrebu u bočicu koja sadrži 40 mg esomeprazola.

Rekonstituisani rastvor za injekciju treba primeniti intravenski tokom najmanje 3 minuta.

Za dodatne informacije o primeni doze videti odeljak 4.2 Sažetka karakteristika leka (SmPC).

Esomeprazol – rastvor za infuziju

Za pripremu rastvora za infuziju:

Infuzija 40 mg

Rastvor za infuziju priprema se rastvaranjem sadržaja jedne bočice esomeprazola 40 mg u najviše 100 ml 0,9% rastvora natrijum-hlorida za intravensku primenu.

Infuzija 80 mg

Rastvor za infuziju priprema se rastvaranjem sadržaja dve bočice esomeprazola 40 mg u najviše 100 ml 0,9% rastvora natrijum-hlorida za intravensku primenu.

Za dodatne informacije o primeni doze videti odeljak 4.2 Sažetka karakteristika leka (SmPC).

Odlaganje

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.