

UPUTSTVO ZA LEK

Strepsils® pomorandža sa vitaminom C, 1,2 mg/0,6 mg/33,5 mg/74,9 mg, lozenga
INN: 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, askorbinska kiselina, natrijum-askorbat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C
3. Kako se uzima lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C i čemu je namenjen

Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C sadrži aktivne supstance 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, askorbinsku kiselinu, natrijum-askorbat i spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici. Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C je namenjen za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela.

Jedna lozenga Strepsils pomorandža sa vitaminom C sadrži aktivne supstance:

2,4-dihlorbenzilalkohol	1,2 mg
Amilmetakrezol	0,6 mg
Askorbinska kiselina	33,5 mg
Natrijum-askorbat	74,9 mg

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C ne smete uzimati:

- Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4–dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, askorbinsku kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).
Lek se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C.

Ukoliko simptomi infekcije usne duplje i ždrela traju duže od 3 dana ili primetite neki neuobičajeni simptom, obavezno se obratite lekaru.

Drugi lekovi i Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Uzimanje leka Strepsils pomorandža sa vitaminom C sa hranom i pićima

Nije primenjivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils pomorandža sa vitaminom C lozengi tokom trudnoće.

Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi produkti razgradnje izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se ne može isključiti rizik po odojče.

Nije poznato da lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C utiče na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils pomorandža sa vitaminom C na upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.

Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C sadrži glukozu, saharozu, boju Ponceau 4R (E 124) i boju Sunset yellow.

Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C, lozenge sadrži glukozu i saharozu, u slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Strepsils pomorandža sa vitaminom C lozenge sadrže boju Ponceau 4R (E 124) i boju Sunset yellow (E 110), koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.

3. Kako se uzima lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Strepsils pomorandža sa vitaminom C, lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrase i decu stariju od 6 godine je:

Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 sata.

Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

Lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina, zbog rizika od davljenja

Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

Lozengu polako otapati u ustima.

Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.

Preporučuje se upotreba najduže 3 dana, ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite se Vašem lekaru.

Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Strepsils pomorandža sa vitaminom C nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni amilmetakrezola i 2,4-dihlorbenzilalkohola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta. U terapiji hroničnih stanja, tokom dugotrajne primene, mogu se javiti dodatna neželjena dejstva.

Neželjeni događaji koji su povezani sa upotrebom leka Strepsils pomorandža sa vitaminom C su dati u nastavku:

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost

Gastrointestinalni poremećaji: bol u truhu, mučnina, nelagodnost u usnoj duplji

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne smete koristiti lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C

Jedna lozenga sadrži: 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohol, 0,6 mg amilmetakrezol, 33,5 mg askorbinska kiselina i 74,9 mg natrijum-askorbat.

Pomoćne supstance: levomentol; Sunset Yellow (E 110); ponceau 4R (E 124); propilenglikol; Blood Orange PHL105288; glukoza, tečna; vinska kiselina; saharoza, tečna.

Kako izgleda lek Strepsils pomorandža sa vitaminom C i sadržaj pakovanja

Strepsils pomorandža sa vitaminom C su okrugle lozenge narandžaste boje, karakterističnog ukusa na pomorandžu i mentol, sa utisnutim Strepsils zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole

NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd

Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.,
Nottingham, Thane Road, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole: 515-01-01377-16-001 od 04.01.2017.