

## UPUTSTVO ZA LEK

**Strepsils® mentol i eukaliptus, 1,2 mg / 0,6 mg / 8 mg, lozenga**

**INN: 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol**

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.**

Uvek uzimajte primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

**U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Strepsils mentol i eukaliptus i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils mentol i eukaliptus
3. Kako se uzima lek Strepsils mentol i eukaliptus
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Strepsils mentol i eukaliptus
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

## 1. Šta je lek Strepsils mentol i eukaliptus i čemu je namenjen

Lek Strepsils mentol i eukaliptus spada u grupu lekova koji se zovu antiseptic. Namenjen je za ublažavanje simptoma infekcije sluzokože usne duplje i ždrela, suvog, iritirajućeg kašlja kod uobičajene prehlade i začepljenog nosa.

Jedna lozenga Strepsils mentol i eukaliptus sadrži aktivne supstance:

2,4 – dihlorbenzilalkohol	1,2 mg
Amilmetakrezol	0,6 mg
Levomentol	8,0 mg

## 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils mentol i eukaliptus

### Lek Strepsils mentol i eukaliptus ne smete uzimati:

- Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4 – dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).  
Lek se ne sme davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

### Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils mentol i eukaliptus. Ukoliko simptomi infekcije usne duplje i ždrela traju duže od 3 dana ili primetite neki neuobičajeni simptom, obavezno se obratite lekaru.

### Drugi lekovi i Strepsils mentol i eukaliptus

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Nisu poznate klinički značajne interakcije.

### Uzimanje leka Strepsils mentol i eukaliptus sa hranom i pićima

Nije primenljivo.

### Trudnoća, dojenje i plodnost

*Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.*

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils mentol i eukaliptus lozengi tokom trudnoće.

Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi produkti razgradnje izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se ne može isključiti rizik po odojče.

Nije poznato da lek Strepsils mentol i eukaliptus utiče na plodnost.

### Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils mentol i eukaliptus na upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.

### Strepsils mentol i eukaliptus lozenge sadrže glukozu i saharozu.

Lek Strepsils mentol i eukaliptus, lozenge sadrži glukozu i saharozu, u slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

## 3. Kako se uzima lek Strepsils mentol i eukaliptus

Lek Strepsils mentol i eukaliptus lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza za odrase i decu stariju od 6 godine je:

Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 sata.

Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

Lek Strepsils mentol i eukaliptus se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

Lozengu polako otapati u ustima.

Najnižu efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.

Preporučuje se upotreba najduže 3 dana, ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite se Vašem lekaru.

*Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.*

### **Ako ste uzeli više leka Strepsils mentol i eukaliptus nego što treba**

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko.

### **Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils mentol i eukaliptus**

Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

## **4. Moguća neželjena dejstva**

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4-dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta. U terapiji hroničnih stanja, tokom dugotrajne primene, mogu se javiti dodatna neželjena dejstva.

Neželjeni događaji koji su povezani sa upotrebom leka Strepsils mentol i eukaliptus, su dati u nastavku:

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost
- Gastrointestinalni poremećaji: bol u truhu, mučnina, nelagodnost u usnoj duplji
- Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.

### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd  
Republika Srbija  
website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)  
e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

## 5. Kako čuvati lek Strepsils mentol i eukaliptus

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne smete koristiti lek Strepsils mentol i eukaliptus posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

## 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

### Šta sadrži lek Strepsils mentol i eukaliptus

Jedna lozenga sadrži aktivne supstance:

2,4 – dihlorbenzilalkohol	1,2 mg
Amilmetakrezol	0,6 mg
Levomentol	8,0 mg

Pomoćne supstance: vinska kiselina; ulje eukaliptusa; indigo karmin (E 132); saharoza, tečna; glukoza, tečna.

### Kako izgleda lek Strepsils mentol i eukaliptus i sadržaj pakovanja

Strepsils mentol i eukaliptus su okrugle lozenge plave boje, karakterističnog ukusa, sa utisnutim Strepsils zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.

**Nosilac dozvole:** NELT CO. D.O.O. BEOGRAD, Maršala Tita 206, Beograd

**Proizvođač:** RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.,  
Nottingham, Thane Road, Velika Britanija

### Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2017

### Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

### Broj i datum dozvole:

515-01-01381-16-001 od 04.01.2017.