



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

UPUTSTVO ZA LEK

POVIDON JOD, rastvor za ispiranje usta, 8,5 %
Pakovanje: kontejner, plastični, 1 x 50ml

Proizvođač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

POVIDON JOD, 8,5 %, rastvor za ispiranje usta
INN: povidon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek POVIDON JOD i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek POVIDON JOD
3. Kako se upotrebljava lek POVIDON JOD
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek POVIDON JOD
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK POVIDON JOD I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek POVIDON JOD predstavlja kompleks joda i polimernog nosača povidona. Iz takvog kompleksa, jod se postepeno oslobađa delujući protiv širokog spektra patogenih uzročnika: bakterija, virusa, gljivica, spora i protozoa.

Povidon jod rastvor za ispiranje usta se koristi:

- kod akutnih infekcija mukoze (sluzokože) usta i grla, npr. gingivitis i ulceracije u ustima.
- za održavanje oralne higijene, pre, za vreme i nakon stomatoloških intervencija i intervencija u usnoj duplji.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD ne smete koristiti:

- kod dece mlađe od 6 godina,
- ukoliko ste preosetljivi na jod,
- ako imate oboljenje štitne žlezde (uključujući gušavost i Hašimotov tireoiditis).

Kada uzimate lek POVIDON JOD, posebno vodite računa ukoliko:

- uzimate litijum (za lečenje psihoza)

Lek POVIDON JOD rastvor za ispiranje usta ne smete koristiti duže od 14 dana. Ukoliko ne dođe do zarastanja rana i ulceracija u ustima u roku od 14 dana, obratite se Vašem lekaru ili stomatologu.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Primena leka POVIDON JOD može uticati na testove ispitivanja funkcije štitne žlezde. Kod nekoliko vrsta testova za određivanje prisustva krvi u stolici ili mokraći, povidon-jod može dati lažno pozitivne rezultate.

Primena leka POVIDON JOD u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Za vreme trudnoće i dojenja ne preporučuje se upotreba povidon joda s obzirom da prolazi placentarnu barijeru i izlučuje se u mleko dojilje. Iako kod ograničene primene povidon rastvora nisu zabeležena neželjena dejstva, treba proceniti odnos terapijske koristi i rizika od nastanka neželjenih efekata na funkciju i razvoj štitne žlezde kod ploda.

Primenu povidon-jod rastvora za ispiranje usta kod trudnica i dojilja treba sprovoditi isključivo kao jednokratnu terapiju.

Uticaj leka POVIDON JOD na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka koji ukazuju da rastvor povidon-joda utiče na upravljanje motornim vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD ne sadrži pomoćne supstance koje mogu imati uticaja na bezbednu primenu leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK POVIDON JOD

Lek POVIDON JOD uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu, kao rastvor za ispiranje usta. Rastvor ne treba gutati.

Odrasli i deca starija od 6 godina:

Koristi se koncentrovan (konc. 8,5%) ili rastvor razblažen sa jednakom količinom tople vode (potrebno višestruko razblažiti). Ispirati usta sa 10ml (razblaženog) rastvora u trajanju od 30 sekundi, bez gutanja. Postupak ponoviti 4 puta u toku dana, u trajanju od maksimalno 14 uzastopnih dana ili prema propisanom režimu.

Ako ste uzeli više leka POVIDON JOD nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Jod uzet u velikim količinama može izazvati gušavost i oslabljenu ili pojačanu funkciju štitne žlezde. Simptomi akutnog predoziranja su: metalni ukus u ustima, prekomerno lučenje pljuvačke, pečenje ili bol u grlu ili ustima, iritacija i oticanje očiju, otežano disanje zbog plućnog edema, reakcije na koži, stomachne tegobe i proliv. Može doći do razvoja metaboličkog poremećaja (acidoze), povećanja natrijuma u krvi i oštećenja funkcije bubrega.

Ako ste zaboravili da uzmete lek POVIDON JOD

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek POVIDON JOD

Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom POVIDON JOD bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek POVIDON JOD, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

- iritacija kože
- preosetljivost (uključujući težak oblik alergijske reakcije – anafilaktičku reakciju)
- metabolički poremećaji (acidoza)
- porast koncentracije natrijuma u krvi (hipernatremija)
- oštećenje bubrežne funkcije

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK POVIDON JOD

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

2 (dve) godine.

Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek POVIDON JOD

Aktivne supstance su:

POVIDON JOD, 8,5 %, rastvor za ispiranje usta:

100 ml rastvora sadrži:

povidon-jod 8,5 g (što odgovara 0,85g raspoloživog joda)

Ostali sastojci su:



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

POVIDON JOD, 8,5 %, rastvor za ispiranje usta:

- saharin-natrijum (E 954);
- makrogol 400;
- L-mentol;
- voda, prečišćena;
- etanol, 96%.

Kako izgleda lek POVIDON JOD i sadržaj pakovanja

POVIDON JOD, 8,5 %, rastvor za ispiranje usta, 50ml:

Rastvor tamnosmeđe boje, karakterističnog mirisa na jod.

HDPE boca sa belim PP zatvaračem. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.

Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2011.

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-0143-11-002 od 21.12.2011.