

## UPUTSTVO ZA LEK

### **Argifen<sup>®</sup> Forte, 600 mg, granule za oralni rastvor**

ibuprofen

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.**

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

#### **U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Argifen Forte i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Argifen Forte
3. Kako se uzima lek Argifen Forte
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Argifen Forte
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

## 1. Šta je lek Argifen Forte i čemu je namenjen

Lek Argifen Forte sadrži aktivnu supstancu ibuprofen u obliku ibuprofen-arginata.

Lek Argifen Forte pripada grupi lekova sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom. Koristi se za otklanjanje bolova i inflamacije u zapaljenskim stanjima kao što su osteoartritis, reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis (zapaljensko oboljenje kičme), otečeni zglobovi (artropatije), smrznuto rame (kapsulitis, ukočenost i bolovi u ramenu), zapaljenje omotača zgloba (burzitis), zapaljenje tetiva (tendinitis), zapaljenje tetivnog omotača (tendosinovitis), bolovi u donjem delu leđa, kao i kod povreda mekih tkiva, kao što su istegnuća i uganuća.

Lek Argifen Forte se može koristiti za lečenje bolnih stanja sa blagim do umerenim bolovima kao što su zubobolja, bol nakon operacije, bolne menstruacije i glavobolje, uključujući migrenu.

## 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Argifen Forte

### Lek Argifen Forte ne smete koristiti:

- ako ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);
- ako ste prethodno imali alergijsku reakciju (npr. astma ili otežano disanje, koprivnjača, oticanje lica, jezika, usana, grla, curenje nosa ) nakon primene ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog leka (NSAIL);
- ako ste imali dokazano krvarenje ili perforaciju želuca ili creva pri primeni nekog leka iz grupe NSAIL;
- ako imate ili ste imali peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu), perforaciju ili krvarenje u želucu ili crevima (dva ili više potvrđena slučaja);
- ako imate neko oboljenje pri kome postoji povećana sklonost ka krvarenju;
- ako imate teško oboljenje srca;
- ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega;
- ako ste u trećem trimestru trudnoće.

Lek nije namenjen za osobe mlađe od 12 godina.

### Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Argifen Forte:

- ako imate ili ste imali čir na želucu ili neko drugo oboljenje želuca (videti odeljak „Lek Argifen Forte ne smete koristiti”);
- ako imate sistemski eritemski lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaj vezivnog tkiva (autoimunske bolesti koje zahvataju vezivno tkivo);
- ako imate oboljenje jetre ili bubrega;
- ako imate probleme sa želucom i crevima (kao što su ulcerozni kolitis ili Kronova bolest);
- ako imate astmu ili alergiju ili hronični rinitis (hronično zapanjenje nosne sluznice);
- ako ste trudni ili planirate trudnoću, ili ako dođite. Lek Argifen Forte može da oteža mogućnost da zatrudnite. Posavetujte se sa svojim lekarom ako planirate trudnoću ili imate problema da zatrudnite;
- ako imate ovčije boginje (varičele) (videti i odeljak 4);
- ako imate infekciju (videti odeljak „Infekcije”);
- ako ste starijeg životnog doba, jer stariji pacijenti su skloniji neželjenim dejstvima ove grupe lekova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), kao što su gastrointestinalna krvarenja i perforacije koje mogu biti sa smrtnim ishodom;
- ako imate oboljenje srca.

Lekovi kao što je Argifen Forte (antiinflamatorni lekovi/lekovi protiv bolova) mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od nastanka srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara, naročito pri primeni

velikih doza (2400 mg dnevno). Zato, nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja lečenja.

Pre nego što uzmete lek Argifen Forte treba da razgovarate o Vašoj terapiji sa lekarom ili farmaceutom ako:

- imate srčane probleme, uključujući srčanu slabost, anginu (bol u grudima), ili ako ste imali srčani udar, operaciju ugrađivanja bajpasa, bolest perifernih arterija (oslabljena cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženja ili začepljenja arterija), ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući „mini-udar“ ili „tranzitorni (prolazni) ishemijski napad“ (TIA));
- ako imate visok krvni pritisak, šećernu bolest (dijabetes), povećanu vrednost holesterola u krvi, porodičnu istoriju srčanih oboljenja ili moždanog udara, ili ako ste pušač.

Pojava neželjenih dejstava leka se može smanjiti primenom najmanje efikasne doze leka u što kraćem vremenskom periodu potrebnom za lečenje simptoma.

Potreban je oprez prilikom započinjanja lečenja lekom Argifen Forte kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitak velike količine vode i elektrolita iz organizma). Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega, naročito kod dehidrirane dece, adolescenata i starijih osoba.

Lek Argifen Forte, kao i drugi NSAIL, može da poremeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.

Trebalo bi da izbegavate preteranu upotrebu analgetika. Ako često uzimate lekove protiv bolova, posebno kombinacije različitih lekova protiv bolova, možete oštetiti funkciju bubrega. Obavestite svog lekara ako već uzimate neki lek protiv bolova pre uzimanja ovog leka i Vaš lekar će odlučiti da li treba da uzimate ovaj lek. Rizik može da se poveća ako ste dehidrirani.

### Reakcije kože

Prijavljene su ozbiljne reakcije kože povezane sa lečenjem ibuprofenom. Prestanite sa uzimanjem leka Argifen Forte i odmah se obratite lekaru ako Vam se jave osip kože, lezije na sluzokoži, plikovi na koži, u ustima, ili drugi znaci alergije, jer ovo mogu biti prvi znaci veoma ozbiljnih reakcija kože. Videti odeljak 4.

### Infekcije

Lek Argifen Forte može maskirati simptome infekcije, kao što su povišena temperatura i bolovi. Zbog toga je moguće da lek Argifen Forte dovede do odlaganja odgovarajućeg lečenja infekcije i na taj način poveća rizik od nastanka komplikacija. Ovo je primećeno kod bakterijskih pneumonija (zapaljenje pluća) i bakterijskih infekcija kože povezanih sa varicelama (ovčije boginje). Ukoliko uzimate ovaj lek dok imate infekciju i simptomi infekcije potraju ili se pogoršaju odmah se obratite lekaru.

Upotreba analgetika tokom dužeg vremenskog perioda kod nekih pacijenata je povezana sa pojavom glavobolja (glavobolja izazvana prekomernom upotrebom analgetika). Pacijenti koji imaju česte ili svakodnevne glavobolje uprkos (ili zbog) redovnoj upotrebi analgetika, ne treba da uzimaju povećane doze leka Argifen Forte. Razgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko Vam se javljaju glavobolje dok uzimate ovaj lek.

Pri istovremenoj upotrebi prekomernih količina alkohola i NSAIL, uključujući ibuprofen, može doći do povećane učestalosti neželjenih reakcija na gastrointestinalni trakt, poput gastrointestinalnog krvarenja, ili na centralni nervni sistem.

### **Drugi lekovi i lek Argifen Forte**

*Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.*

Lek Argifen Forte može da utiče na dejstvo drugih lekova i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Argifen Forte, na primer:

- lekovi kao što su antikoagulansi (lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin);
- lekovi za sniženje povišenog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta blokatori kao što je atenolol, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan).

Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored prethodno navedenih, uzimate neki od sledećih lekova:

- diuretike (lekovi koji se koriste za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, pojačano mokrenje);
- kortikosteroide (koriste se u lečenju zapaljenskih stanja);
- lekove poznate pod nazivom selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (lekovi koji se koriste u terapiji depresije);
- litijum (lek koji se koristi u lečenju nekih psihičkih oboljenja);
- metotreksat (koristi se u lečenju nekih vrsta karcinoma i reumatoidnog artritisisa);
- zidovudin (antivirusni lek);
- lekove koji su poznati kao derivati sulfoniluree kao što je glibenklamid (koristi se za lečenje šećerne bolesti);
- kardiotonične glikozide, kao što je digoksin, koji se koriste za lečenje oboljenja srca;
- lekove poznate pod nazivom imunosupresivi kao što su ciklosporin i takrolimus (lekovi koji utiču na imunski odgovor);
- mifepriston (lek koji se koristi za prekid trudnoće);
- antibiotike pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin;
- biljne lekove kao što je *Ginko biloba* (može povećati rizik od krvarenja kod istovremene primene sa ibuprofenom);
- aminoglikozide (vrsta antibiotika);
- bilo koji drugi lek koji sadrži ibuprofen, uključujući one koji se mogu kupiti bez recepta;
- bilo koji drugi lek protiv zapaljenja i bolova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu;
- holestiramin (lek koji se koristi za snižavanje vrednosti holesterola);
- vorikonazol ili flukonazol (lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija).

I neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Argifen Forte i lek Argifen Forte može da utiče na dejstvo drugih lekova. Zbog toga, uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom.

### **Uzimanje leka Argifen Forte sa hranom ili pićima**

Lek Argifen Forte se može uzeti nezavisno od obroka. Pacijentima sa osetljivim želucem se preporučuje upotreba leka tokom ili nakon obroka.

### **Trudnoća i dojenje**

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

#### Trudnoća

Lek Argifen Forte ne smete uzimati tokom poslednja tri meseca trudnoće. Tokom prvih šest meseci trudnoće obavezno se posavetujte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.

#### Dojenje

Lek Argifen Forte treba izbegavati tokom perioda dojenja.

Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

## **Upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

Lek Argifen Forte može da izazove vrtoglavicu, pospanost, umor i smetnje u vidu. U slučaju da lek Argifen Forte ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte da upravljate vozilima, rukujete mašinama ili radite bilo šta što može zahtevati oprez.

## **Lek Argifen Forte sadrži aspartam (E 951); saharozu**

Ovaj lek sadrži 30 mg aspartama (E 951) po kesici, koji predstavlja izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom, retkog genetskog oboljenja kod kojeg se fenilalanin nagomilava u organizmu usled nemogućnosti njegovog pravilnog uklanjanja.

Ovaj lek sadrži 840 mg saharoze po kesici. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

## **3. Kako se uzima lek Argifen Forte**

*Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.*

Za ublažavanje simptoma potrebno je koristiti najmanju efikasnu dozu leka u što kraćem vremenskom periodu. Ukoliko imate infekciju obratite se lekaru bez odlaganja ako simptomi (kao što su povišena temperatura i bolovi) potraju ili se pogoršaju (videti odeljak 2).

### Doziranje

#### **Odrasli i deca starija od 12 godina:**

Početna doza je 1 kesica leka (600 mg). Ako je potrebno, na svaka 4 sata uzeti po 1 kesicu, tako da maksimalna doza ne bude veća od 2400 mg (4 kesice) u toku 24 sata.

Lek Argifen Forte nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 12 godina.

#### **Stariji pacijenti:**

Kod starijih pacijenata postoji povećan rizik od pojave težih neželjenih dejstava, pa je pre primene leka potrebno posavetovati se sa lekarom.

### Način primene

Lek Argifen Forte, granule za oralni rastvor, je namenjen za oralnu upotrebu.

Rastvorite sadržaj kesice u najmanje 150 mL vode, promešajte kašičicom i odmah popijte.

Lek Argifen Forte se može uzeti nezavisno od obroka. Osobama sa osetljivim želucem se preporučuje upotreba leka tokom ili posle jela.

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, jetre ili srca, prilagoditi (smanjiti) dozu leka.

U slučaju korišćenja doza većih od 1200 mg dnevno, kao i pri upotrebi leka Argifen Forte u toku perioda dužeg od 7 dana u kontinuitetu, konsultovati lekara.

Ukoliko se simptomi ne ublaže, ili se pogoršaju, obratiti se lekaru.

## **Ako ste uzeli više leka Argifen Forte nego što je trebalo**

Ako ste uzeli veću dozu od one koje Vam je preporučena ili ako je dete slučajno uzelo ovaj lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu da biste dobili mišljenje o riziku i savet o merama koje treba da preduzmete.

Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.

Simptomi mogu biti mučnina, povraćanje (može biti i sa primesama krvi), bol u stomaku, glavobolja, zujanje u ušima, zbnunjenost i nekontrolisani pokreti očiju. Kod primene većih doza mogu se javiti pospanost, bol u

grudima, palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), gubitak svesti, konvulzije (uglavnom kod dece), slabost i vrtoglavica, pojava krvi u urinu, osećaj hladnog tela i problemi sa disanjem.

#### **Ako ste zaboravili da uzmete lek Argifen Forte**

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Argifen Forte, uzmite propuštenu dozu čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nemojte uzimati propuštenu dozu.

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu!

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

#### **4. Moguća neželjena dejstva**

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Pojava neželjenih dejstava se može smanjiti primenom najmanje efikasne doze, u što kraćem vremenskom periodu.

#### **Prestanite sa upotrebom leka Argifen Forte i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite:**

- teškoće u disanju ili zviždanje u plućima nejasnog porekla, oticanje lica, jezika, grla, osip na koži, svrab (to mogu biti simptomi ozbiljne alergijske reakcije);
- simptome aseptičnog meningitisa kao što su: glavobolja, mučnina, povraćanje, visoka telesna temperatura, ukočenost vrata ili preosetljivost na svetlo;
- simptome krvarenja iz želuca ili creva kao što su:
  - pojava krvi u stolici,
  - pojava crne stolice nalik na katran,
  - povraćanje krvi ili komadića koji liče na talog kafe;
- ozbiljne reakcije na koži (*Stevens-Johnson-ov* sindrom, toksična epidermalna nekroliza i multiformni eritem); simptomi uključuju ozbiljan osip kože, stvaranje plikova na koži, u ustima, nosu i genitalijama, kao i ljuštenje kože koje može biti praćeno bolom, glavoboljom i povišenom telesnom temperaturom;
- pojavu ozbiljne reakcije kože poznate kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS sindroma su: ozbiljan osip na koži, povišena telesna temperatura, oticanje limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca);
- crveni, ljuspast osip sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na kožnim naborima, trupu i gornjim ekstremitetima praćen povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza) (nepoznata učestalost). Ako Vam se jave ovi simptomi prestanite sa upotrebom leka Argifen Forte i odmah potražite medicinsku pomoć. Videti takođe odeljak 2.

#### **Obavestite Vašeg lekara i prestanite sa upotrebom leka Argifen Forte ako Vam se javi:**

- bol u želucu ili stomaku nejasnog porekla ili bilo koji simptomi u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano varenje, gorušica, osećaj mučnine i/ili povraćanje;
- gubitak vida, zamućenje ili poremećaj vida (smetnje u vidu);
- poremećaji krvi kao što su smanjenje broja krvnih ćelija i trombocita - prvi znaci su: visoka telesna temperatura, bol u grlu, čirevi u ustima, simptomi slični gripu, krvarenje iz usta, nosa, ušiju i iz kože;
- problemi sa bubrežima kao što su smanjena funkcija bubrega, zadržavanje tečnosti (edem), insuficijencija (slabost) bubrega, zapaljenska bolest bubrega;
- problemi sa jetrom, zapaljenje jetre (hepatitis), poremećaj rada jetre (smanjena funkcija), žutica (bolest koja izaziva žutu prebojenost kože i beonjača).

Lekovi koji sadrže ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od pojave srčanog udara („infarkt miokarda”) ili moždanog udara, naročito kada se primenjuju u velikim dozama.

Lekovi kao što je lek Argifen Forte u izuzetnim slučajevima povezani su sa ozbiljnim komplikacijama na koži kod pacijenata sa varičelom.

Kada se primenjuju NSAID, mogu se javiti ili pogoršati zapaljenja povezana sa infekcijom. Ako se znaci infekcije jave ili pogoršaju tokom upotrebe ibuprofena, odmah se obratite lekaru.

### **Ostala neželjena dejstva:**

**Česta neželjena dejstva** (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- glavobolja,
- vrtoglavica,
- dijareja, nadimanje (gasovi), konstipacija (otežano pražnjenje creva),
- osip,
- umor.

**Povremena neželjena dejstva** (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje sluzokože nosa, kihanje, svrab ili curenje nosa (rinitis),
- nesanica,
- uznemirenost,
- osećaj peckanja ili bockanja i mravinjanja,
- pospanost,
- poremećaj sluha,
- zujanje u ušima (tinitus),
- vrtoglavica sa osećajem okretanja ili pomicanja (vertigo),
- astma, otežano disanje,
- zapaljenje sluzokože želuca (gastritis),
- čir na želucu ili crevima,
- čirevi u ustima,
- koprivnjača, svrab, tačkasti osip na koži crveno-ljubičaste boje (purpura),
- osetljivost kože na svetlost.

**Retka neželjena dejstva** (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- depresija (nevoljnost i nezainteresovanost) ili zbunjenost (konfuzija),
- otok.

**Veoma retka neželjena dejstva** (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje pankreasa,
- srčana slabost,
- povišen krvni pritisak.

**Neželjena dejstva nepoznate učestalosti** (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

- pogoršanje postojećeg kolitisa i Kronove bolesti.

### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije  
Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija  
website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)  
e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

## 5. Kako čuvati lek Argifen Forte

Čuvati van vidokruga i domašaja dece!

Ne smete koristiti lek Argifen Forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Pripremljen rastvor treba odmah upotrebiti.

Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.

## 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

### Šta sadrži lek Argifen Forte

Aktivna supstanca je ibuprofen.

Jedna kesica leka sadrži 600 mg ibuprofena u obliku ibuprofen-arginata.

Pomoćne supstance su:

arginin; aspartam (E951); saharoza; natrijum-hidrogenkarbonat; saharin-natrijum; natrijum-laurilsulfat; aroma mentola (10.86.4580) (sadrži: prirodne aromatične supstance; arapska guma (E414)); aroma nane (506041 TP0504) (sadrži: prirodne aromatične preparate; prirodne aromatične supstance; aromatične supstance identične prirodnim supstancama; maltodekstrin; skrob, kukuruzni, modifikovani (E1450); gliceroltriacetat (E1518); pulegon).

### Kako izgleda lek Argifen Forte i sadržaj pakovanja

Granule za oralni rastvor.

Bele ili do skoro bele granule, karakterističnog mirisa na mentu, koje u vodi i nakon agitacije daju transparentan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je jednodozna kesica (papir/aluminijum/zatopljena smola).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 40 kesica i Uputstvo za lek.

### Nosilac dozvole i proizvođač

#### Nosilac dozvole

ADOC D.O.O. BEOGRAD  
Milorada Jovanovića 11, Beograd

#### Proizvođač

LAMP SAN PROSPERO SPA  
Via Della Pace, 25/A, San Prospero (MO), Italija

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Avgust, 2021.

**Režim izdavanja leka**

Lek se izdaje uz lekarski recept.

**Broj i datum dozvole**

*Argifen Forte, granule za oralni rastvor, 40 x (600 mg): 515-01-04060-20-001 od 18.08.2021.*