



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

UPUTSTVO ZA LEK

HEPATHROMBIN[®] H, supozitorije, (120 i.j. + 1,675 mg + 30 mg)
Pakovanje: blister, 2 x 5 supozitorija

Proizvođač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

HEPATHROMBIN® H, (120 i.j. + 1,675 mg + 30 mg), supozitorije

INN: heparin-natrijum, prednizolon, polidokanol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Heparthrombin H, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Heparthrombin H i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Heparthrombin H
3. Kako se upotrebljava lek Heparthrombin H
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Heparthrombin H
6. Dodatne informacije



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

1. ŠTA JE LEK HEPATHROMBIN H I ČEMU JE NAMENJEN?

Hepathrombin H supozitorije sadrže aktivne supstance heparin-natrijum, prednizolon i polidokanol. Ova kombinacija omogućava efikasno lečenje karakterističnih pratećih pojava i posledica hemoroida (šuljeva) kao što su svrab, žarenje, peckanje, bolovi i vlaženje.

Zahvaljujući čistom heparinu, Hepathrombin H sprečava zgrušavanje krvi u hemoroidima. Prednizolon deluje antiinflamatorno (antizapaljenski), a polidokanol ispoljava lokalno anestetičko i antipruriginozno dejstvo (otklanja svrab).

Hepathrombin H je namenjen simptomatskoj terapiji hemoroida i svraba u perianalnoj regiji u kratkoročnom periodu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEPATHROMBIN H

Lek HEPATHROMBIN H ne smete koristiti ukoliko:

- imate infekciju u predelu čmara
- imate pojačanu sklonost ka krvavljenju
- ste trudni ili planirate da ostanete trudni

Kada uzimate lek HEPATHROMBIN H posebno vodite računa ukoliko:

Nema posebnih upozorenja za primenu Hepathrombin H supozitorija. Sve informacije o primeni ovog leka videti u poglavlju *Kako se lek Hepathrombin H upotrebljava?*

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ne preporučuje se primena Hepathrombin H supozitorija sa ostalim preparatima za rektalnu primenu.

Uzimanje leka HEPATHROMBIN H sa hranom ili pićima

Nije relevantno.

Primena leka HEPATHROMBIN H u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ne preporučuje se primena Hepathrombin H supozitorija u trudnoći. Hepathrombin H supozitorije ne smete koristiti u prvom tromesečju (videti *Kada ne smete uzimati Hepathrombin H?*). U kasnijem periodu trudnoće (II i III tromesečje), lek možete da uzimate, ali samo ako je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom; u tom slučaju savetuje se oprez.

Ukoliko dođete možete da uzimate ovaj lek samo kada je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom.

Uticaj leka HEPATHROMBIN H na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka da Heparthrombin H može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka HEPATHROMBIN H

Nema značajnih informacija o pomoćnim materijama koje sadrži ovaj lek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEPATHROMBIN H

Lek Heparthrombin H uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Primena supozitorija Heparthrombin H:

- Pre primene supozitorija je potrebno da ispraznite creva.
- Operite ruke.
- Izvadite supozitorije (u plastičnoj foliji) iz kutije, i pocepajte plastični omotač na označenom mestu.
- Legnite na bočnu stranu, sa kolenima prislonjenim uz grudni koš.
- Nežno gurnite supozitoriju (sa vrhom okrenutim napred) u čmar (tj. rektum - završni deo crevnog trakta).
- Gurnite supozitoriju što je više moguće.
- Nakon stavljanja supozitorije, ostanite u istom položaju narednih nekoliko minuta.
- Ukoliko imate osećaj da će supozitorija izaći (osećaj otpora od strane organizma), ostanite i dalje u tom položaju i pritisnite butine što jače. Važno je da supozitorija ostane u rektumu, kako bi došlo do resorpcije leka (prelaska leka u cirkulaciju).
- Operite ruke.

Koju dozu leka uzeti

Heparthrombin H supozitorije se primenjuju jednom dnevno, posle defekacije, u rektum. Kod jače izraženih simptoma može se primeniti po jedna supozitorija 2 – 3 puta tokom prvog dana terapije. Samo tokom prvog dana terapije može se primeniti više od jedne supozitorije ukoliko su simptomi jače izraženi.

Terapija ne bi trebalo da traje duže od 7 dana. Ukoliko ne dođe do poboljšanja potrebno je ispitati uzrok koji je doveo do pojave simptoma.

Ako ste uzeli više leka HEPATHROMBIN H nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli više od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Ako ste zaboravili da uzmete lek HEPATHROMBIN H

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek HEPATHROMBIN H

Čak i ako se dobro osećate, nemojte prestati da uzimate lek bez konsultacije sa lekarom. Važno je da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš lekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA

Lek Heparthrombin H supozitorije, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Dugotrajna primena može da dovede do usporenog zarastanja ranica na koži.

Izuzetno retko se mogu javiti alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti), kao i lokalne iritacije.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK HEPATHROMBIN H

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

3 godine.

Nemojte koristiti lek Heparthrombin H posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Šta sadrži lek HEPATHROMBIN H

Aktivne supstance su:

Hepathrombin H, supozitorije:

1 supozitorija sadrži:

120 i.j. heparin-natrijuma
1,675 mg prednizolonacetata
30 mg polidokanola.

Ostali sastojci su:

Hepathrombin H, supozitorije:

Trigliceridi, srednje dužine lanca; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gliceroltristearat, čvrsta mast.

Kako izgleda lek HEPATHROMBIN H i sadržaj pakovanja

Hepathrombin H, supozitorije:

Bele supozitorije konusnog oblika; 2 blistera od PVC/PE folije bele boje sa po 5 supozitorija.

Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2012.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-2084-12-001 od 24.12.2012.