

UPUTSTVO ZA LEK

Pressing[®] sirup, 5 mg/5 mL
Pakovanje: ukupno 120mL, bočica staklena, 1 x 120 mL

Proizvođač: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.
Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

Pressing®, sirup, 5 mg/5 mL

INN: loratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pressing, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitacete:

1. Šta je lek Pressing i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing
3. Kako se upotrebljava lek Pressing
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Pressing
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK Pressing I ČEMU JE NAMENJEN?

Lek Pressing pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.

Lek Pressing ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (na primer, kod polenske kijavice), poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju.

Lek Pressing se primenjuje i za ublažavanje simptoma kopriivnjače (svrab i crvenilo.).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pressing

Lek Pressing sirup ne smete koristiti:

- ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na loratadin ili neki od sastojaka leka (*videti "Sadržaj pomoćnih supstanci"*).

Kada uzimate lek Pressing, posebno vodite računa:

Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko:

- imate oboljenje jetre.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ukoliko treba da uradite neku kožnu probu, recite Vašem lekaru da uzimate lek Pressing sirup.

Možda će biti potrebno da prestanete sa uzimanjem leka na 2 dana pre zakazane probe, u cilju postizanja tačnih rezultata ovog testa. Posle obavljenog testa možete nastaviti sa uzimanjem leka.

Uzimanje leka Pressing sa hranom ili pićima

Lek Pressing se može uzimati bez obzira na vreme obroka. Lek Pressing ne pojačava efekte alkoholnih pića.

Primena leka Pressing u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ne treba uzimati lek Pressing za vreme trudnoće.

Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja. Loratadin se izlučuje u majčino mleko.

Uticaj leka Pressing na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Pressing izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi oseće pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Pressing

Lek Pressing sirup sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRESSING

Lek Pressing sirup uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i deca starija od 12 godina: 10 mL sirupa jednom dnevno (dve pune kašičice) nezavisno od obroka.

Deca od 2 do 12 godina u zavisnosti od telesne mase:

Telesna masa >30 kg: 10 mL sirupa jednom dnevno (dve pune kašičice) nezavisno od obroka.

Telesna masa ≤ 30 kg: 5 mL sirupa jednom dnevno (jedna puna kašičica) nezavisno od obroka.

Pacijenti sa teškim poremećajem jetre

Kod odraslih i dece telesne mase veće od 30 kg se preporučuje početna doza od 10 mL loratadina (dve pune kašičice) svakog drugog dana, a kod dece telesne mase ≤ 30kg, doza od 5 mL (jednu punu kašičicu) svakog drugog dana, nezavisno od obroka.

Lek Pressing se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.

Ako ste uzeli više leka Pressing nego što je trebalo

Uzimajte lek Pressing samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću količinu sirupa Pressing nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Pressing prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog rada srca i glavobolje.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Pressing

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Pressing sirup, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Najčešće prijavljene neželjene reakcije kod dece uzrasta od 2 do 12 godina uključuju glavobolju, nervozu i umor.

Najčešće prijavljene neželjene reakcije kod odraslih i adolescenata uključuju pospanost, glavobolju, pojačan apetit i nesanicu.

Nakon stavljanja leka Pressing u promet, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teške alergijske reakcije, vrtoglavice, nepravilnog ili ubrzanog rada srca, mučnine, suvoće usta, smetnji u radu želuca, problema sa jetrom, gubitka kose, ospe i umora. Nije moguće odrediti učestalost ovih neželjenih reakcija.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK PRESSING

Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe:

3 godine.

Nakon prvog otvaranja sirup je stabilan 28 dana ako se čuva na temperaturi do 25°C.

Nemojte koristiti lek Pressing posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Pressing

Aktivne supstance su:

5 mL sirupa sadrži:
loratadin 5 mg

Ostali sastojci su:

Glicerol (E 422), propilenglikol (E 1520), saharoza, natrijum-benzoat (E 211), limunska kiselina, monohidrat; dinatrijum-edetat (E 386), aroma Cherry Flavour, voda prečišćena.

Kako izgleda lek Pressing i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan do slabo žućkast rastvor, kiselog ukusa, mirisa na voće.
Staklena bočica, smeđe boje, (tip III hidrolitičke otpornosti) zatvorena polietilenskim/polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem sa plastičnom kašičicom zapremine 5 mL.

Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2013.

Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Pressing® sirup, 120 mL,(5mg)/5mL:
515-01-5836-12-001 od 11.06.2013.