SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

1. IME LEKA

Immunokind®, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tablete
INN: calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, calcium fluoratum trit. D6, calcium phosphoricum trit. D6, sulfur jodatum trit. D12

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6	20 mg
Calcium fluoratum trit. D6	20 mg
Calcium phosphoricum trit. D6	20 mg
Sulfur jodatum trit. D12	20 mg

Za listu svih pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta.

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele do skoro bele boje.

4. KLINIČKI PODACI

4.1. Terapijske indikacije

Lek Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunskog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.
Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.

4.2. Doziranje i način primene

Deca uzrasta do 6 godina: Uzeti po 1 tabletu 3 puta dnevno.

Pustiti da se tableta rastopi u ustima. Za bebe i malu decu tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode.
Ne preporučuje se uzimanje tableta leka Immunokind istovremeno sa hranom i pićem. Tablete leka Immunokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.

4.3. Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivne supstane ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Ponovna procena terapije je neophodna u slučaju:
- da dete slabo reaguje na lek Immunokind

- da se jave dodatne tegobe.

Ne uzimajte lek Immunokind tablete kao dugotrajnu terapiju bez konsultacije sa lekarom.
Ukoliko dete ima oboljenje tiroidne ili paratiroidne žlezde, roditeljima se preporučuje da se pre primene leka Immunokind tableta obrate lekaru.

4.5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima. Upotreba ovog homeopatskog leka ne isključuje upotrebu drugih lekova.

Ukoliko dete uzima ili je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu uzeti bez lekarskog recepta, roditeljima se savetuje da se, pre primene leka, posavjetuju sa lekarom.

4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje

Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.

4.7. Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.

4.8. Neželjena dejstva

Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Immunokind.
Ukoliko se pojave neželjena dejstva, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, pacijentu se savetuje da prekine terapiju i konsultuje se sa svojim lekarom

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

4.9. Predoziranje

Do sada nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja.

5. FARMAKOLOŠKI PODACI

Farmakoterapijska grupa: Homeopatski lek

Homeopatska terapija značajno se razlikuje od tradicionalnog lečenja u smislu shvatanja bolesti i korišćenja medicinskih supstanci. Homeopatski lekovi se ne koriste kao sirovine ili kao lekovito bilje. Njihovo delovanje se obično pojačava putem postepenog razređivanja i sukusije. Prema tome, to je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. To nije prvenstveno farmakološka terapija jer je željeni rezultat reakcija samog organizma. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.

5.1. Farmakodinamski podaci

Nije primenljivo.

5.2. Farmakokinetički podaci

Nije primenljivo.

5.3. Pretklinički podaci o bezbednosti leka

Nije primenljivo.
Za Immunokind, kao homeopatski lek nisu rađena klinička ispitivanja.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Lista pomoćnih supstanci

celuloza, mikrokristalna;
talk;
magnezijum-stearat

6.2. Inkompatibilnost

Nije primenljivo.

6.3. Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci. Čuvati na temperaturi do 25°C.

6.4 Posebne mere opreza pri čuvanju

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja videti odeljak 6.3.

6.5. Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla hidrolotičke grupe III sa zatvaračem sa navojem bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE).
U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminjumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu0,1/ALKPzell/Alu 0,01).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi bočica sa 150 tableta i Uputstvo za lek.

6.6. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

7. NOSILAC DOZVOLE

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Ulcinjska 13, sprat 4, stan 10, Beograd-Zvezdara

8. BROJ(EVI) DOZVOLE(A) ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Broj poslednje obnove dozvole: 002839916 2024

9. DATUM PRVE DOZVOLE I DATUM OBNOVE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Datum prve dozvole: 14.09.2009.

Datum poslednje obnove dozvole: 23.09.2025.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Septembar, 2025.