

**UPUTSTVO ZA LEK**

**Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5 x 10 ml**  
**Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1 x 50 ml**

**(za primenu na životinjama)**

Proizvođač: **VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

Podnosilac zahteva: **VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

## 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.  
Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

## NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" D.O.O.  
Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

## 2. IME LEKA

### **Coffeinum cum natrii benzoate**

kofein (250 mg/ml)

rastvor za injekciju

za konje, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, pse i mačke

## 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

### **Aktivna supstanca:**

Kofein 250 mg

### **Pomoćne supstance:**

Natrijum-benzoat 250 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

## 4. INDIKACIJE

Primena leka COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE indikovana je u sledećim slučajevima:

- kolapsna stanja kod zaraznih bolesti, umora i napora
- depresija respiratornog centra (disanja) uključujući i onu koja nastaje posle primene depresora CNS-a (opšti anestetici, barbiturati, opioidni analgetici)
- neonatalna depresija respiracije (asfiksija), iscrpljenost i iznemoglost u toku bolesti životinja.

## 5. KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod:

- hipertenzija
- aritmija
- paraliza perifernih krvnih sudova

- motorne prenadraženosti.
- Primena kofeina je kontraindikovana kod trkačkih konja najmanje 10 dana pre trke.

## 6. NEŽELJENA DEJSTVA

Tremor, povraćanje, konvulzije, hipotenzija, ekstrasistole, aritmija i poliurija. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

## 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke.

## 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje subkutanom, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom.

Lek Coffeinum cum natrii benzoate primenjuje se u sledećim dozama:

Konji, goveda: **2 - 3 ml / 100 kg t.m.**  
Telad, ždrebad, ovce, svinje, psi, mačke: **0,2 – 0,25 ml / 10 kg t.m.**

Aplikacija se vrši po potrebi, a doza može da se ponovi u toku dana (1,5 - 2 sata od prve aplikacije).

## 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije primeniti mere asepsie i antiseptike i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka.

Na mestu subkutane aplikacije može da se javi prolazni otok i bol, pa se preporučuje prethodno razblaživanje ovog leka vodom za injekcije u odnosu 1:4.

Na jednom injekcionom mestu (i.m.) može se dati najviše:

- konjima i govedima 10 ml leka
- psima i mačkama 1-2 ml leka

Kod konja sa tamnom bojom dlake (dorati, vranici) na mestu s.c. aplikacije dlaka ponekad pobledi.

## 10. KARENCA

Nula (0) dana.

## 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

**Rok upotrebe:** 3 godine

**Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:** upotrebiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

## 12. POSEBNA UPOZORENJA

**Za primenu na životinjama.**

**Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama**

Nema posebnih upozorenja.

**Upotreba tokom graviditeta i laktacije**

Nema ograničenja.

**Interakcije**

Kofein je sinergista sa preparatima digitalisa, adrenergičkim  $\beta$  stimulatorima i preparatima kalcijuma, pa ga treba oprezno davati sa ovim lekovima.

**Inkompatibilnost**

Lek ne primenjivati u infuzijama ili injekcijama zajedno sa hlorpromazinom, promazinom, prometazinom, simpatikomimeticima i tetraciklinima.

## 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

## 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

26.05.2021.

## 15. OSTALI PODACI

**Pakovanje:**

Bočica od 10 ml: Tip I staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapičom. Ukupno 5x10 ml (5 bočica u kartonskoj kutiji).

Bočica od 50 ml: Tip II staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapičom. Ukupno 50 ml (bočica u kartonskoj kutiji).

**Način izdavanja:** Lek se može izdavati samo na recept veterinara.  
**ATCvet kod:** QN06BC01  
**Broj dozvole:** 5x10 ml: 323-01-00048-18-001  
1x50 ml: 323-01-00047-18-001