

UPUTSTVO ZA LEK

GOPAVAK[®], 40 a.j./mL, suspenzija za injekciju, 1x50 mL (1x50 doza)
(za primenu na životinjama)

Proizvođač: **VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

Podnosilac zahteva: **VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.**

Adresa: **Beogradski put 123, Subotica, Srbija**

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK/NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.
Beogradski put 123, Subotica, Srbija

2. IME LEKA

GOPAVAK[®]
vakcina koja sadrži inaktivisanu bakterijsku kulturu *Salmonella typhimurium* var. *Copenhagen*
suspenzija za injekciju
za golubove

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (1 mL) vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisana bakterijska kultura
Salmonella typhimurium var. *Copenhagen* najmanje 40 a.j.*

Pomoćne supstance:

Formaldehid, rezidualni najviše 0,5 mg

*titar antitela u serumu golubova određen metodom aglutinacije nakon dvokratne imunizacije jednom dozom vakcine

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije

4. INDIKACIJE

Aktivna imunizacija golubova protiv infekcije uzrokovane sa *Salmonella typhimurium* var. *Copenhagen*.

5. KONTRAINDIKACIJE

Primena vakcine je kontraindikovana kod sasvim mladih golubova (mladih od 4 nedelje), kliconoša, bolesnih, kahektičnih i životinja invadiranih parazitima; kao i kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu primene vakcine moguća je pojava prolaznog otoka. Takođe je moguća pojava alergijske ili anafilaktičke reakcije.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Golubovi.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.

Vakcina se aplikuje subkutano u predelu vrata u dozi od 1 mL, dvokratno u intervalu od 14 dana.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije, bočica sa vakcinom se prethodno dobro protrese.

10. KARENCA

Nula dana.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju.

Ne zamrzavati.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 1 godina

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne koristiti kod drugih ptica osim kod golubova.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinacija mladih golubova se vrši tek posle potpunog obrastanja perjem.

Vakcinacija se sprovodi samo u toku zimskih meseci, odnosno u periodu mirovanja reprodukcije.

Bolesni i inficirani golubovi se ne vakcinišu i takve jedinke treba neškodljivo ukloniti, a objekat i ispuste nakon toga dezinfikovati.

Ukoliko se kod životinja pojave alergijske ili anafilaktičke reakcije, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Upotreba tokom perioda nošenja jaja

Vakcina se ne primenjuje kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja, kao i najmanje 4 nedelje pre tog perioda.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu ili uputstvo za upotrebu vakcine lekaru.

Predoziranje

U slučaju predoziranja vakcina ne izaziva sistemske reakcije. U ređim slučajevima, može doći do pojave lokalnih reakcija na mestu aplikacije koje ne zahtevaju nikakav dodatni tretman.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

U nedostatku studija kompatibilnosti, vakcinu ne mešati ni sa jednom drugom vakcinom ili bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

13.11.2020.

15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica od 50 mL od tamnog stakla II hidrolitičke grupe, sa gumenim (brombutilnim) zapašaćem i aluminijumskom kapičom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01EB**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020