

KARTICA ZA PACIJENTA SA UPOZORENJIMA

Sadržaj

Pradaxa® dabigatraneteksilat

316003-02

- Nosite ovu karticu sa upozorenjima uvek sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

April, 2019.



Poštovani,

Vaš lekar je započeo lečenje lekom Pradaxa®. Molimo Vas da u cilju bezbedne primene leka Pradaxa® razmotrite važne informacije u nastavku teksta. S obzirom da ova Kartica sa upozorenjima sadrži važne informacije o Vašem lečenju, molimo da je nosite sa sobom u svim prilikama kako biste obavestili zdravstveno osoblje da uzimate lek Pradaxa®.



1

Informacija za pacijente o leku Pradaxa®

O Vašoj terapiji

- Pradaxa® razređuje krv, što sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Uzimajte lek Pradaxa® redovno prema uputstvu Vašeg lekara. Nikada ne propustajte dozu i ne prekidajte uzimanje leka Pradaxa® bez savetovanja sa Vašim lekarom.
- Obavestite Vašeg lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate.

2

- Obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Pradaxa® pre svakog hirurškog ili invazivnog zahvata kod koga se može očekivati pojava krvarenja (vađenje zuba, gastroskopija, itd.).
- Pradaxa® se može uzimati sa ili bez hrane. Kapsula treba da se proguta cela, sa čašom vode. Ne lomite, ne žvaćite i ne praznite pelete iz kapsule.

Kada potražiti savet lekara

- Uzimanje leka Pradaxa® može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite Vašem lekaru ako primetite bilo koji od sledećih mogućih znakova i simptoma krvarenja: oticanje, nelagodnost, neobičan bol ili glavobolju, vrtoglavicu, bledilo,

3

slabost, neobične modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, neobično dugotrajno krvarenje iz posekotina, neobičajeno menstrualno ili vaginalno krvarenje, krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanje krvi, povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu kafe.

- Ukoliko padnete ili se povredite tokom uzimanja leka, posebno ako udarite glavu, molimo odmah potražite medicinsku pomoć.
- Ne prekidajte uzimanje leka Pradaxa® bez savetovanja sa Vašim lekarom ako osetite gorušicu, mučninu, povraćate, osećate nelagodnost u želucu, nadutost ili bol u gornjem delu trbuha.

4

Informacije za zdravstvene radnike u vezi leka Pradaxa®

- Pradaxa® je oralni antikoagulans koji deluje putem direktne inhibicije trombina.
- U slučaju hirurškog ili drugog invazivnog postupka, možda će se morati privremeno prekinuti primena leka Pradaxa® pre toga.
- U slučaju velikog krvarenja primena leka Pradaxa® se mora odmah obustaviti.

5

- Specifičan antagonist dabigatrana (Praxbind®) je dostupan u situacijama kada je potrebno brzo poništenje antikoagulantnog dejstva leka Pradaxa® (videti Sažetke karakteristika leka Pradaxa® i Praxbind®).
- S obzirom da se Pradaxa® uglavnom eliminiše putem bubrega, potrebno je održavati odgovarajuću diurezu. Pradaxa® se može ukloniti dijalizom.

Molimo popunite ovaj deo ili zamolite Vašeg lekara da to učini

Informacija o pacijentu

6

(Ime pacijenta)

(Datum rođenja)

(Indikacija za antikoagulantnu terapiju)

(Vrednost klirensa kreatinina pri uvođenju terapije)

(Doziranje leka Pradaxa®)

(Datum započinjanja terapije)

7