

IZVUCITE NAPOLJE

| | |
|---|---|
| <p>Ranexa - Kartica sa upozorenjima za pacijenta</p> <p>(Ovu karticu uvek nosite sa sobom)</p> <p><u>Informacije za pacijenta</u></p> <p>Ova kartica sadrži važne bezbednosne informacije koje morate znati pre i tokom terapije lekom Ranexa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pokažite ovu karticu svakom doktoru koji je uključen u Vaše lečenje. <p><u>Pre terapije lekom Ranexa</u></p> <p>Pre nego što počnete da uzimate lek Ranexa, obavestite Vašeg doktora:</p> <ul style="list-style-type: none">• ako imate probleme sa bubrezima• ako imate probleme sa jetrom• ako ste ikada imali nepravilan elektrokardiogram (EKG)• ako koristite lekove za lečenje epilepsije, bakterijskih ili gljivičnih infekcija, HIV infekcije, depresije ili poremećaja srčanog ritma• ako koristite biljni lek kantarion• ako koristite lekove protiv alergije• ako koristite lekove za snižavanje holesterola• ako koristite lekove za smanjenje rizika od odbacivanja transplatiranih organa | <p><u>Tokom terapije lekom Ranexa</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ne smete piti sok od grejpfruta• Obratite se doktoru ako osetite vrtoglavicu ili mučninu, ako povraćate ili osetite bilo koji neočekivani simptom nakon što ste počeli da uzimate lek Ranexa. <p>Datumi terapije lekom Ranexa:</p> <p>Početak</p> <ul style="list-style-type: none">• Pogledajte Uputstvo za lek Ranexa radi detaljnijih informacija• Ponesite sa sobom spisak svih ostalih lekova koje koristite svaki put kada posećujete lekara <p>Ime pacijenta.....</p> <p>Ime doktora.....</p> <p>Telefon doktora.....</p> |
|---|---|

IZVUCITE NAPOLJE

| | |
|---|---|
| <p>Ranexa - Kartica sa upozorenjima za pacijenta</p> <p>(Informacije za zdravstvene radnike)</p> <p>Pacijent koji ima ovu karticu uzima lek Ranexa za lečenje simptomatske angine pektoris.</p> <p>Molimo Vas da pogledate Sažetak karakteristika leka (SmPC) za lek Ranexa pre nego što propišete bilo koji lek ovom pacijentu, jer su moguće interakcije sa drugim lekovima koje treba uzeti u obzir.</p> <p><u>Ranexa je kontraindikovana kod pacijenata koji uzimaju:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• snažne inhibitore enzima CYP3A4 (npr. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibitore HIV proteaze, klaritromicin, telitromicin, nefazodon)• antiaritmike klase Ia (npr. hinidin) ili klase III (npr. dofetilid, sotalol) osim amjodarona. | <p><u>Može biti potrebno smanjenje doze leka Ranexa u kombinaciji sa:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• umerenim inhibitorima enzima CYP3A4 (npr. diltiazem, eritromicin, flukonazol)• P-gp inhibitorima (npr. ciklosporin, verapamil) <p><u>Potreban je oprez kada propisujete lek Ranexa pacijentima:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• koji uzimaju određene druge lekove koji su navedeni u SmPC-u• sa određenim drugim faktorima rizika navedenim u SmPC-u <p>Informišite pacijenta o mogućoj interakciji sa drugim propisanim lekovima i da je potrebno da kontaktira svog doktora u slučaju pojave vrtoglavice, mučnine ili povraćanja. Za ostale preporuke, molimo Vas da pogledate SmPC.</p> <p>Za medicinske informacije: Telefon: +381 11 655-6094</p> |
|---|---|