

Ime i prezime pacijenta: _____

Datum prvog propisivanja leka Aubagio®: ____ / ____ / ____

Naziv zdravstvene ustanove: _____

Ime i prezime lekara: _____

Kontakt-telefon lekara: _____

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek.

Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i
- slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Aubagio®,

Amicus SRB d.o.o., Milorada Jovanovića 9, 11 000 Beograd
Tel. 011/4426-300, E-mail: medinfo.serbia@swixxbiopharma.com

KARTICA ZA PACIJENTA

Ova Kartica za pacijenta sadrži važne bezbednosne informacije koje treba da znate ukoliko ste na terapiji lekom Aubagio®. Za kompletne informacije pogledajte Uputstvo za lek.



Opšte uputstvo

Molimo Vas da ovu Karticu pokažete svakom lekaru ili zdravstvenom radniku koji je uključen u Vaše medicinsko zbrinjavanje (npr. u hitnom slučaju).

Jednom dnevno
AUBAGIO®
(teriflunomid) 14mg
tablete



Važna neželjena dejstva

Ovaj lek može uticati na funkciju Vaše jetre kao i na određene ćelije krvi koje su važne za odbranu od infekcija. Stoga treba uraditi kontrolne analize krvi i krvnog pritiska pre započinjanja terapije i redovno tokom primene terapije.

U slučaju pojave bilo kog od navedenih neželjenih dejstava, odmah se obratite lekaru:

- Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamniji urin, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U tom slučaju, možda imate problema sa jetrom.
- Visoka temperatura, groznica, drhtavica, otečene žlezde, otežano ili bolno mokrenje ili konfuzija. U tom slučaju, možda imate neku infekciju.



Samo za pacijentkinje: Trudnoća

- Ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni ne počinjte sa terapijom lekom Aubagio®. Vaš lekar može zatražiti da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni.
- Koristite pouzdanu kontracepciju tokom primene leka Aubagio®.
- U slučaju trudnoće, Vaš lekar može da preporuči terapiju lekovima koji omogućavaju brzu eliminaciju leka Aubagio® iz organizma.
- Konsultujte se sa lekarom ukoliko dojite ili planirate da dojite.