

## Kartica sa upozorenjima za pacijenta

Runaplast<sup>®</sup> 10 mg

Runaplast<sup>®</sup> 15 mg

Runaplast<sup>®</sup> 20 mg

*Odaberite propisanu dozu*

- ◆ Ovu karticu stalno imajte kod sebe.
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja ili bilo kakve intervencije.

## Šta treba da znam o leku Runaplast?

- Runaplast razređuje krv, što kod Vas sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Runaplast morate uzimati tačno onako kako Vam je to propisao lekar. Da bi se obezbedila optimalna zaštita od krvnih ugrušaka, **nikad ne preskačite dozu.**
- Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Runaplast, a da prvo niste o tome razgovarali sa svojim lekarom, pošto se može povećati Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavestite svog lekara o svakom drugom leku koji trenutno uzimate, koji ste donedavno uzimali ili koji planirate da uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek Runaplast.
- Obavestite svog lekara o tome uzimate lek Runaplast pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivne procedure.

## Kada treba da potražim savet svog lekara?

Kada uzimate lek koji razređuje krv, kao što je Runaplast, važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte počinjati sa uzimanjem leka ako ste pod rizikom od krvarenja, a da prvo o tome ne porazgovarate sa svojim lekarom.

Odmah kažite svom zdravstvenom radniku ako imate znake ili simptome krvarenja kao što su:

- ◆ Bol
- ◆ Otok ili nelagodnost
- ◆ Glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- ◆ Neuobičajena pojava modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja iz desni, krvarenja iz posekotina kojima treba mnogo vremena da prestanu
- ◆ Menstrualno ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- ◆ Krv u mokraći koja može da bude ružičaste ili smeđe boje, crvena ili crna stolica
- ◆ Iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao talog od kafe

## Kako da uzimam lek Runaplast?

Da bi se obezbedila optimalna zaštita:

- ◆ Runaplast 10 mg se može uzimati sa hranom ili bez nje
- ◆ Runaplast 15 mg se mora uzimati sa hranom
- ◆ Runaplast 20 mg se mora uzimati sa hranom

Primam antikoagulantnu terapiju lekom Runaplast (rivaroksaban)

<b>Ime:</b> _____	<b>Drugi lekovi/stanja:</b>
<b>Adresa:</b>	_____
_____	_____
_____	_____
<b>Datum rođenja:</b> _____	<b>Težina:</b> _____

U hitnom slučaju obavestite:

<b>Ime lekara:</b> _____
<b>Telefon lekara:</b> _____
<b>Pečat lekara:</b> _____

Takođe obavestite:

<b>Ime:</b> _____
<b>Telefon:</b> _____
<b>Srodstvo:</b> _____

Informacija za zdravstvene radnike:

- ◆ INR vrednosti ne treba da se koriste jer nisu pouzdan pokazatelj antikoagulantne aktivnosti leka Runaplast.